

XXX

HISTOIRE NATURELLE.

Quadrupèdes. Tome II.

T.M.

127.

Quadrupèdes. Tome II.

A

HISTOIRE
NATURELLE,
GÉNÉRALE
ET PARTICULIÈRE,

PAR M. LE COMTE DE BUFFON, INTEN-
DANT DU JARDIN DU ROI, DE L'ACADE-
MIE FRANÇAISE ET DE CELLE DES SCIEN-
CES, &c.

Quadrupèdes. Tome II.




AUX DEUX-PONTS,
CHEZ SANSON & COMPAGNIE;

M. DCC. LXXXVI.



Nr inv. 3949
15



HISTOIRE

NATURELLE

Les Animaux sauvages.

DANS les animaux domestiques , & dans l'homme, nous n'avons vu la Nature que contrainte , rarement perfectionnée , souvent altérée , défigurée , & toujours environnée d'entraves ou chargée d'ornemens étrangers : maintenant elle va paroître nue , parée de sa seule simplicité , mais plus piquante par sa beauté naïve , sa démarche légere , son air libre , & par les autres attributs de la noblesse & de l'indépendance . Nous la verrons , parcourant en souveraine la surface de la terre , partager son domaine entre les animaux , assigner à chacun son climat , sa subsistance ; nous la verrons dans les forêts , dans les eaux , dans les plaines , dictant ses loix simples , mais immuables ,

imprimant sur chaque espèce ses caractères inaltérables, & dispensant avec équité ses dons, compenser le bien & le mal ; donner aux uns la force & le courage, accompagnés du besoin & de la voracité ; aux autres, la douceur, la tempérance, la légèreté du corps, avec la crainte, l'inquiétude & la timidité ; à tous la liberté avec des moeurs constantes ; à tous des désirs & de l'amour toujours aisés à satisfaire, & toujours suivis d'une heureuse fécondité.

Amour & liberté, quels bienfaits ! Ces animaux que nous appellons sauvages, parce qu'ils ne nous sont pas familiers, ont-ils besoin de plus pour être heureux ? ils ont encore l'égalité, ils ne sont ni les esclaves, ni les tyrans de leurs semblables, l'individu n'a pas à craindre, comme l'homme, tout le reste de son espèce ; ils ont entre eux la paix, & la guerre ne leur vient que des étrangers ou de nous. Ils ont donc raison de fuir l'espèce humaine, de se dérober à notre aspect, de s'établir dans les solitudes éloignées de nos habitations, de se servir de toutes les ressources de leur instinct, pour se mettre en sûreté, & d'employer, pour se soustraire à la puissance de l'homme, tous les moyens de liberté que la Nature leur a fournis en même temps qu'elle leur a donné le désir de l'indépendance.

Les uns, & ce sont les plus doux, les plus innocents, les plus tranquilles, se contentent de s'éloigner, & passent leur vie dans nos campagnes ; ceux qui sont plus défiant, plus farouches, s'enfoncent dans les bois ;

d'autres , comme s'ils savoient qu'il n'y a nulle sûreté sur la surface de la terre , se creusent des demeures souterraines , se réfugient dans des cavernes , ou gagnent les sommets des montagnes les plus inaccessibles ; enfin les plus féroces , ou plutôt les plus fiers , n'habitent que les déserts , & règnent en souverains dans ces climats brûlans , où l'homme aussi sauvage qu'eux ne peut leur disputer l'empire.

Et comme tout est soumis aux loix physiques , que les êtres mêmes les plus libres sont assujettis , & que les animaux éprouvent , comme l'homme , les influences du ciel & de la terre ; il semble que les mêmes causes qui ont adouci , civilisé l'espèce humaine dans nos climats , ont produit de pareils effets sur toutes les autres espèces : le loup , qui dans cette zone tempérée est peut-être de tous les animaux le plus féroce , n'est pas à beaucoup près aussi terrible , aussi cruel que le tigre , la panthere , le lion de la zone torride , ou l'ours blanc , le loup-cervier , l'hyène de la zone glacée . Et non-seulement cette différence se trouve en général , comme si la Nature , pour mettre plus de rapport & d'harmonie dans ses productions , eût fait le climat pour les espèces , ou les espèces pour le climat , mais même on trouve dans chaque espèce en particulier , le climat fait pour les mœurs , & les mœurs pour le climat .

En Amérique , où les chaleurs sont moins , où l'air & la terre sont plus doux qu'en Afrique , quoique sous la même ligne , le tigre , le lion , la panthere n'ont rien

de redoutable que le nom ; ce ne sont plus ces tyrans des forêts , ces ennemis de l'homme aussi fiers qu'intrépides , ces monstres alterés de sang & de carnage ; ce sont des animaux qui fuient d'ordinaire devant les hommes , qui loin de les attaquer de front , loin même de faire la guerre à force ouverte aux autres bêtes sauvages , n'emploient le plus souvent que l'artifice & la ruse pour tâcher de les surprendre ; ce sont des animaux qu'on peut dompter comme les autres , & presque apprivoiser. Ils ont donc dégénéré , si leur nature étoit la férocité jointe à la cruauté , ou plutôt ils n'ont qu'éprouvé l'influence du climat : sous un ciel plus doux , leur naturel s'est adouci , ce qu'ils avoient d'excèsif s'est tempéré ; & par les changemens qu'ils ont subis ils sont seulement devenus plus conformes à la terre qu'ils ont habitée.

Les végétaux qui couvrent cette terre , & qui y sont encore attachés de plus près que l'animal qui broute , participent aussi plus que lui à la nature du climat ; chaque pays , chaque degré de température a ses plantes particulières ; on trouve au pied des Alpes celles de France & d'Italie , on trouve à leur sommet celles des pays du Nord ; on retrouve ces mêmes plantes du Nord sur les cimes glacées des montagnes d'Afrique . Sur les monts qui séparent l'empire du Mogol du royaume de Cachemire , on voit du côté du midi toutes les plantes des Indes , & l'on est surpris de ne voir de l'autre côté que des plantes d'Europe . C'est aussi des climats

excessifs que l'on tire les drogues, les parfums, les poisons, & toutes les plantes dont les qualités sont excessives : le climat tempéré ne produit au contraire que des choses tempérées ; les herbes les plus douces, les légumes les plus sains, les fruits les plus suaves, les animaux les plus tranquilles, les hommes les plus polis sont l'apanage de cet heureux climat. Ainsi, la terre fait les plantes, la terre & les plantes font les animaux, la terre, les plantes & les animaux font l'homme : car les qualités des végétaux viennent immédiatement de la terre & de l'air ; le tempérament & les autres qualités relatives des animaux qui paissent l'herbe tiennent de près à celles des plantes dont ils se nourrissent ; enfin les qualités physiques de l'homme & des animaux qui vivent sur les autres animaux autant que sur les plantes, dépendent, quoique de plus loin, de ces mêmes causes, dont l'influence s'étend jusque sur leur naturel & sur leur mœurs. Et ce qui prouve encore mieux que tout se tempère dans un climat tempéré, & que tout est excès dans un climat excessif, c'est que la grandeur & la forme, qui paroissent être des qualités absolues, fixes & déterminées, dépendent cependant, comme les qualités relatives, de l'influence du climat : la taille de nos animaux quadrupèdes n'approche pas de celle de l'éléphant, du rhinocéros, de l'hippopotame ; nos plus gros oiseaux sont fort petits, si on les compare à l'autruche, au condor, au casoar ; & quelle comparaison des poissons, des lézards, des

serpens de nos climats , avec les baleines , les cachalots , les narvals qui peuplent les mers du Nord , & avec les crocodiles , les grands lézards & les couleuvres énormes qui infestent les terres & les eaux du midi ? Et si l'on considere encore chaque espèce dans différens climats , on y trouvera * des variétés sensibles pour la grandeur & pour la forme ; toutes prennent une teinture plus ou moins forte du climat. Ces changemens ne se font que lentement , imperceptiblement ; le grand ouvrier de la Nature est le Temps : comme il marche toujours d'un pas égal , uniforme & réglé , il ne fait rien par sauts ; mais par degrés , par nuances , par succession ; il fait tout , & ces changemens , d'abord imperceptibles , deviennent peu-à-peu sensibles , & se marquent enfin par des résultats auxquels on ne peut se méprendre.

Cependant les animaux sauvages & libres sont peut-être , sans même en excepter l'homme , de tous les êtres vivans les moins sujets aux altérations , aux changemens , aux variations de tout genre : comme ils sont absolument les maîtres de choisir leur nourriture & leur climat , & qu'ils ne se contraignent pas plus qu'on les constraint , leur nature varie moins que celle des animaux domestiques , que l'on asservit , que l'on transporte , que l'on maltraite , & qu'on nourrit sans consulter leur goût. Les ani-

* Voyez l'*histoire du cheval , de la chèvre , du cochon , du chien , dans le volume précédent.*

maux sauvages vivent constamment de la même façon ; on ne les voit pas errer de climats en climats ; le bois où ils sont nés est une patrie à laquelle ils sont fidélement attachés , ils s'en éloignent rarement , & ne la quittent jamais que lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent y vivre en sûreté. Et ce sont moins leurs ennemis qu'ils fuient , que la présence de l'homme ; la Nature leur a donné des moyens & des ressources contre les autres animaux , ils sont de pair avec eux , ils connaissent leur force & leur adresse , ils jugent leurs desseins , leurs démarches ; & s'ils ne peuvent les éviter , au moins ils se défendent corps à corps ; ce sont , en un mot , des espèces de leur genre. Mais que peuvent-ils contre des êtres qui savent les trouver sans les voir , & les abattre sans les approcher ?

C'est donc l'homme qui les inquiète , qui les écarte , qui les disperse , & qui les rend mille fois plus sauvages qu'ils ne le seroient en effet : car la plupart ne demandent que la tranquillité , la paix , & l'usage aussi modéré qu'innocent de l'air & de la terre ; ils sont même portés par la Nature à demeurer ensemble , à se réunir en familles , à former des espèces de sociétés. On voit encore des vestiges de ces sociétés dans les pays dont l'homme ne s'est pas totalement emparé : on y voit même des ouvrages faits en commun , des espèces de projets , qui , sans être raisonnés , paroissent être fondés sur des convenances raisonnables , dont l'exécution suppose au moins l'accord , l'union

Histoire naturelle

& le concours de ceux qui s'en occupent ; & ce n'est point par force ou par nécessité physique , comme les fourmis , les abeilles , &c. que les castors travaillent & bâissent ; car ils ne sont contraints , ni par l'espace , ni par le temps , ni par le nombre ; c'est par choix qu'ils se réunissent , ceux qui se conviennent demeurent ensemble , ceux qui ne se conviennent pas s'éloignent , & l'on en voit quelques-uns qui , toujours rebutés par les autres , sont obligés de vivre solitaires. Ce n'est aussi que dans les pays reculés , éloignés , & où ils craignent peu la rencontre des hommes , qu'ils cherchent à s'établir & à rendre leur demeure plus fixe & plus commode , en y construisant des habitations , des espèces de bourgades , qui représentent assez bien les foibles travaux & les premiers efforts d'une république naissante. Dans les pays au contraire où les hommes se sont répandus , la terreur semble habiter avec eux , il n'y a plus de société parmi les animaux , toute industrie cesse , tout art est étouffé , ils ne songent plus à bâtir , ils négligent toute commodité ; toujours pressés par la crainte & la nécessité , ils ne cherchent qu'à vivre , ils ne sont occupés qu'à fuir & se cacher ; & si , comme on doit le supposer , l'espèce humaine continue dans la suite des temps à peupler également toute la surface de la terre , on pourra dans quelques siècles regarder comme une fable l'histoire de nos castors.

On peut donc dire que les animaux , loin d'aller en augmentant , vont au contraire

en diminuant de facultés & de talens ; le temps même travaille contr'eux : plus l'espèce humaine se multiplie , se perfectionne , plus ils sentent le poids d'une empire aussi terrible qu'absolu , qui leur laissant à peine leur existence individuelle , leur ôte tout moyen de liberté , toute idée de société , & détruit jusqu'au germe de leur intelligence. Ce qu'ils sont devenus , ce qu'ils deviendront encore , n'indique peut-être pas assez ce qu'ils ont été , ni ce qu'ils pourroient être. Qui fait , si l'espèce humaine étoit anéantie , auquel d'entr'eux appartiendroit le sceptre de la terre ?



LE CERF [a].

Voyez planche I, fig. 1 de ce Volume.

VOICI l'un de ces animaux innocens, doux & tranquilles, qui ne semblent être faits que pour embellir, animer la solitude des forêts, occuper loin de nous les retraites paisibles de ces jardins de la Nature. Sa forme élégante & légère, sa taille aussi svelte que bien prise, ses membres flexibles & nerveux, sa tête parée plutôt qu'armée d'un bois vivant, & qui, comme la cime des arbres, tous les ans se renouvelle, sa grandeur, sa légèreté, sa force, le distinguent assez des autres habitans des bois; & comme il est le

(a) Le Cerf; en Grec, Ελαφος; en Latin, *cervus*; en Italien, *cervo*; en Espagnol, *ciervo*; en Portugais, *reado*; en Allemand, *hirsch*; en Anglois, *red-deer*; en Danois, *hiort*; en Suédois, *kron-hiort*; en Hollandois, *hert*, en Polonois, *jelijenii*.

Cervus, Gesner. *Icon. animal. quadr.* p. 43 --- 44.

Cervus, Aldrov. *Quadr. bisulc.* p. 771 --- 774.

Cervus, Jonston. *Hist. nat. quadr.* p. 58, *tabl. XXXV*, *fig. 1.*

Cervus, Charleton, *de differ. animal.* p. 8.

Cervus, Ray, *Synopsis animal.* *quadr.* p. 84.

Cervus cornibus ramosis, teretibus, incurvatis. Linn. *Syst. nat.*

Cervus nobilis, ramis teretibus, omnibus notus. Klein. *Quadr. Hist. nat.* p. 23.



I Le Cerf. 2 La Biche.

plus noble d'entr'eux , il ne fert aussi qu'aux plaisirs des plus nobles des hommes ; il a dans tous les temps occupé le loisir des héros : l'exercice de la chasse doit succéder aux travaux de la guerre , il doit même les précéder : savoir manier les chevaux & les armes , sont des talens communs au chasseur , au guerrier : l'habitude au mouvement , à la fatigue , l'adresse , la légèreté du corps , si nécessaires pour soutenir , & même pour seconder le courage , se prennent à la chasse , & se portent à la guerre ; c'est l'école agréable d'un art nécessaire ; c'est encore le seul amusement qui fasse diversion entiere aux affaires , le seul délassement sans mollesse , le seul qui donne un plaisir vif sans langueur , sans mélange & sans satiété.

Que peuvent faire de mieux les hommes qui , par état , sont sans cesse fatigués de la présence des autres hommes ! Toujours environnés , obsédés & gênés , pour ainsi dire , par le nombre , toujours en butte à leurs demandes , à leur empressement , forcés de s'occuper de soins étrangers & d'affaires , agités par de grands intérêts , & d'autant plus contraints qu'ils sont plus élevés , les Grands ne sentiroient que le poids de la grandeur , & n'existeroient que pour les autres , s'ils ne se déroboient par instans à la foule même des flatteurs. Pour jouir de soi-même , pour appeler dans l'ame les affections personnelles , les desirs secrets , ces sentiments intimes mille fois plus précieux que les idées de la grandeur , ils ont besoin de solitude ; & quelle solitude plus variée , plus

animée que celle de la chasse ? quel exercice plus fain pour le corps ? quel repos plus agréable pour l'esprit ?

Il seroit aussi pénible de toujours représenter, que de toujours méditer. L'homme n'est pas fait par la Nature pour la contemplation des choses abstraites ; & de même que s'occuper sans relâche d'études difficiles, d'affaires épineuses, mener une vie sédentaire, & faire de son cabinet le centre de son existence, est un état peu naturel, il semble que celui d'une vie tumultueuse, agitée, entraînée, pour ainsi dire, par le mouvement des autres hommes, & où l'on est obligé de s'observer, de se contraindre, & de représenter continuellement à leurs yeux, est une situation encore plus forcée. Quelque idée que nous voulions avoir de nous-mêmes, il est aisé de sentir que représenter n'est pas être, & aussi que nous sommes moins faits pour penser que pour agir, pour raisonner que pour jouir : nos vrais plaisirs consistent dans le libre usage de nous-mêmes ; nos vrais biens sont ceux de la Nature, c'est le ciel, c'est la terre, ce sont ces campagnes, ces plaines, ces forêts dont elle nous offre la jouissance utile, inépuisable. Aussi le goût de la chasse, de la pêche, des jardins, de l'agriculture, est un goût naturel à tous les hommes ; & dans les sociétés plus simples que la nôtre, il n'y a guere que deux ordres, tous deux relatifs à ce genre de vie ; les nobles, dont le métier est la chasse & les armes ; & les hommes

hommes en sous-ordre, qui ne sont occupés qu'à la culture de la terre.

Et comme dans les sociétés policées on agrandit, on perfectionne tout; pour rendre le plaisir de la chasse plus vif & plus piquant, pour ennobrir encore cet exercice le plus noble de tous, on en a fait un art. La chasse du cerf demande des connaissances qu'on ne peut acquérir que par l'expérience : elle suppose un appareil royal, des hommes, des chevaux, des chiens, tous exercés, stylés, dressés, qui par leurs mouvements, leurs recherches & leur intelligence, doivent aussi concourir au même but. Le veneur doit juger l'âge & le sexe; il doit savoir distinguer & reconnoître précisément, si le cerf qu'il a détourné (*b*) avec son limier (*c*) est un daguet (*d*), un jeune cerf (*e*), un cerf de dix cors jeunement (*f*), un cerf de dix cors (*g*), ou un vieux cerf

(*b*) *Détourner le cerf*, c'est tourner tout autour de l'endroit où un cerf est entré, & s'assurer qu'il n'en est pas sorti.

(*c*) *Limier*, chien que l'on choisit ordinairement parmi les chiens-courans, & que l'on dresse pour détourner le cerf, le chevreuil, le sanglier, &c.

(*d*) *Daguet*, c'est un jeune cerf portant les dagues, & les dagues sont la première tête ou le premier bois du cerf, qui lui vient au commencement de la seconde année.

(*e*) *Jeune cerf*, cerf qui est dans la troisième, quatrième ou cinquième année de sa vie.

(*f*) *Cerf de dix cors jeunement*, cerf qui est dans la sixième année de sa vie.

(*g*) *Cerf de dix cors*, cerf qui est dans la septième année de sa vie.

(*h*) ; & les principaux indices qui peuvent donner cette connoissance , sont le pied (*i*) & les fumées (*k*). Le pied du cerf est mieux fait que celui de la biche ; sa jambe est (*l*) plus grosse & plus près du talon , ses voies (*m*) sont mieux tournées , & ses allures (*n*) plus grandes ; il marche plus régulièrement , il porte le pied de derrière dans celui de devant , au lieu que la biche à le pied plus mal fait , les allures plus courtes , & ne pose pas régulièrement le pied de derrière dans la trace de celui de devant. Dès que le cerf est à sa quatrième tête (*o*) , il est assez reconnaissable pour ne s'y pas méprendre ; mais il faut de l'habitude pour distinguer le pied du jeune cerf de celui de la biche ; & pour être sûr , on doit y regarder de près & en revoir (*p*) souvent. Les cerfs de dix cors jeunement , de dix cors , &c. sont encore plus aisés à reconnoître ; ils ont le pied de devant beaucoup plus gros que celui de derrière , & plus ils sont vieux , plus les côtés des pieds sont gros & usés .

(*h*) *Vieux cerf*, cerf qui est dans la huitième , neuvième , dixième , &c , année de sa vie.

(*i*) *Pied* , empreinte du pied du cerf sur la terre.

(*k*) *Fumée*, fiente du cerf.

(*l*) On appelle jambe , les deux os qui sont au bas de la partie postérieure , & qui font trace sur la terre avec le pied.

(*m*) *Voies*, ce sont les pas du cerf.

(*n*) *Allures du cerf*, distance de ses pas

(*o*) *Tête*, bois ou cornes du cerf.

(*p*) *En revoir*, c'est avoir des indices du cerf par le pied.

(q) : ce qui se juge aisément par les allures qui sont aussi plus régulières que celles des jeunes cerfs , le pied de derrière posant toujours assez exactement sur le pied de devant , à moins qu'ils n'ayent mis bas leurs têtes , car alors les vieux cerfs se méjagent (r) presque autant que les jeunes , mais d'une maniere différente , & avec une sorte de régularité que n'ont ni les jeunes cerfs ni les biches ; ils posent le pied de derrière à côté de celui de devant , & jamais au-delà ni en deçà .

Lorsque le veneur , dans les sécheresses de l'été , ne peut juger par le pied , il est obligé de suivre le contre-pied (s) de la bête pour tâcher de trouver les fumées , & de la reconnoître par cet indice qui demande autant & peut - être plus d'habitude que la connoissance du pied ; sans cela , il ne lui seroit pas possible de faire un rapport juste à l'assemblée des chasseurs . Et lorsque sur ce rapport l'on aura conduit les chiens - à ses brisées (t) , il doit encore savoir

(q) Nota que comme le pied du cerf s'use plus ou moins suivant la nature des terrains qu'il habite , il ne faut entendre ceci que de la comparaison entre cerfs du même pays , & que par conséquent il faut avoir d'autres connaissances , parce que dans le temps du rut en court souvent des cerfs venus de loin .

(r) Se méjuger , c'est , pour le cerf , mettre le pied de derrière hors de la trace de celui de devant .

(s) Suivre le contre pied , c'est suivre les traces à rebours .

(t) Brisées , endroit où le cerf est entré , & où l'on a rompu des branches pour le remarquer .

animer son limier, & le faire appuyer sur les voies jusqu'à ce que le cerf soit lancé dans cet instant celui qui laisse courre (*u*), sonne pour faire découpler les chiens (*x*), & dès qu'ils le sont, il doit les appuyer de la voix & de la trompe ; il doit aussi être connoisseur, & bien remarquer le pied de son cerf, afin de le reconnoître dans le change (*y*) ou dans le cas qu'il soit accompagné. Il arrive souvent alors que les chiens se séparent, & font deux chasses : les piqueurs (*z*) doivent se séparer aussi & rompre les chiens (*a*) qui se sont fourvoyés (*b*), pour les ramener & les rallier à ceux qui chassent le cerf de meute. Le piqueur doit bien accompagner ses chiens, toujours piquer à côté d'eux, toujours les animer sans trop les presser, les aider sur le change, sur un retour, & pour ne se pas méprendre, tâcher de revoir du cerf aussi souvent qu'il est possible ; car il ne manque jamais de faire des ruses, il passe &

(*u*) *Laisser courre un cerf*, c'est le lancer avec le limier, c'est-à-dire, le faire partir.

(*x*) *Découpler les chiens*, c'est détacher les chiens l'un d'avec l'autre pour les faire chasser.

(*y*) *Change*, c'est lorsque le cerf en va chercher un autre pour le substituer à sa place.

(*z*) *Les piqueurs*, sont ceux qui courrent à cheval après les chiens, & qui les accompagnent pour les faire chasser.

(*a*) *Rompre les chiens*, c'est les rappeler & leur faire quitter ce qu'ils chassent.

(*b*) *Se fouroyer*, c'est s'écartez de la voie, & chasser quelqu'autre cerf que celui de la meute.

repasse souvent deux ou trois fois sur sa voie, il cherche à se faire accompagner d'autres bêtes pour donner le change, & alors il perce & s'éloigne tout de suite, ou bien il se jette à l'écart, se cache, reste sur le ventre. Dans ce cas, lorsqu'on est en défaut (*c*), on prend les devans, on retourne sur les derrières; les piqueurs & les chiens travaillent de concert: si l'on ne retrouve pas la voie du cerf, on juge qu'il est resté dans l'enceinte dont on vient de faire le tour, on la foule de nouveau; & lorsque le cerf ne s'y trouve pas, il ne reste d'autre moyen que d'imaginer la refuite qu'il peut avoir faite, vu le pays où l'on est, & d'aller l'y chercher. Dès qu'on sera retombé sur les voies, & que les chiens auront relevé le défaut (*d*), ils chasseront avec plus d'avantage, parce qu'ils sentent bien que le cerf est déjà fatigué, leur ardeur augmente à mesure qu'il s'affoiblit, & leur sentiment est d'autant plus distinct & plus vif, que le cerf est plus échauffé; aussi redoublent-ils & de jambes & de voix, & quoiqu'il fasse alors plus de ruses que jamais, comme il ne peut plus courir aussi vite, ni par conséquent s'éloigner beaucoup des chiens, ses ruses & ses détours sont inutiles, il n'a d'autre ressource que de fuir la terre qui le trahit, & de se jeter à l'eau pour dé-

(*c*) *Etre en défaut*, c'est lorsque les chiens ont perdu la voie du cerf.

(*d*) *Relever le défaut*, c'est retrouver les voies du cerf, & le lancer une seconde fois.

rober son sentiment aux chiens. Les piqueurs traversent ces eaux , ou bien ils tournent autour , & remettent ensuite les chiens sur la voie du cerf , qui ne peut aller loin dès qu'il a battu l'eau (e), & qui bientôt est aux abois (f) , où il tâche encore de défendre sa vie , & blesse souvent de coups d'andouillers les chiens & même les chevaux des chasseurs trop ardents, jusqu'à ce que l'un d'entr'eux lui coupe le jarret pour le faire tomber , & l'achève ensuite en lui donnant un coup de couteau au défaut de l'épaule. On célèbre en même temps la mort du cerf par des fanfares , on le laisse fouler aux chiens , & on les fait jouir pleinement de leur victoire en leur faisant curée (g).

Toutes les saisons , tous les temps ne sont pas également bons pour courre le cerf (h): au printemps , lorsque les feuilles naissantes commencent à parer les forêts , que la terre se couvre d'herbes nouvelles , & s'émaille de fleurs , leur parfum rend moins sûr le sentiment des chiens ; & comme le cerf est alors dans sa plus grande vigueur , pour peu qu'il ait d'avance , ils ont beau-

(e) *Battre l'eau , battre les eaux* , c'est traverser , après avoir été long-temps chassé , une rivière ou un étang.

(f) *Abois* , c'est lorsque le cerf est à l'extrême et tout-à-fait épuisé de forces.

(g) *Faire curée , donner la curée* , c'est faire manger aux chiens le cerf ou la bête qu'ils ont prise.

(h) *Courre le cerf* , chasser le cerf avec des chiens courans.

coup de peine à le joindre. Aussi les chasseurs conviennent-ils que la saison où les biches sont prêtes à mettre bas, est celle de toutes où la chasse est la plus difficile, & que dans ce temps les chiens quittent souvent un cerf mal mené, pour tourner à une biche qui bondit devant eux; & de même au commencement de l'automne, lorsque le cerf est en rut (*i*), les limiers quêtent sans ardeur; l'odeur forte du rut leur rend peut-être la voie plus indifférente; peut-être aussi tous les cerfs ont-ils dans ce temps à-peu-près la même odeur. En hiver, pendant la neige, on ne peut pas courre le cerf, les limiers n'ont point de sentiment, & semblent suivre les voies plutôt à l'œil qu'à l'odorat. Dans cette saison, comme les cerfs ne trouvent pas à viander (*k*) dans les forts, ils en sortent, vont & viennent dans les pays plus découverts, dans les petits taillis, & même dans les terres ense-mencées; ils se mettent en hardes (*l*) dès le mois de décembre, & pendant les grands froids ils cherchent à se mettre à l'abri des côtes, ou dans des endroits bien fourrés où ils se tiennent serrés les uns contre les autres, & se réchauffent de leur haleine. À la fin de l'hiver, ils gagnent le bord des forêts, & sortent dans les blés. Au printemps,

(*i*) *Rut*, chaleur, ardeur d'amour.

(*k*) *Viander*, brouter, manger.

(*l*) *Harde*, troupe de cerfs.

ils mettent bas (*m*) , la tête se détache d'elle-même , ou par un petit effort qu'ils font en s'accrochant à quelque branche : il est rare que les deux côtés tombent précisément en même temps , & souvent il y a un jour ou deux d'intervalle entre la chute de chacun des côtés de la tête, Les vieux cerfs sont ceux qui mettent bas les premiers , vers la fin de fevrier , ou au commencement de mars , les cerfs de dix cors ne mettent bas que vers le milieu ou la fin de mars ; ceux de dix cors jeunement dans le mois d'avril ; les jeunes cerfs au commencement , & les daguets vers le milieu & la fin de mai ; mais il y a sur tout cela beaucoup de variétés , & l'on voit quelquefois de vieux cerfs mettre bas plus tard que d'autres qui sont plus jeunes. Au reste , la mue de la tête des cerfs avance lorsque l'hiver est doux ; & retarde lorsqu'il est rude & de longue durée.

Dès que les cerfs ont mis bas , ils se séparent les uns des autres , & il n'y a plus que les jeunes qui demeurent ensemble ; ils ne se tiennent pas dans les forts , mais ils gagnent les beaux pays , les buissons , les taillis clairs , où ils demeurent tout l'été pour y refaire leur tête ; & dans cette saison ils marchent la tête basse , crainte de la froisser contre les branches , car elle est sensible tant qu'elle n'a pas pris son entier accroissement. La tête des plus vieux cerfs n'est encore qu'à moitié refaite vers le milieu du

(m) Mettre bas , c'est lorsque le bois du cerf tombe,
meis

mois de mai , & n'est tout-à fait alongée & endurcie que vers la fin de juillet : celle des plus jeunes cerfs tombant plus tard, repousse & se refait aussi plus tard ; mais dès qu'elle est entièrement alongée , & qu'elle a pris de la solidité, les cerfs la frottent contre les arbres pour la dépouiller de la peau dont elle est revêtue ; & comme ils continuent à la frotter pendant plusieurs jours de suite , on prétend (*n*) qu'elle se teint de la couleur de la sève du bois auquel ils touchent , qu'elle devient roussie contre les hêtres & les bouleaux , brune contre les chênes , & noirâtre contre les charmes & les trembles . On dit aussi que les têtes des jeunes cerfs , qui sont lisses & peu perlées , ne se teignent pas à beaucoup près autant que celles des vieux cerfs , dont les perlures sont fort près les unes des autres , parce que ce sont ces perlures qui retiennent la sève qui colore le bois ; mais je ne puis me persuader que ce soit là la vraie cause de cet effet , ayant eu des cerfs privés & enfermés dans des enclos où il n'y avoit aucun arbre , & où par conséquent ils n'avoient pu toucher au bois , desquels cependant la tête étoit colorée comme celle des autres .

Peu de temps après que les cerfs ont bruni leur tête , ils commencent à ressentir les impressions du rut ; les vieux sont les plus avancés : dès la fin d'août & le commence-

(*n*) Voyez le Nouveau Traité de la Vénerie, Parks 1750 , page 27.

ment de septembre , ils quittent les buissons , reviennent dans les forts , & commencent à chercher les bêtes (o) ; ils rairent (p) d'une voix forte ; le cou & la gorge leur enflent , ils se tourmentent , ils traversent en plein jour les guérêts & les plaines , ils donnent de la tête contre les arbres & les sépées ; enfin ils paroissent transportés , furieux , & courrent de pays en pays jusqu'à ce qu'ils ayent trouvé des bêtes , qu'il ne suffit pas de rencontrer , mais qu'il faut encore poursuivre , contraindre , assujettir : car elles les évitent d'abord , elles fuient & ne les attendent qu'après avoir été long-temps fatiguées de leur poursuite . C'est aussi par les plus vieilles que commence le rut ; les jeunes biches n'entrent en chaleur que plus tard ; & lorsque deux cerfs se trouvent auprès de la même , il faut encore combattre avant que de jouir : s'ils sont d'égale force , ils se menacent , ils grattent la terre , ils rairent d'un cri terrible , & se précipitant l'un sur l'autre , ils se battent à outrance , & se donnent des coups de tête & d'andouillers (q) si forts , que souvent ils se blessent à mort . Le combat ne finit que par la défaite ou la fuite de l'un des deux , & alors le vainqueur ne perd pas un instant pour jouir de sa victoire & de ses désirs , à moins qu'un autre ne survienne encore , auquel cas il part pour

(o) *Les bêtes* , en terme de chasse , signifient les biches .

(p) *Raire* , crier .

(q) *Andouillers* , cornichon du bois de cerf .

L'attaquer & le faire fuir comme le premier. Les plus vieux cerfs sont toujours les maîtres, parce qu'ils sont plus fiers & plus hardis que les jeunes qui n'osent approcher d'eux ni de la bête, & qui sont obligés d'attendre qu'ils l'ayent quittée pour l'avoir à leur tour: quelquefois cependant ils sautent sur la biche pendant que les vieux combattent; & après avoir joui fort à la hâte, ils fuient promptement. Les biches préfèrent les vieux cerfs, non pas parce qu'ils sont plus courageux, mais parce qu'ils sont beaucoup plus ardents & plus chauds que les jeunes; ils sont aussi plus inconstans, ils ont souvent plusieurs bêtes à la fois; & lorsqu'ils n'en ont qu'une, ils ne s'y attachent pas, ils ne la gardent que quelques jours, après quoi ils s'en séparent, & vont en chercher une autre auprès de laquelle ils demeurent encore moins, & passent ainsi successivement à plusieurs jusqu'à ce qu'ils soient tout-à-fait épuisés.

Cette fureur amoureuse ne dure que trois semaines; pendant ce temps ils ne mangent que très peu, ne dorment ni ne reposent; nuit & jour ils sont sur pied, & ne font que marcher, courir, combattre & jouir; aussi sortent-ils de-là si défaits, si fatigués, si maigres, qu'il leur faut du temps pour se remettre & reprendre des forces: ils se retiennent ordinairement alors sur le bord des forêts, le long des meilleurs gagnages, où ils peuvent trouver une nourriture abondante, & ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils soient rétablis. Le rut, pour les vieux cerfs, com-

mence au premier de septembre , & finit vers le 20 ; pour les cerfs de dix cors , & de dix cors jeunement , il commence vers le 10 de septembre , & finit dans les premiers jours d'octobre ; pour les jeunes cerfs , c'est depuis le 20 septembre jusqu'au 15 octobre ; & sur la fin de ce même mois , il n'y a plus que les daguets qui sont en rut , parce qu'ils y sont entrés les derniers de tous ; les plus jeunes biches sont de même les dernières en chaleur . Le rut est donc entièrement fini au commencement de novembre , & les cerfs dans ce temps de foiblesse sont faciles à forcer . Dans les années abondantes en gland , ils se rétablissent en peu de temps , par la bonne nourriture ; & l'on remarque souvent un second rut à la fin d'octobre , mais qui dure beaucoup moins que le premier .

Dans les climats plus chauds que celui de la France , comme les saisons sont plus avancées , le rut est aussi plus précoce . En Grèce (r) , par exemple , il paroît par ce qu'en dit Aristote , qu'il commence dans les premiers jours d'août , & qu'il finit à la fin de septembre . Les biches portent huit mois & quelques jours ; elles ne produisent ordinairement qu'un faon (s) , très rarement deux ; elles mettent bas au mois de mai & au commencement de juin ; elles ont grand soin de dérober leur faon à la poursuite des chiens , elles se présentent & se font chasser elles-

(r) *Aristot. Hist. animal. lib. VI , cap. 29.*

(s) Faon , c'est le petit cerf qui vient de naître .

mêmes pour les éloigner, après quoi elles viennent le rejoindre. Toutes les biches ne sont pas fécondes; il y en a qu'on appelle *brehaignes*, qui ne portent jamais; ces biches sont plus grosses & prennent beaucoup plus de venaison que les autres, aussi sont-elles les premières en chaleur: on prétend aussi qu'il se trouve quelquefois des biches qui ont un bois comme le cerf, & cela n'est pas absolument contre toute vraisemblance. Le faon ne porte ce nom que jusqu'à six mois environ (*voyez pl. III, fig. 3 de ce vol.*): alors les bosses commencent à paroître, & il prend le nom de hère jusqu'à ce que ces bosses alongées en dagues lui fassent prendre le nom de daguet. Il ne quitte pas sa mère dans les premiers temps, quoiqu'il prenne un assez prompt accroissement; il la suit pendant tout l'été. En hiver, les biches, les hères, les daguets & les jeunes cerfs se rassemblent en hardes, & forment des troupes d'autant plus nombreuses que la saison est plus rigoureuse. Au printemps ils se divisent, les biches se recèlent pour mettre bas; & dans ce temps il n'y a guere que les daguets & les jeunes cerfs qui aillent ensemble. En général, les cerfs sont portés à demeurer les uns avec les autres, à marcher de compagnie; & ce n'est que la crainte ou la nécessité qui les disperse ou les sépare.

Le cerf est en état d'engendrer à l'âge de dix-huit mois; car on voit des daguets, c'est-à-dire, des cerfs nés au printemps de l'année précédente, couvrir des biches en au-

tomne, & l'on doit présumer que ces accouplements sont prolifiques. Ce qui pourroit peut-être en faire douter, c'est qu'ils n'ont encore pris alors qu'environ la moitié ou les deux tiers de leur accroissement; que les cerfs croissent & grossissent jusqu'à l'âge de huit ans, & que leur tête va toujours en augmentant tous les ans jusqu'au même âge: mais il faut observer que le faon qui vient de naître se fortifie en peu de temps; que son accroissement est prompt dans la première année, & ne se ralentit pas dans la seconde; qu'il y a même déjà surabondance de nourriture, puisqu'il pousse des dagues; & c'est là le signe le plus certain de la puissance d'engendrer. Il est vrai que les animaux en général ne sont en état d'engendrer que lorsqu'ils ont pris la plus grande partie de leur accroissement; mais ceux qui ont un temps marqué pour le rut, ou pour le frai, semblent faire une exception à cette loi. Les poissons fraient & produisent avant que d'avoir pris le quart, ou même la huitième partie de leur accroissement; & dans les animaux quadrupèdes, ceux qui, comme le cerf, l'élan, le daim, le renne, le chevreuil, &c. ont un rut bien marqué, engendrent aussi plutôt que les autres animaux.

Il y a tant de rapports entre la nutrition, la production du bois, le rut & la génération dans ces animaux, qu'il est nécessaire, pour en bien concevoir les effets particuliers, de se rappeler ici ce que nous avons établi de plus général & de plus certain au-

sujet de la génération (*t*) : elle dépend en entier de la surabondance de la nourriture. Tant que l'animal croît (& c'est toujours dans le premier âge que l'accroissement est le plus prompt), la nourriture est entièrement employée à l'extension, au développement du corps ; il n'y a donc nulle surabondance, par conséquent nulle production, nulle sécrétion de liqueur séminale, & c'est par cette raison que les jeunes animaux ne font pas en état d'engendrer ; mais lorsqu'ils ont pris la plus grande partie de leur accroissement, la surabondance commence à se manifester par de nouvelles productions. Dans l'homme, la barbe, le poil, le gonflement des mamelles, l'épanouissement des parties de la génération, précédent la puberté. Dans les animaux en général, & dans le cerf en particulier, la surabondance se marque par des effets encore plus sensibles ; elle produit la tête, le gonflement des daintiers (*u*), l'enflure du cou & de la gorge, la venaïson (*x*), le rut, &c. Et comme le cerf croît fort vite dans le premier âge, il ne se passe qu'un an depuis sa naissance jusqu'au temps où cette surabondance commence à se marquer au dehors par la production du bois :

(*t*) Voyez les chapitres II, III & IV du troisième volume de cet Ouvrage, dans lesquels il est question de la reproduction, de la nutrition & de la génération.

(*u*) *Les daintiers du cerf* sont ses testicules.

(*x*) *Venaïson*, c'est la graisse du cerf qui augmente pendant l'été, & dont il est surchargé au commencement de l'automne, dans le temps du rut.

s'il est né au mois de mai , on verra paroître dans le même mois de l'année suivante les naissances du bois qui commence à pousser sur le têt (y). Ce sont deux dagues qui croissent , s'allongent & s'endurcissent à mesure que l'animal prend de la nourriture ; elles ont déjà vers la fin d'août pris leur entier accroissement , & assez de solidité pour qu'il cherche à les dépouiller de leur peau en les frottant contre les arbres ; & dans le même temps il achieve de se charger de venaïson , qui est une graisse abondante produite aussi par le superflu de la nourriture , qui dès lors commence à se déterminer vers les parties de la génération , & à exciter le cerf à cette ardeur du rut qui le rend furieux . Et ce qui prouve évidemment que la production du bois & celle de la liqueur séminale dépendent de la même cause , c'est que si vous detruisez la source de la liqueur séminale en supprimant par la castration les organes nécessaires pour cette sécrétion , vous supprimez en même temps la production du bois ; car si l'on fait cette opération dans le temps qu'il a mis bas sa tête , il ne s'en forme pas une nouvelle ; & si on ne la fait au contraire que dans le temps qu'il a refait sa tête , elle ne tombe plus , l'animal en un mot reste pour toute la vie dans l'état où il étoit lorsqu'il a subi la castration ; & comme il n'éprouve plus les ardeurs du rut , les si-

(y) *Le têt* , est la partie de l'os frontal sur laquelle appuie le bois du cerf.

gnes qui l'accompagnent disparaissent aussi , il n'y a plus de venaïson , plus d'enflure au cou ni à la gorge , & il devient d'un naturel plus doux & plus tranquille . Ces parties que l'on a retranchées étoient donc nécessaires , non-seulement pour faire la sécrétion de la nourriture surabondante , mais elles servoient encore à l'animer , à la pousser au dehors dans toutes les parties du corps sous la forme de la venaïson , & en particulier au sommet de la tête , où elle se manifeste plus que par-tout ailleurs par la production du bois . Il est vrai que les cerfs coupés ne laissent pas de devenir gras , mais ils ne produisent plus de bois , jamais la gorge ni le cou ne leur enflent , & leur graisse ne s'exalte ni ne s'échauffe pas comme la venaïson des cerfs entiers qui , lorsqu'ils sont en rut , ont une odeur si forte , qu'elle infecte de loin ; leur chair même en est si fort imbue & pénétrée , qu'on ne peut ni la manger , ni la sentir , & qu'elle se corrompt en peu de temps ; au lieu que celle du cerf coupé se conserve fraîche , & peut se manger dans tous les temps . Une autre preuve que la production du bois vient uniquement de la surabondance de la nourriture , c'est la différence qui se trouve entre les têtes des cerfs de même âge , dont les unes sont très grosses , très fournies , & les autres grèles & menues , ce qui dépend absolument de la quantité de la nourriture ; car un cerf qui habite un pays abondant , où il viande à son aise , où il n'est troublé ni par les chiens , ni par les hommes , où après avoir repu tran-

quillement, il peut ensuite ruminer en repos, aura toujours la tête belle, haute, bien ouverte, l'empaumure (7) large & bien garnie, le mérain (a) gros & bien perlé, avec grand nombre d'andouillers forts & longs; au lieu que celui qui se trouve dans un pays où il n'a ni repos, ni nourriture suffisante, n'aura qu'une tête mal nourrie, dont l'empaumure sera ferrée, le mérain grêle, & les andouillers menus & en petit nombre; en sorte qu'il est toujours aisément de juger par la tête d'un cerf, s'il habite un pays abondant & tranquille, ou s'il a été bien ou mal nourri. Ceux qui se portent mal, qui ont été blessés ou seulement qui ont été inquiétés & courus, prennent rarement une belle tête & une bonne venaison, ils n'entrent en rut que plus tard, il leur a fallu plus de temps pour refaire leur tête, & ils ne la mettent bas qu'après les autres. Ainsi, tout concourt à faire voir que ce bois n'est, comme la liqueur séminale, que le superflu, rendu sensible, de la nourriture organique qui ne peut être employée toute entière au développement, à l'accroissement ou à l'entretien du corps de l'animal.

La disette retarde donc l'accroissement du bois, & en diminue le volume très considérablement; peut-être même ne seroit-il pas

(7) *Empaumure*, c'est le haut de la tête du cerf, qui s'élargit comme une main, & où il y a plusieurs andouillers rangés inégalement comme des doigts.

(a) *Mérain*, c'est le tronc, la tige du bois de cerf.

impossible, en retranchant beaucoup la nourriture, de supprimer en entier cette production, sans avoir recours à la castration : ce qu'il y a de sûr, c'est que les cerfs coupés mangent moins que les autres ; & ce qui fait que dans cette espèce, aussi-bien que dans celle du daim, du chevreuil & de l'élan, les femelles n'ont point de bois, c'est qu'elles mangent moins que les mâles, & que quand même il y auroit de la surabondance, il arrive que dans le temps où elle pourroit se manifester au dehors, elles deviennent pleines ; par conséquent le superflu de la nourriture étant employé à nourrir le fœtus & ensuite à allaiter le faon, il n'y a jamais rien de surabondant. Et l'exception que peut faire ici la femelle du renne, qui porte un bois comme le mâle, est plus favorable que contraire à cette explication ; car de tous les animaux qui portent un bois, le renne est celui qui, proportionnellement à sa taille, l'a d'un plus gros & d'un plus grand volume, puisqu'il s'étend en avant & en arrière, souvent tout le long de son corps : c'est aussi de tous celui qui se charge le plus abondamment (*b*) de venaison ; & d'ailleurs le bois que portent les femelles est fort petit en

(*b*) Le rangier [*c'est le renne*] est une bête semblable au cerf, & a sa tête diverse, plus grande & chevillée ; il porte bien quatre-vingt cors, aucune fois moins, sa tête lui couvre le corps ; il a plus grande venaison que n'a un cerf en sa saison. Voyez la chasse du Roi Phœbus, imprimée à la suite de la Venerie de du Fouilloux, *Rouen*, 1650, page 97.

comparaison de celui des mâles. Cet exemple prouve donc seulement que quand la surabondance est si grande qu'elle ne peut être épuisée dans la gestation par l'accroissement du fœtus , elle se répand au dehors , & forme dans la femelle , comme dans le mâle , une production semblable , un bois qui est d'un plus petit volume , parce que cette surabondance est aussi en moindre quantité.

Ce que je dis ici de la nourriture ne doit pas s'entendre de la masse ni du volume des alimens , mais uniquement de la quantité des molécules organiques que contiennent ces alimens : c'est cette seule matière qui est vivante , active & productrice ; le reste n'est qu'un marc , qui peut être plus ou moins abondant sans rien changer à l'animal. Et comme le lichen , qui est la nourriture ordinaire du renne , est un aliment plus substantiel que les feuilles , les écorces ou les boutons des arbres dont le cerf se nourrit , il n'est pas étonnant qu'il y ait plus de surabondance de cette nourriture organique , & par conséquent plus de bois & plus de vénaison dans le renne que dans le cerf. Cependant il faut convenir que la matière organique qui forme le bois dans ces espèces d'animaux , n'est pas parfaitement dépouillée des parties brutes auxquelles elle étoit jointe , & qu'elle conserve encore ; après avoir passé par le corps de l'animal , des caractères de son premier état dans le végétal. Le bois du cerf pousse , croît & se compose comme le bois d'un arbre : sa substance

est peut - être moins osseuse que ligneuse ; c'est , pour ainsi dire , un végétal greffé sur un animal , & qui participe de la nature des deux , & forme une de ces nuances auxquelles la nature aboutit toujours dans les extrêmes , & dont elle se sert pour rapprocher les choses les plus éloignées .

Dans l'animal , comme nous l'avons dit (c) , les os croissent par les deux extrémités à la fois ; le point d'appui contre lequel s'exerce la puissance de leur extension en longueur , est dans le milieu de la longueur de l'os : cette partie du milieu est aussi la première formée , la première ossifiée ; & les deux extrémités vont toujours en s'éloignant de la partie du milieu , & restent molles jusqu'à ce que l'os ait pris son entier accroissement dans cette dimension . Dans le végétal au contraire , le bois ne croît que par une seule de ses extrémités ; le bouton qui se développe & qui doit former la branche , est attaché au vieux bois par l'extrémité inférieure , & c'est sur ce point d'appui que s'exerce la puissance de son extension en longueur . Cette différence si marquée entre la végétation des os des animaux & des parties solides des végétaux , ne se trouve point dans le bois qui croît sur la tête des cerfs ; au contraire , rien n'est plus semblable à l'accroissement du bois d'un arbre : le bois du cerf ne s'étend que par l'une de ses extrémi-

(c) Voyez l'article de la vieillesse & de la mort , dans quatrième volume de cet ouvrage .

tés, l'autre lui sert de point d'appui; il est d'abord tendre comme l'herbe, & se durcit ensuite comme le bois; la peau qui s'étend & qui croît avec lui, est son écorce, & il s'en dépouille lorsqu'il a pris son entier accroissement; tant qu'il croît, l'extrémité supérieure demeure toujours molle; il se divise aussi en plusieurs rameaux; le mérain est l'arbre, les andouillers en sont les branches; en un mot, tout est semblable, tout est conforme dans le développement & dans l'accroissement de l'un & de l'autre, & dès-lors les molécules organiques qui constituent la substance vivante du bois de cerf, retiennent encore l'empreinte du végétal, parce qu'elles s'arrangent de la même façon que dans les végétaux. La matière domine donc ici sur la forme: le cerf, qui n'habite que dans les bois, & qui ne se nourrit que des rejetons des arbres, prend une si forte teinture de bois, qu'il produit lui-même une espèce de bois qui conserve assez les caractères de son origine pour qu'on ne puisse s'y méprendre; & cet effet, quoique très singulier, n'est cependant pas unique, il dépend d'une cause générale que j'ai déjà eu occasion d'indiquer plus d'une fois dans cet ouvrage.

Ce qu'il y a de plus constant, de plus inaltérable dans la nature, c'est l'empreinte ou le moule de chaque espèce, tant dans les animaux que dans les végétaux; ce qu'il y a de plus variable & de plus corruptible, c'est la substance qui les compose. La matière en général paroît être indifférente à recevoir

telle ou telle forme , & capable de porter toutes les empreintes possibles : les molécules organiques , c'est-à-dire , les parties vivantes de cette matière , passent des végétaux aux animaux , sans destruction , sans altération , & forment également la substance vivante de l'herbe , du bois , de la chair & des os. Il paroît donc à cette première vue que la matière ne peut jamais dominer sur la forme , & que quelque espèce de nourriture que prenne un animal , pourvu qu'il puisse en tirer les molécules organiques qu'elle contient , & se les assimiler par la nutrition , cette nourriture ne pourra rien changer à sa forme , & n'aura d'autre effet que d'entretenir ou faire croître son corps en se modelant sur toutes les parties du moule intérieur , & en les pénétrant intimement : ce qui le prouve , c'est qu'en général les animaux qui ne vivent que d'herbe , qui paroît être une substance très différente de celle de leur corps , tirent de cette herbe de quoi faire de la chair & du sang ; que même ils se nourrissent , croissent & grossissent autant & plus que les animaux qui ne vivent que de chair. Cependant en observant la nature plus particulièrement , on s'apercevra que quelquefois ces molécules organiques ne s'assimilent pas parfaitement au moule intérieur , & que souvent la matière ne laisse pas d'influer sur la forme d'une manière assez sensible : la grandeur , par exemple , qui est un des attributs de la forme , varie dans chaque espèce suivant les différens climats ; la qualité , la quantité de

la chair , qui sont d'autres attributs de la forme , varient suivant les différentes nourritures. Cette matière organique que l'animal assimile à son corps par la nutrition , n'est donc pas absolument indifférente à recevoir telle ou telle modification ; elle n'est pas absolument dépouillée de la forme qu'elle avoit auparavant , & elle retient quelques caractères de l'empreinte de son premier état ; elle agit donc elle-même par sa propre forme sur celle du corps organisé qu'elle nourrit ; & quoique cette action soit presque insensible , que même cette puissance d'agir soit infinitement petite en comparaison de la force qui constraint cette matière nutritive à s'assimiler au moule qui la reçoit , il doit en résulter avec le temps des effets très sensibles. Le cerf , qui n'habite que les forêts , & qui ne vit , pour ainsi dire , que de bois , porte une espèce de bois , qui n'est qu'un résidu de cette nourriture : le castor qui habite les eaux , & qui se nourrit de poisson , porte une queue couverte d'écailles : la chair de la loutre & de la plupart des oiseaux de rivière est un aliment de carême , une espèce de chair de poisson. L'on peut donc présumer que des animaux auxquels on ne donneroit jamais que la même espèce de nourriture , prendroient en assez peu de temps une teinture des qualités de cette nourriture , & que quelque forte que soit l'empreinte de la nature , si l'on continuoit toujours à ne leur donner que le même aliment , il en résulteroit avec le temps une espèce de transformation par une assimilation toute contraire à la première

mière ; ce ne seroit plus la nourriture qui s'assimileroit en entier à la forme de l'animal , mais l'animal qui s'assimileroit en partie à la forme de la nourriture , comme on le voit dans le bois du cerf & dans la queue du castor.

Le bois , dans le cerf , n'est donc qu'une partie accessoire , & , pour ainsi dire , étrangere à son corps , une production qui n'est regardée comme partie animale que parce qu'elle croît sur un animal , mais qui est vraiment végétale , puisqu'elle retient les caractères du végétal dont elle tire sa première origine , & que ce bois ressemble au bois des arbres par la maniere dont il croît , dont il se développe , se ramifie , se durcit , se sèche & se sépare ; car il tombe de lui-même après avoir pris son entiere solidité , & dès qu'il cesse de tirer de la nourriture , comme un fruit dont la pédicule se détache de la branche dans le temps de sa maturité ; le nom même qu'on lui a donné dans notre langue , prouve bien qu'on a regardé cette production comme un bois , & non pas comme une corne , un os , une défense , une dent , &c. Et quoique cela me paroisse suffisamment indiqué , & même prouvé , par tout ce que je viens de dire , je ne dois pas oublier un fait cité par les Anciens. Aristote (d) , Théophraste (e) , Pline

(d) *Captus jam cervus est. hederam suis enatam cornibus gerens viridem, que cornu adhuc tenello forte inserta, quasi ligno viridi coaruerit.* Arist. Hist. anim. lib. IX, cap. v.

(e) *Hedera in multis creatur, & quod mirabilius, visa*

(f), disent tous que l'on a vu du lierre s'attacher, pousser & croître sur le bois des cerfs, lorsqu'il est encore tendre : si ce fait est vrai, & il feroit facile de s'en assurer par l'expérience, il prouveroit encore mieux l'analogie intime de ce bois avec le bois des arbres.

Non-seulement les cornes & les défenses des autres animaux sont d'une substance très différente de celle du bois du cerf, mais leur développement, leur texture, leur accroissement & leur forme, tant extérieure qu'intérieure, n'ont rien de semblable ni même d'analogue au bois. Ces parties, comme les ongles, les cheveux, les crins, les plumes, les écailles, croissent à la vérité par une espèce de végétation, mais bien différente de la végétation du bois. Les cornes dans les bœufs, les chèvres, les gazelles, &c. sont creuses en dedans, au lieu que le bois du cerf est solide dans toute son épaisseur : la substance de ces cornes est la même que celle des ongles, des ergots, des écailles ; celle du bois de cerf, au contraire, ressemble plus au bois qu'à toute autre substance. Toutes ces cornes creuses sont revêtues en dedans d'un périoste, & contiennent dans leur cavité un os qui les soutient & leur fert de noyau ;

est in cornibus cervi etiam aliquando. Commonit [inquit Jul. Scaliger apud Theophrastum] virum accuratum cervi cornibus hærens hedera : quid enim eo seminum deputat, &c. lib. II, de Caus. Plant. cap. xxiii.

(f) *In mollioribus cervarum cornibus hedera coalescit, dum ex arborum attritu illa experiuntur. Plin. de admirand. auditionibus.*

elles ne tombent jamais, & elles croissent pendant toute la vie de l'animal, en sorte qu'on peut juger son âge par les nœuds ou cercles annuels de ses cornes. Au lieu de croître comme le bois du cerf, par leur extrémité supérieure, elles croissent au contraire comme les ongles, les plumes, les cheveux, par leur extrémité inférieure. Il en est de même des défenses de l'éléphant, de la vache marine, du sanglier & de tous les autres animaux, elles sont creuses en dedans, & elles ne croissent que par leur extrémité inférieure : ainsi, les cornes & les défenses n'ont pas plus de rapport que les ongles, le poil ou les plumes, avec le bois du cerf.

Toutes les végétations peuvent donc se réduire à trois espèces ; la première, où l'accroissement se fait par l'extrémité supérieure, comme dans les herbes, les plantes, les arbres, le bois du cerf & tous les autres végétaux ; la seconde, où l'accroissement se fait au contraire par l'extrémité inférieure, comme dans les cornes, les ongles, les ergots, le poil, les cheveux, les plumes, les écailles, les défenses, les dents & les autres parties extérieures du corps des animaux ; la troisième est celle où l'accroissement se fait à la fois par les deux extrémités, comme dans les os, les cartilages, les muscles, les tendons & les autres parties intérieures du corps des animaux : toutes trois n'ont pour cause matérielle que la surabondance de la nourriture organique, & pour effet que l'assimilation de cette nourriture au moule qui la reçoit. Ainsi, l'animal croît plus ou moins vite à

proportion de la quantité de cette nourriture ; & lorsqu'il a pris la plus grande partie de son accroissement , elle se détermine vers les réservoirs séminaux , & cherche à se répandre au dehors , & à produire , au moyen de la copulation , d'autres êtres organisés. La différence qui se trouve entre les animaux qui comme le cerf , ont un temps marqué pour le rut , & les autres animaux qui peuvent engendrer en tout temps , ne vient encore que de la maniere dont ils se nourrissent. L'homme & les animaux domestiques , qui tous les jours prennent à-peu-près une égale quantité de nourriture , souvent même trop abondante , peuvent engendrer en tout temps : le cerf au contraire , & la plupart des autres animaux sauvages , qui souffrent pendant l'hiver une grande disette , n'ont rien alors de surabondant , & ne sont en état d'engendrer qu'après s'être refaits pendant l'été ; & c'est aussi immédiatement après cette saison que commence le rut , pendant lequel le cerf s'épuise si fort , qu'il reste pendant tout l'hiver dans un état de langueur ; sa chair est même alors si dénuée de bonne substance , & son sang est si fort appauvri , qu'il s'engendre des vers sous sa peau , lesquels augmentent encore sa misere , & ne tombent qu'au printemps lorsqu'il a repris , pour ainsi dire , une nouvelle vie par la nourriture active que lui fournissent les productions nouvelles de la terre.

Toute sa vie se passe donc dans des alternatives de plénitude & d'inanition , d'embonpoint & de maigreur , de santé , pour ainsi

âirè, & de maladie, sans que ces oppositions si marquées, & cet état toujours excessif, altèrent sa constitution : il vit aussi long-temps que les autres animaux qui ne sont pas sujets à ces vicissitudes. Comme il est cinq ou six ans à croître, il vit aussi sept fois cinq ou six ans, c'est-à-dire, trente-cinq ou quarante ans (*g*). Ce que l'on a débité sur la longue vie des cerfs, n'est appuyé sur aucun fondement ; ce n'est qu'un préjugé populaire, qui régnoit dès le temps d'Aristote : & ce philosophe dit avec raison (*h*), que cela ne lui paroît pas vraisemblable, attendu que le temps de la gestation & celui de l'accroissement du jeune cerf n'indiquent rien moins qu'une très longue vie. Cependant, malgré cette autorité, qui seule auroit dû suffire pour détruire ce préjugé, il s'est renouvelé dans des siècles d'ignorance par une histoire ou une fable quel'on a faite d'un cerf qui fut pris par Charles VI, dans la forêt de Senlis, & qui portoit un collier sur lequel étoit écrit, *Cœsar hoc me donavit* ; & l'on a mieux aimé supposer mille ans de vie à cet animal, & faire donner ce collier par un Empereur Romain, que de convenir que

(*g*) Pour moi, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet, mon sentiment est que les cerfs ne peuvent vivre plus de quarante ans. Nouveau Traité de la Vénerie, page 141.

(*h*) *Vitâ esse perquam longâ hoc animal fertur, sed nihil certi ex iis quæ narrantur videmus ; nec gestatio aut incrementum hinnuli ita evenit quasi vita esset prælonga.* Arist. Hist. Animal. lib. VI, cap. 29.

ce cerf pouvoit venir d'Allemagne , où les Empereurs ont dans tous les temps pris le nom de César.

La tête des cerfs va tous les ans en augmentant en grosseur & en hauteur , depuis la seconde année de leur vie jusqu'à la huitième ; elle se soutient toujours belle & à-peu près la même pendant toute la vigueur de l'âge ; mais lorsqu'ils deviennent vieux , leur tête décline aussi *. Il est rare que nos cerfs portent plus de vingt ou vingt-deux andouillers , lors même que leur tête est la plus belle , & ce nombre n'est rien moins que constant ; car il arrive souvent que le même cerf aura dans une année un certain nombre d'andouillers , & que l'année suivante il en aura plus ou moins , selon qu'il aura eu plus ou moins de nourriture & de repos : & de même que la grandeur de la tête ou du bois du cerf dépend de la quantité de la nourriture , la qualité de ce même bois dépend aussi de la différente qualité des nourritures ; il est comme le bois des forêts , grand , tendre & assez léger dans les pays humides & fertiles ; il est au contraire court , dur & pesant dans les pays secs & stériles .

Il en est de même encore de la grandeur & de la taille de ces animaux , elle est fort différente , selon les lieux qu'ils habitent : les cerfs de plaines , de vallées ou de collines abondantes en grains , ont le corps beaucoup

* Voyez la description de la tête du cerf dans les différens âges , tome XI de l'édition en 34 volumes.

plus grand & les jambes plus hautes que les cerfs des montagnes sèches, arides & pierreuses ; ceux-ci ont le corps bas, court & trapu ; ils ne peuvent courir aussi vite, mais ils vont plus long temps que les premiers ; ils sont plus méchans, ils ont le poil plus long sur le massacre ; leur tête est ordinairement basse & noire, à-peu-près comme un arbre rabougrí, dont l'écorce est rembrunie, au lieu que la tête des cerfs de plaines est haute & d'une couleur claire & rougeâtre comme le bois & l'écorce des arbres qui croissent en bon terrain. Ces petits cerfs trapus n'habitent guere les futaies & se tiennent presque toujours dans les taillis, où ils peuvent se soustraire plus aisément à la poursuite des chiens : leur venaison est plus fine, & leur chair est de meilleur goût que celle des cerfs de plaine. Le cerf de Corse (*Voyez planche II, figure 1 de ce Volume.*) paroît être le plus petit de tous ces cerfs de montagne, il n'a guere que la moitié de la hauteur des cerfs ordinaires ; c'est, pour ainsi dire, un basset parmi les cerfs ; il a le pelage brun (k), le corps trapu, les jambes courtes. Et ce qui m'a convaincu que la grandeur & la taille des cerfs en général dépendoit absolument de la quantité & de la qualité de la nourriture, c'est qu'en ayant fait élever un chez moi, & l'ayant nourri largement pendant quatre ans, il étoit à cet âge beaucoup plus haut,

(k) Pelage, c'est la couleur du poil du cerf, du daim, du chevreuil.

facilité que dans le bœuf; ce n'est, pour ainsi dire, que par secousses que le cerf peut faire remonter l'herbe contenue dans son premier estomac. Cela vient de la longueur & de la direction du chemin qu'il faut que l'aliment parcoure: le bœuf a le cou court & droit, le cerf l'a long & arqué; il faut donc beaucoup plus d'effort pour faire remonter l'aliment, & cet effort se fait par une espèce de hoquet dont le mouvement se marque au dehors & dure pendant tout le temps de la rumination. Il a la voix d'autant plus forte, plus grosse & plus tremblante, qu'il est plus âgé; la biche a la voix plus foible & plus courte, elle ne rait pas d'amour, mais de crainte: le cerf rait d'une maniere effroyable dans le temps du rut, il est alors si transporté, qu'il ne s'inquiète ni ne s'effraie de rien; on peut donc le surprendre aisément, & comme il est surchargé de venaïson, il ne tient pas long-temps devant les chiens; mais il est dangereux aux abois, il se jette sur eux avec une espèce de fureur. Il ne boit guere en hiver, & encore moins au printemps, l'herbe tendre & chargée de rosée lui suffit; mais dans les chaleurs & les sécheresses de l'été, il va boire aux ruisseaux, aux mares, aux fontaines; & dans le temps du rut il est si fort échauffé qu'il cherche l'eau par-tout, non-seulement pour appaiser sa soif brûlante, mais pour se baigner & se rafraîchir le corps. Il nage parfaitement bien & plus légèrement alors que dans tout autre temps, à cause de la venaïson dont le volume est plus léger qu'un pareil volume d'eau:

on en a vu traverser de très grandes rivières ; on prétend même qu'attirés par l'odeur des biches , les cerfs se jettent à la mer dans le temps du rut , & passent d'une île à une autre à des distances de plusieurs lieues : ils sautent encore plus légèrement qu'ils ne nagent ; car lorsqu'ils sont poursuivis ils franchissent aisément une haie , & même un palis d'une toise de hauteur. Leur nourriture est différente suivant les différentes saisons ; en automne , après le rut , ils cherchent les boutons des arbustes verds , les fleurs de bruyères , les feuilles de ronces , &c. En hyver , lorsqu'il neige , ils pèlent les arbres , & se nourrissent d'écorces , de mousse , &c ; & lorsqu'il fait un temps doux , ils vont vian-der dans les blés ; au commencement du printemps , ils cherchent les chattons des trembles , des marfaules , des coudriers , les fleurs & les boutons du cornouiller , &c. En été ils ont de quoi choisir , mais ils préfè-rent les seigles à tous les autres grains , & la bourgogne à tous les autres bois. La chair du faon est bonne à manger ; celle de la biche & du daguet n'est pas absolument mau-vaise , mais celle des cerfs a toujours un goût désagréable & fort : ce que cet animal a de plus utile , c'est son bois & sa peau ; on la prépare , & elle fait un cuir souple & très durable : le bois s'emploie par les cou-teliers , les fourbisseurs , &c , & l'on en tire par la Chymie , des esprits alkali-volatils , dont la médecine fait un fréquent usage.

LE DAIM (a).

Voyez Planche II, fig. 3 de ce Volume.

AUCUNE espèce n'est plus voisine d'une autre que l'espèce du daim l'est de celle du cerf; cependant ces animaux, qui se ressemblent à tant d'égards, ne vont point ensemble, se fuient, ne se mêlent jamais, & ne forment par conséquent aucune race intermédiaire: il est même rare de trouver des daïms dans les pays qui sont peuplés de beaucoup de cerfs, à moins qu'on ne les y ait apportés; ils paraissent être d'une nature moins robuste & moins agreste que celle du cerf, ils sont aussi beaucoup moins communs dans les forêts; on les élève dans des parcs où ils sont, pour ainsi dire, à demi domestiques.

(a) Le Daim; en Grec, Πρόε; en Latin, *Dama*; en Italien, *Daino*; en Espagnol, *Daino*, *Corza*; en Allemand, *Dam-Hirsch*; en Anglois, *Fallow-Deer*; en Suédois, *Dof*, *Dof Hiort*; en Polonois, *Lanii*.

Euryceros, Oppiani.

Platyceros, Plinii.

Dama vulgaris. Aldrov. *Quadr. bisulc.* p. 741.

Dama vulgaris sive *recentiorum*. Gesner. *Icon. anim. quadr.* p. 51.

Cervus platyceros. Ray, *Synop. animal. quadr.* p. 85.

Cervus cornibus ramosis compressis, summitatibus palmatis. Linn. *Syst. nat.*

Cervus palmatus, *Dama-cervus*. Klein. *Quadr. hist. nat.* p. 25.



Cerf de Corse. 2 La Daine. 3 Le Daim.

L'Angleterre est le pays de l'Europe où il y en a le plus, & l'on y fait grand cas de cette vénaison : les chiens la préfèrent aussi à la chair de tous les autres animaux ; & lorsqu'ils ont une fois mangé du daim, ils ont beaucoup de peine à garder le change sur le cerf ou sur le chevreuil. Il y a des daims aux environs de Paris, & dans quelques provinces de France ; il y en a en Espagne & en Allemagne ; il y en a aussi en Amérique, qui peut-être y ont été transportés d'Europe : il semble que ce soit un animal des climats tempérés, car il n'y en a point en Russie ; & l'on n'en trouve que très rarement dans les forêts de Suède (*b*) & des autres pays du Nord.

Les cerfs sont bien plus généralement répandus : il y en a par-tout en Europe, même en Norvège, & dans tout le Nord, à l'exception peut-être de la Lapponie ; on en trouve aussi beaucoup en Asie ; surtout en Tartarie (*c*) & dans les provinces septentrionales de la Chine. On les retrouve en Amérique, car ceux du Canada (*d*) ne diffèrent des nôtres que par la hauteur du bois, par le nombre & par la direction des andouillers (*e*), qui quelquefois n'est pas

(*b*) *Linn. Fauna Suecica.*

(*c*) Description de l'Inde, par Marc Paul, livre I., page 38. Lettres édifiantes, 26me Recueil, p. 371.

(*d*) Le cerf du Canada est absolument le même qu'en France. Description de la nouvelle France, par le P. Charlevoix, tome III, page 129.

(*e*) Voyez dans les Mémoires pour servir à l'Histoire

droite en avant comme dans les têtes de nos cerfs , mais qui retourne en arrière par une inflexion bien marquée , en sorte que la pointe de chaque andouiller regarde le merain , & cette forme de tête n'est pas absolument particulière aux cerfs de Canada , car on trouve une pareille tête gravée dans la Vénérerie de du Fouilloux (f) , & le bois du cerf de Canada , que nous avons fait graver , a les andouillers droits ; ce qui prouve assez que ce n'est qu'une variété qui se rencontre quelquefois dans les cerfs de tous les pays . Il en est de même de ces têtes qui ont au-dessus de l'empaumure un grand nombre d'andouillers en forme de couronne , que l'on ne trouve que très rarement en France & qui viennent , dit du Fouilloux (g) , du pays des Moscovites & d'Allemagne ; ce n'est qu'une autre variété qui n'empêche pas que ces cerfs ne soient de la même espèce que les nôtres . En Canada , comme en France , la plupart des cerfs ont donc les andouillers droits ; mais leur bois en général est plus grand & plus gros , parce qu'ils trouvent dans ces pays inhabités plus de nourriture & de repos que dans les pays peuplés de beaucoup d'hommes . Il y a de grands & de petits cerfs en Amérique comme en Euro-

toire des animaux , par M. Perrault , la planche du cerf de Canada .

(f) Voyez la vénérerie de Jacques du Fouilloux , folio 22 verso .

(g) Idem , folio 20 , verso .

pe; mais, quelque répandue que soit cette espèce, il semble cependant qu'elle soit bornée aux climats froids & tempérés : les cerfs du Mexique & des autres parties de l'Amérique méridionale ; ceux que l'on appelle *biches des bois*, & *biches des palétuviers* à Cayenne ; ceux que l'on appelle *cerfs du Gange*, & que l'on trouve dans les Mémoires dressés par M. Perrault, sous le nom de *biches de Sardaigne* ; ceux enfin auxquels les voyageurs donnent le nom de *cerfs*, au cap de Bonne-espérance, en Guinée & dans les autres pays chauds, ne sont pas de l'espèce de nos cerfs, comme on le verra dans l'histoire particulière de chacun de ces animaux.

Et comme le daim est un animal moins sauvage, plus délicat, &, pour ainsi dire, plus domestique que le cerf, il est aussi sujet à un plus grand nombre de variétés. Outre les daims communs & les daims blancs, l'on en connaît encore plusieurs autres ; les daims d'Espagne, par exemple, qui sont presque aussi grands que des cerfs, mais qui ont le cou moins gros & la couleur plus obscure, avec la queue noirâtre, non blanche pardessous, & plus longue que celle des daims communs ; les daims de Virginie qui sont presqu'aussi grands que ceux d'Espagne, & qui sont remarquables par la grandeur du membre génital & la grosseur des testicules ; d'autres qui ont le front comprimé, aplati entre les yeux, les oreilles & la queue plus longues que le daim commun, & qui sont marqués d'une tache blanche sur les ongles des

pieds de derrière ; d'autres qui sont tachés ou rayés de blanc , de noir & de fauve-clair , & d'autres enfin qui sont entièrement noirs : tous ont le bois plus veule , plus aplati , plus étendu en largeur , & à proportion plus garni d'andouillers que celui du cerf ; il est aussi plus courbé en dedans , & il se termine par une large & longue empaumure , & quelquefois , lorsque leur tête est forte & bien nourrie , les plus grands andouillers se terminent eux-mêmes par une petite empaumure . Le daim commun a la queue plus longue que le cerf , & le pelage plus clair . La tête de tous les daims mue comme celle des cerfs , mais elle tombe plus tard ; ils sont à-peu-près le même temps à la refaire ; aussi leur rut arrive quinze jours ou trois semaines après celui du cerf : les daims raient alors assez fréquemment , mais d'une voix basse & comme entrecoupée ; ils ne s'excèdent pas autant que le cerf , ni ne s'épuisent par le rut ; ils ne s'écartent pas de leur pays pour aller chercher les femelles , cependant ils se les disputent & se battent à outrance ; ils sont portés à demeurer ensemble , ils se mettent en hardes , & restent presque toujours les uns avec les autres . Dans les parcs , lorsqu'ils se trouvent en grand nombre , ils forment ordinairement deux troupes qui sont bien distinctes , bien séparées , & qui bientôt deviennent ennemis , parce qu'ils veulent également occuper le même endroit du parc : chacune de ces troupes a son chef qui marche le premier , & c'est le plus fort & le plus âgé ; les autres suivent , & tous se dispo-

sent à combattre pour chasser l'autre troupe du bon pays. Ces combats sont singuliers par la disposition qui paraît y régner ; ils s'attaquent avec ordre, se battent avec courage, se soutiennent les uns les autres, & ne se croient pas vaincus par un seul échec, car le combat se renouvelle tous les jours, jusqu'à ce que les plus forts chassent les plus faibles, & les relèguent dans le mauvais pays.

Ils aiment les terrains élevés & entrecoupés de petites collines : ils ne s'éloignent pas comme le cerf lorsqu'on les chasse, ils ne font que tourner, & cherchent seulement à se dérober des chiens par la ruse & par le change ; cependant lorsqu'ils sont pressés, échauffés & épuisés, ils se jettent à l'eau comme le cerf ; mais ils ne se hasardent pas à la traverser dans une aussi grande étendue ; ainsi, la chasse du daim & celle du cerf n'ont entre elles aucune différence essentielle. Les connaissances du daim sont, en plus petit, les mêmes que celles du cerf ; les mêmes ruses leur sont communes, seulement elles sont plus répétées par le daim : comme il est moins entreprenant, & qu'il ne se force longtemps pas tant, il a plus souvent besoin de s'accompagner, de revenir sur ses voies, &c. ce qui rend en général la chasse du daim plus sujette aux inconveniens que celle du cerf : d'ailleurs, comme il est plus petit & plus léger, ses voies laissent sur la terre, & aux portées, une impression moins forte & moins durable ; ce qui fait que les chiens gardent moins le change, & qu'il est plus

LE CHEVREUIL^(a).

Voyez planche III, fig. 1 de ce Volume.

LE cerf comme le plus noble des habitans des bois, occupe dans les forêts les lieux ombragés par les cimes élevées des plus hautes futaies : le chevreuil comme étant d'une espèce inférieure, se contente d'habiter sous des lambris plus bas, & se tient ordinairement dans le feuillage épais des plus jeunes taillis ; mais s'il a moins de noblesse, moins de force, & beaucoup moins de hauteur de taille, il a plus de grace, plus de vivacité, & même plus de courage que le

(a) Le Chevreuil, en Grec, Δορκάς ; en Latin, *Capreolus*, *capriolus* ; en Italien, *Capriolo* ; en Espagnol, *Zorlito*, *Cabronzillo montes* ; en Portugais, *Cabra montes* ; en Allemand, *Rehe* ; en Anglois, *Roe-Deer* ; en Suédois, *Ra-Diur* ; en Danois, *Raa-Diur* ; en Ecossois, *Rohe-buck*.

Dorcas, Aristotelis. *Caprea*, Plinii.

Capra, *capreolus sive dorcas*, Gesner, *Icon. anim. quadr. p. 34.*

Capriolus, Jonston, *hist. animal. quadr. tab.* 33.

Dorcas Scotiæ perfamiliaris, Charleton, *de different. animal. pag. 9, 12.*

Caprea, Plinii. *Capreolus vulgo*, *cervulus sylvestris septentrionalis nostras*, Ray, *Synops. animal. quadr. page 39.*



3



I

2

1. Chevreuil. 2. La Chevrette. 3. Le Faon du Cerf

cerf (*b*) ; il est plus gai, plus leste, plus éveillé; sa forme est plus arrondie, plus élégante, & sa figure plus agréable; ses yeux surtout sont plus beaux, plus brillans, & paroissent animés d'un sentiment plus vif; ses membres sont plus souples, ses mouvements plus prestes, & il bondit, sans effort, avec autant de force que de légèreté. Sa robe est toujours propre, son poil net & lustré; il ne se roule jamais dans la fange comme le cerf; il ne se plaît que dans les pays les plus élevés, les plus secs, où l'air est le plus pur; il est encore plus rusé, plus adroit à se dérober, plus difficile à suivre; il a plus de finesse, plus de ressources d'instinct. Car quoiqu'il ait le désavantage mortel de laisser après lui des impressions plus fortes, & qui donnent aux chiens plus d'ardeur & plus de véhémence d'appétit que l'odeur du cerf, il ne laisse pas de savoir se soustraire à leur poursuite par la rapidité de sa première course, & par ses détours multipliés; il n'attend pas, pour employer la ruse, que la force lui manque; dès qu'il sent, au con-

Cervus cornibus ramosis, teretibus, erectis. Linn.

Cervus minimus, capreolus, cervulus caprea, cornibus brevibus ramosis, annuatim deciduis. Klein, *Quadr. hist. nat.* page 24.

(*b*) Lorsque les faons sont attaqués, le chevreuil qui les reconnoît pour être à lui, prend leur défense; & quoique ce soit un animal assez petit, il est assez fort pour combattre un jeune cerf & le faire fuir. Nouveau Traité de la Vénerie. Paris, 1750, page 178.

traire, que les premiers efforts d'une suite rapide ont été sans succès, il revient sur ses pas, retourne, revient encore, & lorsqu'il a confondu par ses mouvemens opposés la direction de l'aller avec celle du retour, lorsqu'il a mêlé les émanations présentes avec les émanations passées, il se sépare de la terre par un bond, & se jetant à côté, il se met ventre à terre, & laisse, sans bouger, passer près de lui la troupe entiere de ses ennemis ameutés.

Il diffère du cerf & du daim par le naturel, par le tempérament, par les mœurs; & aussi par presque toutes les habitudes de nature: au lieu de se mettre en hardes comme eux, & de marcher par grandes troupes, il demeure en famille; le pere, la mere & les petits vont ensemble, & on ne les voit jamais s'associer avec des étrangers; ils sont aussi constans dans leurs amours que le cerf l'est peu. Comme la chevrette produit ordinairement deux faons, l'un mâle & l'autre femelle, ces jeunes animaux, élevés, nourris ensemble, prennent une si forte affection l'un pour l'autre, qu'ils ne se quittent jamais, à moins que l'un des deux n'ait éprouvé l'injustice du sort, qui ne devroit jamais séparer ce qui s'aime; & c'est attachement encore plutôt qu'amour, car quoiqu'ils soient toujours ensemble, ils ne ressentent les ardeurs du rut qu'unc seule fois par an, & ce temps ne dure que quinze jours; c'est à la fin d'octobre qu'il commence, & il finit avant le 15 novembre. Ils ne sont point alors chargés, comme le cerf, d'une venaison

surlabondante ; ils n'ont point d'odeur forte , point de fureur , rien en un mot qui les altère , & qui change leur état ; seulement ils ne souffrent pas que leurs faons restent avec eux pendant ce temps ; le pere les chasse , comme pour les obliger à céder leur place à d'autres qui vont venir , & à former eux-mêmes une nouvelle famille ; cependant , après que le rut est fini , les faons reviennent auprès de leur mere , & ils y demeurent encore quelque temps , après quoi ils la quittent pour toujours , & vont tous deux s'établir à quelque distance des lieux où ils ont pris naissance .

La chevrette (*voyez pl. III , fig. 2 de ce vol.*) porte cinq mois & demi ; elle met bas vers la fin d'avril , ou au commencement de mai . Les biches , comme nous l'avons dit , portent plus de huit mois , & cette différence seule suffiroit pour prouver que ces animaux sont d'une espèce assez éloignée pour ne pouvoir jamais se rapprocher , ni se mêler , ni produire ensemble une race intermédiaire : par ce rapport , aussi-bien que par la figure & par la taille , ils se rapprochent de l'espèce de la chèvre autant qu'ils s'éloignent de l'espèce du cerf ; car la chèvre porte à-peu-près le même temps , & le chevreuil peut étre regardé comme une chèvre sauvage , qui ne vivant que de bois , porte du bois au lieu de cornes . La chevrette se sépare du chevreuil lorsqu'elle veut mettre bas ; elle se recèle dans le plus fort du bois pour éviter le loup , qui est son plus dangereux ennemi . Au bout de dix ou douze jours les

jeunes faons ont déjà pris assez de force pour la suivre : lorsqu'elle est menacée de quelque danger , elle les cache dans quelque endroit fourré , elle fait face , se laisse chasser pour eux ; mais tous ses soins n'empêchent pas que les hommes , les chiens , les loups , ne les lui enlèvent souvent : c'est-là leur temps le plus critique , & celui de la grande destruction de cette espèce , qui n'est déjà pas trop commune : j'en ai la preuve par ma propre expérience. J'habite souvent une campagne dans un pays (c) , dont les chevreuils ont une grande réputation ; il n'y a point d'années qu'on ne m'apporte au printemps plusieurs faons , les uns vivans , pris par les hommes , d'autres tués par les chiens ; en sorte que sans compter ceux que les loups dévorent , je vois qu'on en détruit plus dans le seul mois de mai , que dans le cours de tout le reste de l'année : & ce que j'ai remarqué depuis plus de vingt-cinq ans , c'est que comme s'il y avoit en tout un équilibre parfait entre les causes de destruction & de renouvellement , ils sont toujours , à très peu près , en même nombre dans les mêmes cantons. Il n'est pas difficile de les compter ; parce qu'ils ne sont nulle part bien nombreux , qu'ils marchent en famille , & que chaque famille habite séparément , ensorte que , par exemple , dans un taillis de cent arpens , il y en aura une famille , c'est-à-dire , trois , quatre ou cinq ; car la chevrette , qui pro-

(c) A Montbard en Bourgogne.

duit

duit ordinairement deux faons, quelquefois n'en fait qu'un, & quelquefois en fait trois, quoique très rarement. Dans un autre canton, qui sera du double plus étendu, il y en aura sept ou huit, c'est-à-dire deux familles ; & j'ai observé que dans chaque canton cela se soutient toujours au même nombre, à l'exception des années où les hivers ont été trop rigoureux & les neiges abondantes & de longue durée ; souvent alors la famille entière est détruite ; mais dès l'année suivante il en revient une autre, & les cantons qu'ils aiment de préférence, sont toujours à-peu-près également peuplés. Cependant on prétend qu'en général le nombre en diminue, & il est vrai qu'il y a des provinces en France où l'on n'en trouve plus ; que quoique communs en Écosse, il n'y en a point en Angleterre ; qu'il n'y en a que peu en Italie ; qu'ils sont bien plus rares en Suède (*d*) qu'ils ne l'étoient autrefois, &c. mais cela pourroit venir, ou de la diminution des forêts, ou de l'effet de quelque grand hiver, comme celui de 1709, qui les fit presque tous périr en Bourgogne, en forte qu'il s'est passé plusieurs années avant que l'espèce se soit rétablie : d'ailleurs ils ne se plaisent pas également dans tous les pays, puisque dans le même pays ils affectent encore des lieux particuliers ; ils aiment les collines ou les plaines élevées au-deffus des montagnes ; ils ne se tiennent pas dans

(d) *Linn. Faun. Suec.*

la profondeur des forêts, ni dans le milieu des bois d'une vaste étendue ; ils occupent plus volontiers les pointes des bois qui sont environnées de terres labourables, les taillis clairs & en mauvais terrain, où croissent abondamment la bourgène, la ronce, &c.

Les faons restent avec leurs pere & mere huit ou neuf mois en tout ; & lorsqu'ils se sont séparés, c'est-à-dire, vers la fin de la premiere année de leur âge, leur premiere tête commence à paroître sous la forme de deux dagues beaucoup plus petites que celles du cerf; mais ce qui marque encore une grande différence entre ces animaux, c'est que le cerf ne met bas sa tête qu'au printemps, & ne la refait qu'en été, au lieu que le chevreuil la met bas à la fin de l'automme, & la refait pendant l'hiver. Plusieurs causes concourent à produire ces effets différens. Le cerf prend en été beaucoup de nourriture, il se charge d'une abondante venaison, ensuite il s'épuise par le rut au point qu'il lui faut tout l'hiver pour se rétablir & pour reprendre ses forces. Loin donc qu'il y ait alors aucune surabondance, il y a disette & défaut de substance, & par conséquent sa tête ne peut pousser qu'au printemps, lorsqu'il a repris assez de nourriture pour qu'il y en ait de superflue. Le chevreuil au contraire, qui ne s'épuise pas tant, n'a pas besoin d'autant de réparation ; & comme il n'est jamais chargé de venaison, qu'il est toujours presque le même, que le rut ne change rien à son état, il a dans tous les temps la même surabondance ; en sorte

qu'en hiver même , & peu de temps après le rut, il met bas sa tête , & la refait. Ainsi, dans tous ces animaux , le superflu de la nourriture organique , avant de se déterminer vers les réservoirs séminaux , & de former la liqueur séminale , se porte vers la tête , & se manifeste à l'extérieur par la production du bois , de la même maniere que dans l'homme le poil & la barbe annoncent & précèdent la liqueur séminale ; & il paroît que ces productions , qui sont , pour ainsi dire , végétales , sont formées d'une matière organique , surabondante , mais encore imparfaite & mêlée de parties brutes puisqu'elles conservent dans leur accroissement & dans leur substance , les qualités du végétal ; au lieu que la liqueur séminale , dont la production est plus tardive , est une matière purement organique , entièrement dépouillée des parties brutes , & parfaitement assimilée au corps de l'animal.

Lorsque le chevreuil a refait sa tête , il touche au bois , comme le cerf , pour la dépouiller de la peau dont elle est revêtue , & c'est ordinairement dans le mois de mars , avant que les arbres commencent à pousser ; ce n'est donc pas la sève du bois qui teint la tête du chevreuil : cependant elle devient brune à ceux qui ont le pelage brun , & jaune à ceux qui sont roux ; car il y a des chevreuils de ces deux pelages , & par conséquent cette couleur du bois ne vient , comme je l'ai dit (e) , que de la nature de

(e) Voyez ci-devant l'histoire du cerf.

l'animal & de l'impression de l'air. A la seconde tête, le chevreuil porte déjà deux ou trois andouillers sur chaque côté ; à la troisième, il en a trois ou quatre ; à la quatrième, quatre ou cinq , & il est bien rare d'en trouver qui en ayent davantage : on reconnoît seulement qu'ils sont vieux chevreuils , à l'épaisseur du mérain , à la largeur de la meule , à la grosseur des perlures , &c. Tant que leur tête est molle , elle est extrêmement sensible : j'ai été témoin d'un coup de fusil, dont la balle coupa net l'un des côtés du refait de la tête qui commençoit à pousser ; le chevreuil fut si fort étourdi du coup , qu'il tomba comme mort : le tireur qui en étoit près , se jeta dessus & le saisit par le pied , mais le chevreuil ayant repris tout d'un coup le sentiment & les forces , l'entraîna par terre à plus de trente pas dans le bois , quoique ce fût un homme très vigoureux ; enfin ayant été achevé d'un coup de couteau, nous vimes qu'il n'avoit eu d'autre blessure que le refait coupé par la balle. L'on fait d'ailleurs que les mouches sont une des plus grandes incommodités du cerf , lorsqu'il refait sa tête ; il se recèle alors dans le plus fort du bois où il y a le moins de mouches , parce qu'elles lui sont insupportables. lorsqu'elles s'attachent à sa tête naissante ; ainsi , il y a une communication intime entre les parties molles de ce bois vivant , & tout le système nerveux du corps de l'animal. Le chevreuil , qui n'a pas à craindre les mouches , parce qu'il refait sa tête en hiver , ne se recèle pas , mais il marche avec

précaution , & porte la tête basse pour ne pas toucher aux branches.

Dans le cerf , le daim & le chevreuil , l'os frontal a deux apophyses ou éminences , sur lesquelles porte le bois ; ces deux éminences osseuses commencent à pousser à cinq ou six mois , & prennent en peu de temps leur entier accroissement ; & loin de continuer à s'élever davantage à mesure que l'animal avance en âge , elles s'abaissent & diminuent de hauteur chaque année ; en sorte que les meules , dans un vieux cerf ou dans un vieux chevreuil , appuient d'assez près sur l'os frontal , dont les apophyses sont devenues fort larges & fort courtes : c'est même l'indice le plus sûr pour reconnoître l'âge avancé dans tous ces animaux. Il me semble que l'on peut aisément rendre raison de cet effet , qui d'abord paroît singulier , mais qui cesse de l'être si l'on fait attention que le bois qui porte sur cette éminence , presse ce point d'appui pendant tout le temps de son accroissement ; que par conséquent il le comprime avec une grande force tous les ans , pendant plusieurs mois : & comme cet os , quoique dur , ne l'est pas plus que les autres os , il ne peut manquer de céder un peu à la force qui le comprime , en sorte qu'il s'élargit , se rabaisse & s'aplatis toujours de plus en plus par cette même compression réitérée à chaque tête que forment ces animaux. Et c'est ce qui fait que quoique les meules & le mérain grossissent toujours , & d'autant plus que l'animal est plus âgé , la hauteur de la tête & le nombre

des andouillers diminuent si fort , qu'à la fin , lorsqu'ils parviennent à un très grand âge , ils n'ont plus que deux grosses dagues ou des têtes bizarres & contrefaites , dont le mérain est fort gros , & dont les andouillers sont très petits.

Comme la chevrette ne porte que cinq mois & demi , & que l'accroissement du jeune chevreuil est plus prompt que celui du cerf , la durée de sa vie est plus courte , & je ne crois pas qu'elle s'étende à plus de douze ou quinze ans tout au plus. J'en ai élevé plusieurs , mais je n'ai jamais pu les garder plus de cinq ou six ans ; ils sont très délicats sur le choix de la nourriture ; ils ont besoin de mouvement , de beaucoup d'air , de beaucoup d'espace , & c'est ce qui fait qu'ils ne résistent que pendant les premières années de leur jeunesse aux inconvénients de la vie domestique : il leur faut une femelle & un parc de cent arpens , pour qu'ils soient à leur aise : on peut les apprivoiser , mais non pas les rendre obéissans , ni même familiers ; ils retiennent toujours quelque chose de leur naturel sauvage ; ils s'épouvantent aisément , & ils se précipitent contre les murailles avec tant de force , que souvent ils se cassent les jambes. Quelque privés qu'ils puissent être , il faut s'en défier ; les mâles surtout sont sujets à des caprices dangereux , à prendre certaines personnes en aversion ; & alors ils s'élancent & donnent des coups de tête assez forts pour renverser un homme , & ils le foulent encore avec les pieds lorsqu'ils l'ont renversé.

Les chevreuils ne raient pas si fréquemment, ni d'un cri aussi fort que le cerf; les jeunes ont une petite voix, courte & plaintive, *mi . . . mi*, par laquelle ils marquent le besoin qu'ils ont de nourriture: ce son est aisé à imiter, & la mère trompée par l'appeau arrive jusque sous le fusil du chasseur.

En hiver, les chevreuils se tiennent dans les taillis les plus fourrés, & ils vivent de ronces, de genêt, de bruyère & de chatons de coudrier, de morsaule, &c. Au printemps, ils vont dans les taillis plus clairs, & broutent les boutons & les feuilles naissantes de presque tous les arbres: cette nourriture chaude fermente dans leur estomac, & les enivre de maniere qu'il est alors très aisément de les surprendre; ils ne savent où ils vont, ils sortent même assez souvent hors du bois, & quelquefois ils approchent du bétail & des endroits habités. En été, ils restent dans les taillis élevés, & n'en sortent que rarement pour aller boire à quelque fontaine, dans les grandes sécheresses; car pour peu que la rosée soit abondante, ou que les feuilles soient mouillées de la pluie, ils se passent de boire. Ils cherchent les nourritures les plus fines, ils ne viennent pas avidement comme le cerf, ils ne broutent pas indifféremment toutes les herbes, ils mangent délicatement, & ils ne vont que rarement aux gagnages, parce qu'ils préfèrent la bourgène & la ronce aux grains & aux légumes.

La chair de ces animaux est, comme l'on

fait , excellente à manger , cependant il y a beaucoup de choix à faire ; la qualité dépend principalement du pays qu'ils habitent & dans le meilleur pays il s'en trouve encore de bons & de mauvais : les bruns ont la chair plus fine que les roux ; tous les chevreuils mâles qui ont passé deux ans , & que nous appelons vieux *Brocarils* , sont durs & d'assez mauvais goût : les chevrettes , quoique du même âge , ou plus âgées , ont la chair plus tendre ; celle des faons , lorsqu'ils sont trop jeunes , est mollassé , mais elle est parfaite lorsqu'ils ont un an ou dix-huit mois ; ceux des pays de plaines & de vallées ne sont pas bons ; ceux des terrains humides sont encore plus mauvais ; ceux qu'on élève dans des parcs ont peu de goût ; enfin il n'y a de bien bons chevreuils que ceux des pays secs & élevés , entrecoupés de collines , de bois , de terres labourables , de friches , où ils ont autant d'air , d'espace , de nourriture , & même de solitude , qu'il leur en faut ; car ceux qui ont été souvent inquiétés sont maigres , & ceux que l'on prend après qu'ils ont été courus ont la chair insipide & fiétrie.

Cette espèce , qui est moins nombreuse que celle du cerf , & qui est même fort rare dans quelques parties de l'Europe , paraît être beaucoup plus abondante en Amérique. Ici nous n'en connaissons que deux variétés , les roux qui sont les plus gros , & les bruns qui ont une tache blanche au derrière , & qui sont les plus petits ; & comme il s'en trouve dans les pays septentrionaux aussi-

aussi-bien que dans les contrées méridionales de l'Amérique, on doit présumer qu'ils diffèrent les uns des autres peut-être plus qu'ils ne diffèrent de ceux d'Europe : par exemple, ils sont extrêmement communs à la Louisiane (*c*), & ils y sont plus grands qu'en France ; ils se retrouvent au Brésil, car l'animal que l'on appelle *Cujucu-apara* ne diffère pas plus de notre chevreuil, que le cerf de Canada diffère de notre cerf ; il y a seulement quelque différence dans la forme de leur bois, comme on peut le voir dans la planche du cerf de Canada, donnée par M. Péroult, & dans la *pl. XXXVII*, *fig. 1 & 2**, où nous avons fait représenter deux bois de ces chevreuils du Brésil, que nous avons aisément reconnus par la description & la figure qu'en a données Pison. » Il y a, dit-il (*d*), au Brésil des espèces de chevreuils dont les uns n'ont point de cornes & s'appellent *Cujucu-été*, & les autres ont des cornes & s'appellent *Cujucu-apara* : ceux-ci, qui ont des cornes, sont plus petits que les autres ; les poils sont luisans

(c) On fait aussi beaucoup d'usage à la Louisiane de la chair de chevreuil : cet animal y est un peu plus grand qu'en Europe, & porte des cornes semblables à celles du cerf, mais il n'en a pas le poil ni la couleur ; il sert aux habitans ainsi que le mouton ailleurs. *Mém. sur la Louisiane*, par M. Dumont, tome I, p. 75.
 (d) Pison, *hist. Brésil.* page 98, où l'on en voit aussi la figure.

* Voyez le tome XII de l'édition en trente-un volumes.

» polis , mêlés de brun & de blanc , sur
 » tout quand l'animal est jeune , car le blanc
 » s'efface avec l'âge. Le pied est divisé en
 » deux ongles noirs , sur chacun desquels il
 » y en a un plus petit qui est comme su-
 » perposé ; la queue courte , les yeux grands
 » & noirs , les narines ouvertes , les cornes
 » médiocres , à trois branches , & qui tom-
 » bent tous les ans ; les femelles portent cinq
 » ou six mois : on peut les apprivoiser , &c.
 » Margrave ajoute que l'*Apara* a des cornes
 » à trois branches , & que la branche infé-
 » rieure de ces cornes est la plus longue ,
 » & se divise en deux ». L'on voit bien par
 ces descriptions , que l'*Apara* n'est qu'une
 variété de l'espèce de nos chevreuils , &
 Ray soupçonne (e) que le *Cujuacu-été* n'est
 pas d'une espèce différente de celle du *Cu-
 juacu-apara* , & que celui-ci est le mâle , &
 l'autre la femelle. Je serois tout-à-fait de
 son avis , si Pison ne disoit pas précisément
 que ceux qui ont des cornes sont plus petits
 que les autres : il ne me paroît pas pro-
 bable que les femelles soient plus grosses
 que les mâles , dans cette espèce , au
 Brésil , puisqu'ici elles sont plus petites.
 Ainsi , en même temps que nous croyons
 que le *Cujuacu-apara* n'est qu'une variété de
 notre chevreuil , à laquelle on doit même
 rapporter le *Capreolus marinus* de Jonston ;
 nous ne déciderons rien sur ce que peut
 être le *Cujuacu-été* , jusqu'à ce que nous en
 soyons mieux informés.

(e) Ray , *Synops. animal quadr.* p. 92.





1 Le Lievre. 2 Le Lapin Sauvage. 3 Le Riche
4 Le Lapin Domestique. 5. Le Lapin d'Angou



L E L I E V R E [a].

Voyez planche IV, figure 1 de ce Volume.

LES espèces d'animaux les plus nombreuses ne sont pas les plus utiles ; rien n'est même plus nuisible que cette multitude de rats, de mulots, de sauterelles, de chenilles, & de tant d'autres insectes dont il semble que la Nature permette & souffre, plutôt qu'elle ne l'ordonne, la trop nombreuse multiplication. Mais l'espèce du lièvre & celle du lapin ont pour nous le double avantage du nombre & de l'utilité ; les lièvres sont universellement & très abondamment répandus dans tous les climats de la terre : les lapins, quoiqu'originaire de climats particuliers, multiplient si prodigieusement dans presque tous les lieux

(a) Le Lièvre, en Grec Λαγως ; en Latin ; *Lepus*, quasi *levipes* ; Italien, *Lepre* ; Espagnol, *Liebre* ; Portugais, *Lebro* ; Allemand, *Hase* ; Anglois, *Hare* ; Suédois, *Hare*, Hollandois, *Hase* ; Polonois, *Sajonq* ; Es-
ciavon, *Saiq* ; Russien, *Zaitza* ; Arabe, *Ernab*, *Har-
neb*, *Arneph* ; Turc, *Tausan* ; Persan, *Kargos* ; au Bré-
sil, *Thahiti* ; dans l'Amérique septentrionale, *Sou-
ianda*.

Lepus, Ray, *Synops. animal quadr.* p. 204.

Lepus caudæ abruptæ, pupillis atris. Linnæus.

Lepus vulgaris, cinereus, cuius venatio animum exhibet
parat. Klein, *Quadr. hist. nat.* p. 51.

ou l'on veut les transporter , qu'il n'est plus possible de les détruire , & qu'il faut même employer beaucoup d'art pour en diminuer la quantité , quelquefois incommode.

Lorsqu'on réfléchit donc sur cette fécondité sans bornes donnée à chaque espèce sur le produit innombrable qui doit en résulter , sur la prompte & prodigieuse multiplication de certains animaux qui pullulent tout-à-coup , & viennent par milliers désoler les campagnes & ravager la terre , on est étonné qu'ils n'envahissent pas la nature , on craint qu'ils ne l'oppriment par le nombre , & qu'après avoir dévoré sa substance , ils ne périssent eux-mêmes avec elle.

L'on voit en effet avec effroi arriver ces nuages épais , ces phalanges ailées d'insectes affamés , qui semblent menacer le globe entier , & qui se rabattant sur les plaines fécondes de l'Egypte , de la Pologne ou de l'Inde , détruisent en un instant les travaux , les espérances de tout un peuple , & n'épargnant ni les grains , ni les fruits , ni les herbes , ni les racines , ni les feuilles , dépouillent la terre de sa verdure , & changent en un désert aride les plus riches contrées. L'on voit descendre des montagnes du Nord des rats en multitude innombrable , qui , comme un déluge , ou plutôt un débordement de substance vivante , viennent inonder les plaines , se répandent jusque dans les provinces du Midi , & après avoir détruit sur leur passage tout ce qui vit ou végète , finissent par infecter la terre & l'air de leurs cadavres. L'on voit dans les pays méridio-

naux sortir tout-à-coup du désert des myriades de fourmis, lesquelles, comme un torrent dont la source seroit intarissable, arrivent en colonnes pressées, se succédent, se renouvellement sans cesse, s'emparent de tous les lieux habités, en chassent les animaux & les hommes, & ne se retirent qu'après une dévastation générale. Et dans les temps où l'homme, encore à demi sauvage, étoit, comme les animaux, sujet à toutes les loix, & même aux excès de la nature, n'a-t-on pas vu de ces débordemens de l'espèce humaine, des Normands, des Alains, des Huns, des Goths, des peuples, ou plutôt des peuplades d'animaux à face humaine, sans domicile & sans nom, sortir tout - à - coup de leurs antres, marcher par troupeaux effrénés, tout opprimer sans autre force que le nombre, ravager les cités, renverser les empires; & après avoir détruit les nations & dévasté la terre, finir par la repeupler d'hommes aussi nouveaux & plus barbares qu'eux?

Ces grands événemens, ces époques si marquées dans l'histoire du genre humain, ne sont cependant que de légères vicissitudes dans le cours ordinaire de la nature vivante; il est en général toujours constant, toujours le même; son mouvement, toujours réglé, roule sur deux pivots inébranlables, l'un la fécondité sans bornes donnée à toutes les espèces, l'autre les obstacles sans nombre qui réduisent le produit de cette fécondité à une mesure déterminée, & ne laissent en tout temps qu'à peu près la même quantité

d'individus dans chaque espèce. Et comme ces animaux en multitude innombrable, qui paroissent tout-à-coup, disparaissent de même, & que le fonds de ces espèces n'en est point augmenté, celui de l'espèce humaine demeure aussi toujours le même; les variations en font seulement un peu plus lentes, parce que la vie de l'homme étant plus longue que celle de ces petits animaux, il est nécessaire que les alternatives d'augmentation & de diminution se préparent de plus loin & ne s'achevent qu'en plus de temps; & ce temps même n'est qu'un instant dans la durée, un moment dans la suite des siècles, qui nous frappe plus que les autres, parce qu'il a été accompagné d'horreur & de destruction; car, à prendre la terre entière & l'espèce humaine en général, la quantité des hommes doit, comme celle des animaux, être en tout temps à très peu près la même, puisqu'elle dépend de l'équilibre des causes physiques; équilibre auquel tout est parvenu depuis long-temps, & que les efforts des hommes, non plus que toutes les circonstances morales, ne peuvent rompre, ces circonstances dépendant elles-mêmes de ces causes physiques dont elles ne sont que des effets particuliers. Quelque soin que l'homme puisse prendre de son espèce, il ne la rendra jamais plus abondante en un lieu que pour la détruire ou la diminuer dans un autre. Lorsqu'une portion de la terre est surchargée d'hommes, ils se dispersent, ils se répandent, ils se détruisent, & il s'établit en même temps des loix & des usages qui

souvent ne préviennent que trop cet excès de multiplication. Dans les climats excessivement féconds, comme à la Chine, en Egypte, en Guinée, on relègue, on mutilé, on vend, on noie les enfans; ici on les condamne à un célibat perpétuel. Ceux qui existent, s'arrogent aisément des droits sur ceux qui n'existent pas; comme êtres nécessaires, ils anéantissent les êtres contingens, ils suppriment pour leur aisance, pour leur commodité, les générations futures. Il se fait sur les hommes, sans qu'on s'en apperçoive, ce qui se fait sur les animaux; on les soigne, on les multiplie, on les néglige, on les détruit selon le besoin, les avantages, l'incommodité, les désagréemens qui en résultent; & comme tous ces effets moraux dépendent eux-mêmes des causes physiques qui, depuis que la terre a pris sa consistance, sont dans un état fixe & dans un équilibre permanent, il paroît que pour l'homme, comme pour les animaux, le nombre d'individus dans l'espèce ne peut qu'être constant. Au reste, cet état fixe & ce nombre constant ne sont pas des quantités absolues; toutes les causes physiques & morales, tous les effets qui en résultent, sont compris & balancent entre certaines limites plus ou moins étendues, mais jamais assez grandes pour que l'équilibre se rompe. Comme tout est en mouvement dans l'univers, & que toutes les forces répandues dans la matière agissent les unes contre les autres & se contrebalancent, tout se fait par des espèces d'oscillations, dont les points milieux sont

ceux auxquels nous rapportons le cours ordinaire de la nature , & dont les points extrêmes en sont les périodes les plus éloignées. En effet , tant dans les animaux que dans les végétaux , l'excès de la multiplication est ordinairement suivi de la stérilité ; l'abondance & la disette se présentent tour-à-tour , & souvent se suivent de si près , que l'on pourroit juger de la production d'une année par le produit de celle qui la précède. Les pommiers , les pruniers , les chênes , les hêtres & la plupart des autres arbres fruitiers & forestiers , ne portent abondamment que de deux années l'une ; les chenilles , les hannetons , les mulots , & plusieurs autres animaux qui dans de certaines années se multiplient à l'excès , ne paroissent qu'en petit nombre l'année suivante. Que deviendroient en effet tous les biens de la terre , que deviendroient les animaux utiles , & l'homme lui-même , si dans ces années excessives chacun de ces insectes se reproduissoit pour l'année suivante par une génération proportionnelle à leur nombre ! Mais non , les causes de destruction , d'anéantissement & de stérilité suivent immédiatement celles de la trop grande multiplication ; & indépendamment de la contagion , suite nécessaire des trop grands amas de toute matière vivante dans un même lieu , il y a dans chaque espèce des causes particulières de mort & de destruction , que nous indiquerons dans la suite , & qui seules suffisent pour compenser les excès des générations précédentes.

Au reste, je le répète encore, ceci ne doit pas être pris dans un sens absolu, ni même strict, surtout pour les espèces qui ne sont pas abandonnées en entier à la nature seule : celles dont l'homme prend soin, à commencer par la sienne, sont plus abondantes qu'elles ne le seroient sans ces soins ; mais comme ces soins ont eux-mêmes des limites, l'augmentation qui en résulte est aussi limitée & fixée depuis long temps par des bornes immuables ; & quoique dans les pays polisés l'espèce de l'homme & celles de tous les animaux utiles soient plus nombreuses que dans les autres climats, elles ne le sont jamais à l'excès, parce que la même puissance qui les fait naître, les détruit dès qu'elles deviennent incommodes.

Dans les cantons conservés pour le plaisir de la chasse, on tue quelquefois quatre ou cinq cents lièvres dans une seuie battue. Ces animaux multiplient beaucoup, ils sont en état d'engendrer en tout temps, & dès la première année de leur vie ; les femelles ne portent que trente ou trente-un jours ; elles produisent trois ou quatre petits, & dès qu'elles ont mis bas, elles reçoivent le mâle ; elles le reçoivent aussi lorsqu'elles sont pleines, & par la conformation particulière de leurs parties génitales il y a souvent superfécondation ; car le vagin & le corps de la matrice sont continus, & il n'y a point d'orifice ni de col de matrice comme dans les autres animaux ; mais les cornes de la matrice ont chacune un orifice qui déborde dans le vagin & qui se dilate dans l'accouchement :

ainsi, ces deux cornes font deux matrices distinctes, séparées & qui peuvent agir indépendamment l'une de l'autre, en sorte que les femelles dans cette espèce peuvent concevoir & accoucher en différens temps par chacune de ces matrices ; & par conséquent les superfétations doivent être aussi fréquentes dans ces animaux qu'elles sont rares dans ceux qui n'ont pas ce double organe.

Ces femelles peuvent donc être en chaleur & pleines en tout temps ; & ce qui prouve assez qu'elles sont aussi lascives que fécondes, c'est une autre singularité dans leur conformation ; elles ont le gland du clitoris proéminent, & presque aussi gros que le gland de la verge du mâle ; & comme la vulve n'est presque pas apparente, & que d'ailleurs les mâles n'ont au dehors ni bourses ni testicules dans leur jeunesse, il est souvent assez difficile de distinguer le mâle de la femelle. C'est aussi ce qui a fait dire que dans les lièvres il y avoit beaucoup d'hermaphrodites, que les mâles produisoient quelquefois des petits comme les femelles, qu'il y en avoit qui étoient tour-à-tour mâles & femelles, & qui en faisoient alternativement les fonctions, parce qu'en effet ces femelles, souvent plus ardentes que les mâles, les couvrent avant d'en être couvertes, & que d'ailleurs elles leur ressemblent si fort à l'extérieur, qu'à moins d'y regarder de très près, on prend la femelle pour le mâle ou le mâle pour la femelle.

Les petits ont les yeux ouverts en naissant, la mère les allaite pendant vingt jours,

après quoi ils s'en séparent & trouvent eux-mêmes leur nourriture : ils ne s'écartent pas beaucoup les uns des autres ni du lieu où ils sont nés ; cependant ils vivent solitairement, & se forment chacun un gîte à une petite distance, comme de soixante ou quatre-vingt pas ; ainsi lorsqu'on trouve un jeune levraut dans un endroit, on est presque sûr d'en trouver encore un ou deux autres aux environs. Ils paissent pendant la nuit plutôt que pendant le jour, ils se nourrissent d'herbes, de racines, de feuilles, de fruits, de graines, & préfèrent les plantes dont la sève est laiteuse ; ils rongent même l'écorce des arbres pendant l'hiver, & il n'y a guère que l'aune & le tilleul auxquels ils ne touchent pas. Lorsqu'on en élève, on les nourrit avec de la laitue & des légumes ; mais la chair de ces lièvres nourris est toujours de mauvais goût.

Ils dorment ou se reposent au gîte pendant le jour, & ne vivent, pour ainsi dire, que la nuit ; c'est pendant la nuit qu'ils se promenent, qu'ils mangent & qu'ils s'accouplent : on les voit au clair de la lune jouer ensemble, sauter & courir les uns après les autres ; mais le moindre mouvement, le bruit d'une feuille qui tombe, suffit pour les troubler, ils fuient, & fuient chacun d'un côté différent.

Quelques auteurs ont assuré que les lièvres ruminent, cependant je ne crois pas cette opinion fondée, puisqu'ils n'ont qu'un estomac, & que la conformation des estomacs & des autres intestins est toute diffé-

rente dans les animaux ruminans ; le cœcum de ces animaux est petit, celui du lièvre est extrêmement ample ; & si l'on ajoute à la capacité de son estomac celle de ce grand cœcum, on concevra aisément que pouvant prendre un grand volume d'alimens, cet animal peut vivre d'herbes seules, comme le cheval & l'âne qui ont aussi un grand cœcum, qui n'ont de même qu'un estomac, & qui par conséquent ne peuvent ruminer.

Les lièvres dorment beaucoup, & dorment les yeux ouverts ; ils n'ont pas de cils aux paupières, & ils paroissent avoir les yeux mauvais ; ils ont, comme par dédommagement, l'ouïe très fine, & l'oreille d'une grandeur démesurée, relativement à celle de leur corps ; ils remuent ces longues oreilles avec une extrême facilité, ils s'en servent comme de gouvernail pour se diriger dans leur course qui est si rapide, qu'ils devancent aisément tous les autres animaux. Comme ils ont les jambes de devant beaucoup plus courtes que celles de derrière, il leur est plus commode de courir en montant qu'en descendant ; aussi lorsqu'ils sont poursuivis, commencent ils toujours par gagner la montagne : leur mouvement dans leur course est une espèce de galop, une suite de sauts très prestes & très pressés ; ils marchent sans faire aucun bruit, parce qu'ils ont les pieds couverts & garnis de poils, même par dessous ; ce sont aussi peut-être les seuls animaux qui ayent des poils au dedans de la bouche.

Les lièvres ne vivent que sept ou huit ans

au plus (^b), & la durée de la vie est, comme dans les autres animaux, proportionnelle au temps de l'entier développement du corps ; ils prennent presque tout leur accroissement en un an, & vivent environ sept fois un an ; on prétend seulement que les mâles vivent plus long temps que les femelles, mais je doute que cette observation soit fondée. Ils passent leur vie dans la solitude & dans le silence, & l'on n'entend leur voix que quand on les saisit avec force, qu'on les tourmente & qu'on les blesse : ce n'est point un cri aigre, mais une voix assez forte, dont le son est presque semblable à celui de la voix humaine. Ils ne sont pas aussi sauvages que leurs habitudes & leurs mœurs paroissent l'indiquer ; ils sont doux & susceptibles d'une espèce d'éducation, on les apprivoise aisément, ils deviennent même charmans ; mais ils ne s'attachent jamais assez pour pouvoir devenir animaux domestiques ; car ceux même qui ont été pris tout petits & élevés dans la maison, dès qu'ils en trouvent l'occasion, se mettent en liberté, & s'enfuient à la campagne. Comme ils ont l'oreille bonne, qu'ils s'asseiennent volontiers sur leurs pattes de derrière, & qu'ils se servent de celles de devant comme de bras, on en a vu qu'on avoit dressés à battre du tambour, à gesticuler en cadence, &c.

En général, le lièvre ne manque pas d'inf-

(^b) Voyez la Vénerie de du Fouilloux. Paris, 1614,
fol. 63, recto.

tinct pour sa propre conservation , ni de sagacité pour échapper à ses ennemis ; il se forme un gîte , il choisit en hiver les lieux exposés au midi , & en été il se loge au nord ; il se cache , pour n'être pas vu , entre des mottes qui sont de la couleur de son poil. » J'ai vu , dit du Fouilloux (c) , un lièvre si malicieux , que depuis qu'il oyoit la trompe , il se levoit du gîte , & eût-il été à un quart de lieue de là , il s'en alloit nager en un étang , se relaisant au milieu d'icelui sur des joncs sans être aucunement chassé des chiens. J'ai vu courrir un lièvre bien deux heures devant les chiens , qui après avoir couru , venoit pousser un autre & se mettre en son gîte. J'en ai vu d'autres qui nageoient deux ou trois étangs , dont le moindre avoit quarante-vingt pas de large. J'en ai vu d'autres qui après avoir été bien courus l'espace de deux heures , entroient par dessous la porte d'un teët à brebis , & se relaissoient parmi le bétail. J'en ai vu , quand les chiens les courroient , qui s'alloient mettre parmi un troupeau de brebis qui passoit par les champs , ne les voulant abandonner ne laisser. J'en ai vu d'autres qui , quand ils oyoint les chiens courans , se cachoient en terre. J'en ai vu d'autres qui alloient par un côté de haie & retournoient par l'autre , en sorte qu'il n'y avoit que l'épaisseur de la haie entre les chiens

(c) Fol. 64 verso , & 65 recto.

» & le lièvre. J'en ai vu d'autres qui quand
» ils avoient couru une demi-heure , s'en
» alloient monter sur une vieille muraille
» de six pieds de haut , & s'alloient relais-
» fer en un pertuis ~~de~~ chauffant couvert de
» lierre. J'en ai vu d'autres qui nageoient
» une riviere qui pouvoit avoir huit pas de
» large , & la passoient & repassoient en lon-
» gueur de deux cents pas , plus de vingt
» fois devant moi ». Mais ce sont là sans
doute les plus grands efforts de leur instinct ;
car leurs ruses ordinaires sont moins fines
& moins recherchées : ils se contentent ,
lorsqu'ils sont lancés & poursuivis , de cou-
rir rapidement , & ensuite de tourner & re-
tourner sur leurs pas ; ils ne dirigent pas
leur course contre le vent , mais du côté
opposé ; les femelles ne s'éloignent pas tant
que les mâles , & tournoyent davantage. En
général , tous les lièvres qui sont nés dans
le lieu même où on les chasse , ne s'en écartent
guere , ils reviennent au gîte ; & si on
les chasse deux jours de suite , ils font le
lendemain les mêmes tours & détours qu'ils
ont fait la veille. Lorsqu'un lièvre va droit
& s'éloigne beaucoup du lieu où il a été lan-
cé , c'est une preuve qu'il est étranger , &
qu'il n'étoit en ce lieu qu'en passant. Il vient
en effet , surtout dans le temps le plus mar-
qué du rut , qui est aux mois de janvier , de
février & de mars , des lièvres mâles qui
manquant de femelles en leur pays , font
plusieurs lieues pour en trouver , & s'arrê-
tent auprès d'elles ; mais dès qu'ils sont lan-
cés par des chiens , ils regagnent leur pays

natal , & ne reviennent pas. Les femelles ne sont jamais , elles sont plus grosses que les mâles , & cependant elles ont moins de force & d'agilité , & plus de timidité , car elles n'attendent pas au gîte les chiens de si près que les mâles , & elles multiplient davantage leurs ruses & leurs détours : elles sont aussi plus délicates & plus susceptibles des impressions de l'air , elles craignent l'eau & la rosée ; au lieu que parmi les mâles il s'en trouve plusieurs , qu'on appelle *lièvres ladres* , qui cherchent les eaux & se font chasser dans les étangs , les marais & autres lieux fangeux . Ces lièvres ladres ont la chair de fort mauvais goût ; & en général tous les lièvres qui habitent les plaines basses ou les vallées , ont la chair insipide & blanchâtre , au lieu que dans les pays de collines élevées ou de plaines en montagnes , où le serpolet & les autres herbes fines abondent , les levrauts & même les vieux lièvres sont excellens au goût . On remarque seulement que ceux qui habitent le fond des bois dans ces mêmes pays , ne sont pas à beaucoup près aussi bons que ceux qui en habitent les lisieres ou qui se tiennent dans les champs & dans les vignes , & que les femelles ont toujours la chair plus délicate que les mâles .

La nature du terroir influe sur ces animaux comme sur tous les autres ; les lièvres de montagnes sont plus grands & plus gros que les lièvres de plaine ; ils sont aussi de couleur différente ; ceux de montagnes sont plus bruns sur le corps , & ont plus de blanc sous le cou que ceux de plaine , qui sont presque

presque rouges. Dans les hautes montagnes & dans les pays du Nord, ils deviennent blancs pendant l'hiver, & reprennent en été leur couleur ordinaire; il n'y en a que quelques-uns, & ce sont peut-être les plus vieux, qui restent toujours blancs, car tous le deviennent plus ou moins en vieillissant. Les lièvres des pays chauds, d'Italie, d'Espagne, de Barbarie, sont plus petits que ceux de France & des autres pays plus septentrionaux: selon Aristote, ils étoient aussi plus petits en Egypte qu'en Grèce. Ils sont également répandus dans tous ces climats: il y en a beaucoup en Suède, en Danemarck, en Pologne, en Moscovie; beaucoup en France, en Angleterre, en Allemagne; beaucoup en Barbarie, en Egypte, dans les îles de l'Archipel, surtout à Délos (*d*), aujourd'hui Idilis, qui fut appelée par les anciens Grecs, *lagia*, à cause du grand nombre de lièvres qu'on y trouvoit. Enfin il y en a aussi beaucoup en Lapponie (*e*), où ils sont blancs pendant dix mois de l'année, & ne reprennent leur couleur fauve que pendant les deux mois les plus chauds de l'été. Il paroît donc que les climats leur font à-peu-près égaux; cependant on remarque qu'il y a moins de

(*d*) Voyez la description des îles de l'Archipel, par Draper. Amsterdam, 1730, page 375.

(*e*) Voyez les œuvres de Regnard, Paris, 1742, tome I, page 180. Il genio vagante. Parma, 1691, tome II, page 46. Voyages de la Martiniere. Paris, 1671, page 74.

lièvres en Orient qu'en Europe, & peu ou point dans l'Amérique méridionale, quoiqu'il y en ait en Virginie, en Canada (*f*), & jusque dans les terres qui avoisinent la baie de Hudson (*g*) & le détroit de Magellan ; mais ces lièvres de l'Amérique septentrionale sont peut-être d'une espèce différente de celle nos lièvres, car les voyageurs disent que non-seulement ils sont beaucoup plus gros, mais que leur chair est blanche & d'un goût tout différent de celui de la chair de nos lièvres (*h*) ; ils ajoutent que le poil de ces lièvres du nord de l'Amérique ne tombe jamais & qu'on en fait d'excellentes fourrures. Dans les pays excessivement chauds comme au Sénégal, à Gambie, en Guinée (*i*), & surtout dans les cantons de Fida, d'Apam, d'Acra, & dans quelques autres pays situés sous la zone torride en Afrique, en Amérique, comme dans la nouvelle Hollande & dans les terres de l'Isthme de Panama, on trouve aussi des animaux que les voyageurs ont pris pour des lièvres, mais qui sont plutôt des espèces de lapins

(*f*) Voyez la relation de la Gaspésie, par le P. le Clercq. Paris, 1691, pages 488, 489, 491, 492.

(*g*) Voyez le voyage de Robert Lade. Paris, 1744, tome II, page 317; & la suite des voyages de Dampier, tome V, page 167.

(*h*) Voyez *idem*.

(*i*) Voyez Histoire générale des Voyages, par M. l'Abbé Piévolt, tome III, pages 235 & 296.

(k); car le lapin est originaire des pays chauds, & ne se trouve pas dans les climats septentrionaux, au lieu que le lièvre est d'autant plus fort & plus grand, qu'il habite un climat plus froid.

Cet animal, si recherché pour la table en Europe, n'est pas du goût des Orientaux: il est vrai que la loi de Mahomet, & plus anciennement la loi des Juifs, a interdit l'usage de la chair du lièvre comme de celle du cochon; mais les Grecs & les Romains en faisoient autant de cas que nous: *Inter quadrupedes gloria prima lepus*, dit Martial. En effet, sa chair est excellente, son sang même est très bon à manger, & est le plus doux de tous les sangs; la graisse n'a aucune part à la délicatesse de la chair, car le lièvre ne devient jamais gras tant qu'il est à la campagne en liberté, & cependant il meurt souvent de trop de graisse lorsqu'on le nourrit à la maison.

La chasse du lièvre est l'amusement & souvent la seule occupation des gens oisifs de la campagne: comme elle se fait sans appareil & sans dépense, & qu'elle est même utile, elle convient à tout le monde; on va le matin & le soir au coin du bois attendre le lièvre à sa rentrée ou à sa sortie; on le cherche pendant le jour dans les endroits où il se gîte. Lors-

(k) Voyez le voyage de Dampier aux terres Australes, tome V, page 111; & le voyage de Wafer, imprimé à la suite de celui de Dampier, tome IV, page 214.

qu'il y a de la fraîcheur dans l'air, par un soleil brillant, & que le lièvre vient se gîter après avoir couru, la vapeur de son corps forme une petite fumée que les chasseurs aperçoivent de fort loin, surtout si leurs yeux sont exercés à cette espèce d'observation; j'en ai vu qui, conduits par cet indice, partoient d'une demi-lieue, pour aller tuer le lièvre au gîte. Il se laisse ordinairement approcher de fort près, surtout si l'on ne fait pas semblant de le regarder, & si au lieu d'aller directement à lui on tourne obliquement pour l'approcher. Il craint les chiens plus que les hommes; & lorsqu'il sent ou qu'il entend un chien, il part de plus loin: quoiqu'il coure plus vite que les chiens, comme il ne fait pas une route droite, qu'il tourne & retourne autour de l'endroit où il a été lancé, les levriers, qui le chassent à la vue plutôt qu'à l'odorat, lui coupent le chemin, le saisissent & le tuent. Il se tient volontiers en été dans les champs, en automne dans les vignes, & en hiver dans les buissons ou dans les bois, & l'on peut en tout temps, sans le tirer, le forcer à la course avec des chiens courans: on peut aussi le faire prendre par des oiseaux de proie. Les ducs, les busards, les aigles, les renards, les loups, les hommes lui font également la guerre: il a tant d'ennemis qu'il ne leur échappe que par hasard, & il est bien rare qu'ils le laissent jouir du petit nombre de jours que la Nature lui a comptés.

LE LAPIN (*a*).

Voyez planche IV , figure 2 de ce Volume;

LE lièvre & le Lapin , quoique fort semblables tant à l'extérieur qu'à l'intérieur , ne se mêlant point ensemble , font deux espèces distinctes & séparées : cependant comme les chasseurs (*b*) disent que les lièvres mâles , dans le temps du rut , courrent les lapines & les couvrent , j'ai cherché à savoir ce qui pourroit résulter de cette union , & pour cela j'ai fait élever des lapins avec des hases , & des lièvres avec des lapines ; mais ces essaies n'ont rien produit , & m'ont seulement appris que ces animaux , dont la for-

[*a*] Le Lapin , en Grec , Δασύτης ; Latin , *Cuniculus* ; Italien , *Coniglio* ; Espagnol , *Conejo* ; Portugais , *Coelho* ; Allemand , *kaninichen* ; Anglois , *rabbit* , *cony* ; Suédois , *kanin* ; ancien François , *connin* , *connil*.

Lepus vel lepusculus Hispanicus. Gesner , *Icon. animal. quadr. p. 105.*

Cuniculus. Ray , *Synops. quadr. p. 205.*

Lepus caudâ brevissimâ , pupillis rubris. Linnæus. Nota que cette phrase de nomenclature est mauvaise , attendu qu'il n'y a que les lapins blancs domestiques qui ayent les pupilles rouges.

Lepusculus , cuniculus terram fodens. Klein , *Quadr. hist. nat. p. 52.*

(*b*) Voyez la Vénérie de du Fouilloux , Paris 1614 , folio 100 recto.

me est si semblable , sont cependant de nature assez différente pour ne pas même produire des espèces de mulets Un levraut & une jeune lapine , à-peu-près du même âge , n'ont pas vécu trois mois ensemble ; dès qu'ils furent un peu forts , ils devinrent ennemis , & la guerre continue qu'ils se faisoient , finit par la mort du levraut. De deux lièvres plus âgés , que j'avois mis chacun avec une lapine , l'un eut le même sort , & l'autre , qui étoit très ardent & très fort , qui ne cessoit de tourmenter la lapine en cherchant à la couvrir , la fit mourir à force de blessures ou de caresses trop dures. Trois ou quatre lapins de différens âges , que je fis de même appareiller avec des hases , les firent mourir en plus ou moins de temps ; ni les uns ni les autres n'ont produit : je crois cependant pouvoir assurer qu'ils se sont quelquefois réellement accouplés ; au moins y a-t-il eu souvent certitude que malgré la résistance de la femelle , le mâle s'étoit satisfait ; il y avoit plus de raison d'attendre quelque produit de ces accouplements , que des amours du lapin & de la poule dont on nous a fait l'histoire (c) , & dont , suivant l'auteur , le fruit devoit être *des poulets couverts de poils ou des lapins couverts de plumes* ; tandis que ce n'étoit qu'un lapin vicieux ou trop ardent qui , faute de femelle , se servoit de la poule de la maison , comme il se seroit servi de tout autre meuble , & qu'il

(c) Voyez l'art d'élever des poulets.

est hors de toute vraisemblance de s'attendre à quelque production entre deux animaux d'espèces si éloignées , puisque de l'union du lièvre & du lapin , dont les espèces sont tout-à-fait voisines , il ne résulte rien.

La fécondité du lapin est encore plus grande que celle du lièvre ; & sans ajouter foi à ce que dit Wotten , que d'une seule paire qui fut mise dans une isle , il s'en trouva six mille au bout d'un an , il est sûr que ces animaux multiplient si prodigieusement dans les pays qui leur conviennent , que la terre ne peut fournir à leur subsistance ; ils détruisent les herbes , les racines , les grains , les fruits , les légumes , & même les arbrisseaux & les arbres ; & si l'on n'avoit pas contre eux le secours des furets & des chiens , ils feroient désertes les habitans de ces campagnes. Non - seulement le lapin s'accouple plus souvent , & produit plus fréquemment & en plus grand nombre que le lièvre , mais il a aussi plus de ressources pour échapper à ses ennemis ; il se soustrait aisément aux yeux de l'homme : les trous qu'il se creuse dans la terre , où il se retire pendant le jour & où il fait ses petits , le mettent à l'abri du loup , du renard & de l'oiseau de proie ; il y habite avec sa famille en pleine sécurité , il y élève & y nourrit ses petits jusqu'à l'âge d'environ deux mois , & il ne les fait sortir de leur retraite pour les amener au dehors , que quand ils sont tout élevés ; il leur évite par là tous les inconveniens du bas âge , pendant lequel au contraire les lièvres périssent en plus grand nombre , & souf-

freut plus que dans tout le reste de la vie.

Cela seul suffit aussi pour prouver que le lapin est supérieur au lièvre par la sagacité; tous deux sont conformés de même, & pourroient également se creuser des retraites; tous deux sont également timides à l'excès, mais l'un plus imbécille se contente de se former un gîte à la surface de la terre, où il demeure continuellement exposé, tandis que l'autre, par un instinct plus réfléchi, se donne la peine de fouiller la terre & de s'y pratiquer un asyle; & il est si vrai que c'est par sentiment qu'il travaille, que l'on ne voit pas le lapin domestique faire le même ouvrage; il se dispense de se creuser une retraite, comme les oiseaux domestiques se dispensent de faire des nids, & cela parce qu'ils sont également à l'abri des inconvénients auxquels sont exposés les lapins & les oiseaux sauvages. L'on a souvent remarqué que quand on a voulu peupler une garenne avec des lapins clapiers, ces lapins & ceux qu'ils produisoient, restoient, comme les lièvres, à la surface de la terre, & que ce n'étoit qu'après avoir éprouvé bien des inconvénients, & au bout d'un certain nombre de générations, qu'ils commençoiient à creuser la terre pour se mettre en sûreté.

Ces lapins clapiers ou domestiques (*Voyez planche IV, figure 4 de ce Volume*), varient pour les couleurs, comme tous les autres animaux domestiques; le blanc, le noir & le gris (d) sont cependant les seuls qui

(d) J'appelle gris ce mélange de couleurs fauves, enirant

entrent ici dans le jeu de la Nature : les lapins noirs sont les plus rares, mais il y en a beaucoup de tout blancs, beaucoup de tout gris, & beaucoup de mêlés. Tous les lapins sauvages sont gris, & parmi les lapins domestiques c'est encore la couleur dominante, car dans toutes les portées il se trouve toujours des lapins gris, & même en plus grand nombre, quoique le pere & la mere soient tous deux blancs ou tous deux noirs, ou l'un noir & l'autre blanc ; il est rare qu'ils en fassent plus de deux ou trois qui leur ressemblent ; au lieu que les lapins gris, quoique domestiques, ne produisent d'ordinaire que des lapins de cette même couleur, & que ce n'est que très rarement & comme par hasard qu'ils en produisent de blancs, de noirs & de mêlés.

Ces animaux peuvent engendrer & produire à l'âge de cinq ou six mois : on assure qu'ils sont constants dans leurs amours, & que communément ils s'attachent à une seule femelle & ne la quittent pas ; elle est presque toujours en chaleur ou du moins en état de recevoir le mâle : elle porte trente ou trente un jours, & produit quatre, cinq ou six, & quelquefois sept & huit petits : elle a, comme la femelle du lièvre, une double matrice, & peut par conséquent mettre bas en deux temps ; cependant il paraît que les superfétiations sont moins fréquentes

noires & cendrées, qui fait la couleur ordinaire des lapins & des lièvres.

dans cette espèce que dans celle du lièvre ; peut-être par cette même raison que les femelles changent moins souvent, qu'il leur arrive moins d'aventures, & qu'il y a moins d'accouplements hors de saison.

Quelques jours avant de mettre bas, elles se creusent un nouveau terrier, non pas en ligne droite, mais en zig zag, au fond duquel elles pratiquent une excavation ; après quoi elles s'arrachent sous le ventre une assez grande quantité de poils, dont elles font une espèce de lit pour recevoir leurs petits. Pendant les deux premiers jours elles ne les quittent pas, elles ne sortent que lorsque le besoin les presse, & reviennent dès qu'elles ont pris de la nourriture : dans ce temps elles mangent beaucoup & fort vite. Elles soignent ainsi & allaitent leurs petits pendant plus de six semaines. Jusqu'alors le pere ne les connaît point, il n'entre pas dans ce terrier qu'a pratiqué la mere ; souvent même, quand elle en sort, & qu'elle y laisse ses petits, elle en bouché l'entrée avec de la terre détrempee de son urine ; mais lorsqu'ils commencent à venir au bord du trou, & à manger du séneçon & d'autres herbes que la mere leur présente, le pere semble les reconnoître, il les prend entre ses pattes, il leur lustre le poil, il leur lèche les yeux, & tous, les uns après les autres, ont également part à ses soins : dans ce même temps la mere lui fait beaucoup de caresses, & souvent devient pleine peu de jours après.

Un Gentilhomme de mes voisins (*e*) , qui pendant plusieurs années s'est amusé à élever des lapins , m'a communiqué ces remarques . » J'ai commencé , dit-il , par avoir un mâle & une femelle seulement , le mâle étoit tout blanc & la femelle toute grise , & dans leur postérité , qui fut très nombreuse , il y en eut beaucoup plus de gris que d'autres , un assez bon nombre de blancs & de mêlés , & quelques-uns de noirs Quand la femelle est en chaleur , le mâle ne la quitte presque point ; son tempérament est si chaud que je l'ai vu se lier avec elle cinq ou six fois en moins d'une heure La femelle , dans le temps de l'accouplement , se couche sur le ventre à plate terre , les quatre pattes alongées , elle fait de petits cris qui annoncent plutôt le plaisir que la douleur : leur façon de s'accoupler ressemble assez à celle des chats , à la différence pourtant que le mâle ne mord que très peu sa femelle sur le chignon La paternité chez ces animaux , est très respectée ; j'en juge ainsi par la grande déférence que tous mes lapins ont eue pour leur premier pere qu'il m'étoit aisé de reconnoître à cause de sa blancheur , & qui est le seul mâle que j'aye conservé de cette couleur : la famille avoit beau s'augmenter , ceux qui devenoient peres à leur tour lui étoient subordonnés ; dès qu'ils se battoient , soit pour des femelles , soit parce qu'ils se disputoient la nourriture ,

(*e*) M. le Chapt du Moutier.

le grand-pere , qui entendoit du bruit , accourroit de toute sa force , & dès qu'on l'apercevoit , tout rentroit dans l'ordre ; & s'il en attrapoit quelqu'un aux prises , il les séparoit , & en faisoit sur le champ un exemple de punition. Une autre preuve de sa domination sur toute sa postérité , c'est que les ayant accoutumés à rentrer tous à un coup de sifflet , lorsque je donnois ce signal , & quelque éloignés qu'ils fussent , je voyois le grand-pere se mettre à leur tête , & quoiqu'arrivé le premier , les laisser tous défilier devant lui & ne rentrer que le dernier. Je les nourrissois avec du son de froment , du foin & beaucoup de genièvre ; il leur en falloit plus d'une voiture par semaine , ils en mangeoient toutes les baies , les feuilles & l'écorce , & ne laissoient que le gros bois : cette nourriture leur donnoit du fumet , & leur chair étoit aussi bonne que celle des lapins sauvages ».

Ces animaux vivent huit ou neuf ans : comme ils passent la plus grande partie de leur vie dans leurs terriers , où ils sont en repos & tranquilles , ils prennent un peu plus d'embonpoint que les lièvres ; leur chair est aussi fort différente par la couleur & par le goût ; celle des jeunes lapreaux est très délicate , mais celle des vieux lapins est toujours sèche & dure. Ils sont , comme je l'ai dit , originaires des climats chauds : les Grecs les connoissoient (f) , & il paroît que les

(f) *Vide Aristot. hist. animal. lib. I , cap. 1.*

seuls endroits de l'Europe où il y en eût anciennement, étoient la Grèce & l'Espagne (*g*) ; de - là on les a transportés dans des climats plus tempérés , comme en Italie ; en France , en Allemagne , où ils se sont naturalisés ; mais dans les pays plus froids , comme en Suède (*h*) & dans le reste du Nord , on ne peut les éléver que dans les maisons , & ils périssent lorsqu'on les abandonne à la campagne. Ils aiment au contraire le chaud excessif ; car on en trouvé dans les contrées méridionales de l'Asie & de l'Afrique , comme au golfe Persique (*i*) , à la baie de Saldana (*k*) , en Lybie , au Sénégal , en Guinée (*l*) , & on en trouve aussi dans nos îles de l'Amérique (*m*) , qui y ont été transportés de l'Europe , & qui y ont très bien réussi.

(*g*) *Vide Plin. hist. natural. lib. VIII.*

(*h*) *Vide Linnæi Faun. Suec. p. 8.*

[*i*] Voyez l'Histoire générale des voyages , par M. l'abbé Prevost , tome II , page 354.

[*k*] *Idem , tome I , page 449.*

[*l*] *Vide Leon Afric. de Afric. descript. Lugd. Bat. 1632 . Part. II , page 257. Voyez aussi le voyage de Guill. Bosman. Utrecht , 1705 , page 252.*

[*m*] Voyez l'Histoire générale des Antilles , par le P. du Tertre. Paris , 1667 , tome II , page 297.



HISTOIRE NATURELLE.

Les Animaux carnassiers.

JUSQU'ICI nous n'avons parlé que des animaux utiles ; les animaux nuisibles sont en bien plus grand nombre ; & quoiqu'en tout, ce qui nuit paroisse plus abondant que ce qui fert, cependant tout est bien , parce que dans l'univers physique le mal concourt au bien , & que rien en effet ne nuit à la Nature. Si nuire est détruire des êtres animés , l'homme , considéré comme faisant partie du système général de ces êtres , n'est-il pas l'espèce la plus nuisible de toutes ? lui seul immole , anéantit plus d'individus vivans , que tous les animaux carnassiers n'en dévorent. Ils ne sont donc nuisibles que parce qu'ils sont rivaux de l'homme , parce qu'ils ont les mêmes appétits , le même goût pour la chair , & que , pour subvenir à un besoin de première nécessité , ils lui disputent quelquefois une proie qu'il réservoit à ses excès ; car nous sacrifions plus encore à notre intempérance que nous ne donnons à nos besoins. Destructeurs nés des êtres qui nous sont subordonnés , nous épuiserions la Nature si elle n'étoit inépuisable , si par une

fécondité aussi grande que notre déprédatiⁿon , elle ne savoit se réparer elle-même & se renouveler. Mais il est dans l'ordre que la mort serve à la vie , que la reproduction naîsse de la destruction ; quelque grande , quelque prématurée que soit donc la dépense de l'homme & des animaux carnassiers , le fonds , la quantité totale de substance vivante n'est point diminuée ; & s'ils précipitent les destructions , ils hâtent en même temps des naissances nouvelles.

Les animaux qui par leur grandeur figurent dans l'univers , ne font que la plus petite partie des substances vivantes ; la terre fourmille de petits animaux ; chaque plante , chaque graine , chaque particule de matière organique , contient des milliers d'atomes animés. Les végétaux paroissent être le premier fonds de la nature ; mais ce fonds de substance , tout abondant , tout inépuisable qu'il est , suffiroit à peine au nombre encore plus abondant d'insectes de toute espèce. Leur pullulation , toute aussi nombreuse & souvent plus prompte que la reproduction des plantes , indique assez combien ils sont surabondans ; car les plantes ne se reproduisent que tous les ans , il faut une saison entière pour en former la graine , au lieu que dans les insectes , & surtout dans les plus petites espèces , comme celle des pucerons , une seule saison suffit à plusieurs générations. Ils multiplieroient donc plus que les plantes , s'ils n'étoient détruits par d'autres animaux dont ils paroissent être la pâture naturelle , comme les herbes & les graines semblent être la nourriture

préparée pour eux-mêmes. Aussi parmi les insectes y en a-t-il beaucoup qui ne vivent que d'autres insectes ; il y en a même quelques espèces qui , comme les araignées , dévorent indifféremment les autres espèces & la leur : tous servent de pâture aux oiseaux , & les oiseaux domestiques & sauvages nourrissent l'homme , ou deviennent la proie des animaux carnassiers.

Ainsi , la mort violente est un usage presque aussi nécessaire que la loi de la mort naturelle ; ce sont deux moyens de destruction & de renouvellement , dont l'un fait à entretenir la jeunesse perpétuelle de la Nature , & dont l'autre maintient l'ordre de ses productions & peut seul limiter le nombre dans les espèces. Tous deux sont des effets dépendans des causes générales ; chaque individu qui naît , tombe de lui-même au bout d'un temps ; ou lorsqu'il est prématulement détruit par les autres , c'est qu'il étoit surabondant. Eh combien n'y en a-t-il pas de supprimés d'avance ! que de fleurs moissonnées au printemps ! que de races éteintes au moment de leur naissance ! que de germes anéantis avant leur développement ! L'homme & les animaux carnassiers ne vivent que d'individus tout formés , ou d'individus prêts à l'être ; la chair , les œufs , les graines , les germes de toute espèce font leur nourriture ordinaire ; cela seul peut borner l'exubérance de la Nature. Que l'on considere un instant quelqu'une de ces espèces inférieures qui servent de pâture aux autres , celle des harengs , par exemple ,

ils viennent par milliers s'offrir à nos pêcheurs, & après avoir nourri tous les monstres des mers du Nord, ils fournissent encore à la subsistance de tous les peuples de l'Europe pendant une partie de l'année. Quelle pullulation prodigieuse parmi ces animaux ! & s'ils n'étoient en grande partie détruits par les autres, quels seroient les effets de cette immense multiplication ! eux seuls couvriroient la surface entiere de la mer ; mais bientôt se nuisant par le nombre, ils se corromproient, ils se détruairoient eux-mêmes ; faute de nourriture suffisante, leur fécondité diminueroit ; la contagion & la disette seroient ce que fait la consommation ; le nombre de ces animaux ne seroit guere augmenté, & le nombre de ceux qui s'en nourrissent seroit diminué. Et comme l'on peut dire la même chose de toutes les autres espèces, il est donc nécessaire que les unes vivent sur les autres ; & dès-lors la mort violente des animaux est un usage légitime, innocent, puisqu'il est fondé dans la Nature, & qu'ils ne naissent qu'à cette condition.

Avouons cependant que le motif par lequel on voudroit en douter fait honneur à l'humanité ; les animaux, du moins ceux qui ont des sens, de la chair & du sang, sont des êtres sensibles ; comme nous ils sont capables de plaisir & sujets à la douleur. Il y a donc une espèce d'insensibilité cruelle à sacrifier, sans nécessité, ceux surtout qui nous approchent, qui vivent avec nous, & dont le sentiment se réfléchit vers nous en se mar-

quant par les signes de la douleur ; car ceux dont la nature est différente de la nôtre , ne peuvent guere nous affecter. La pitié naturelle est fondée sur les rapports que nous avons avec l'objet qui souffre ; elle est d'autant plus vive que la ressemblance , la conformité de nature est plus grande ; on souffre en voyant souffrir son semblable. *Compassion* ; ce mot exprime assez que c'est une souffrance , une passion qu'on partage ; cependant c'est moins l'homme qui souffre , que sa propre nature qui pâtit , qui se révolte machinalement & se met d'elle-même à l'unisson de douleur. L'ame a moins de part que le corps à ce sentiment de pitié naturelle , & les animaux en sont susceptibles comme l'homme ; le cri de la douleur les émeut , ils accourent pour se secourir , ils reculent à la vue d'un cadavre de leur espèce. Ainsi , l'horreur & la pitié sont moins des passions de l'ame que des affections naturelles , qui dépendent de la sensibilité du corps & de la similitude de la conformation ; ce sentiment doit donc diminuer à mesure que les natures s'éloignent. Un chien qu'on frappe , un agneau qu'on égorgé , nous font quelque pitié ; un arbre que l'on coupe , une huître qu'on mord , ne nous en font aucune.

Dans le réel , peut-on douter que les animaux dont l'organisation est semblable à la nôtre , n'éprouvent des sensations semblables ? ils sont sensibles puisqu'ils ont des sens , & ils le sont d'autant plus que ces sens sont plus actifs & plus parfaits : ceux au contraire dont les sens sont obtus , ont-ils un

sentiment exquis ? & ceux auxquels il manque quelque organe , quelque sens , ne manquent-ils pas de toutes les sensations qui y sont relatives ? Le mouvement est l'effet nécessaire de l'exercice du sentiment. Nous avons prouvé (a) que de quelque maniere qu'un être fût organisé , s'il a du sentiment , il ne peut manquer de le marquer au dehors par des mouvemens extérieurs. Ainsi les plantes , quoique bien organisées , sont des êtres insensibles , aussi-bien que les animaux qui , comme elles , n'ont nul mouvement apparent. Ainsi parmi les animaux , ceux qui n'ont , comme la plante appellée *sensitive* , qu'un mouvement sur eux-mêmes , & qui sont privés du mouvement progressif , n'ont encore que très peu de sentiment ; & enfin ceux mêmes qui ont un mouvement progressif , mais qui , comme des automates , ne font qu'un petit nombre de choses , & les font toujours de la même façon , n'ont qu'une foible portion de sentiment , limitée à un petit nombre d'objets. Dans l'espèce humaine , que d'automates ! Combien l'éducation , la communication respective des idées , n'augmentent-elles pas la quantité , la vivacité du sentiment ! quelle différence à cet égard entre l'homme sauvage & l'homme policé , la paysanne & la femme du monde ! Et de même parmi les animaux , ceux qui vivent avec nous deviennent plus sensibles par cette

[a] Voyez le discours sur la nature des animaux , vol. V de cette histoire naturelle.

communication , tandis que ceux qui demeurent sauvages n'ont que la sensibilité naturelle , souvent plus sûre , mais toujours moins forte que l'acquise.

Au reste , en ne considérant le sentiment que comme une faculté naturelle , & même indépendamment de son résultat apparent , c'est-à-dire , des mouvements qu'il produit nécessairement dans tous les êtres qui en sont doués , on peut encore le juger , l'estimer , & en déterminer à-peu-près les différens degrés par des rapports physiques auxquels il me paraît qu'on n'a pas fait assez d'attention. Pour que le sentiment soit au plus haut degré dans un corps animé , il faut que ce corps fasse un tout , lequel soit non-seulement sensible dans toutes ses parties , mais encore composé de manière que toutes ces parties sensibles ayent entre elles une correspondance intime , en sorte que l'une ne puisse être ébranlée sans communiquer une partie de cet ébranlement à chacune des autres. Il faut de plus qu'il y ait un centre principal & unique auquel puissent aboutir ces différens ébranlemens , & sur lequel , comme sur un point d'appui général & commun , se fasse la réaction de tous ces mouvements. Ainsi l'homme & les animaux qui par leur organisation ressemblent le plus à l'homme , feront les êtres les plus sensibles ; ceux au contraire qui ne font pas un tout aussi complet , ceux dont les parties ont une correspondance moins intime , ceux qui ont plusieurs centres de sentiment , & qui sous une même enveloppe semblent moins renfermer

un tout unique , un animal parfait , que contenir plusieurs centres d'existence séparés ou différens les uns des autres , feront des êtres beaucoup moins sensibles. Un polype que l'on coupe , & dont les parties vivent séparément ; une guêpe dont la tête , quoique séparée du corps , se meut , vit , agit , & même mange comme auparavant ; un lézard auquel , en retranchant une partie de son corps , on n'ôte ni le mouvement ni le sentiment ; une écrevisse dont les membres amputés se renouvellement ; une tortue dont le cœur bat long-temps après avoir été arraché ; tous les insectes dans lesquels les principaux viscères , comme le cœur & les poumons , ne forment pas un tout au centre de l'animal , mais sont divisés en plusieurs parties , s'étendent le long du corps , & font , pour ainsi dire , une suite de viscères , de cœurs & de trachées ; tous les poissons , dont les organes de la circulation & de la respiration n'ont que peu d'action , & diffèrent beaucoup de ceux des quadrupèdes & même de ceux des cétacées ; enfin tous les animaux dont l'organisation s'éloigne de la nôtre , ont peu de sentiment , & d'autant moins qu'elle en diffère plus.

Dans l'homme & dans les animaux qui lui ressemblent , le diaphragme paroît être le centre du sentiment ; c'est sur cette partie nerveuse que portent les impressions de la douleur & du plaisir ; c'est sur ce point d'appui que s'exercent tous les mouvemens du système sensible. Le diaphragme sépare transversalement le corps entier de l'animal , & le

divise assez exactement en deux parties égales , dont la supérieure renferme le cœur & les poumons , & l'inférieure , contient l'estomac & les intestins. Cette membrane est douée d'une extrême sensibilité ; elle est d'une si grande nécessité pour la propagation & la communication du mouvement & du sentiment , que la plus légère blessure , soit au centre nerveux , soit à la circonference ou même aux attaches du diaphragme , est toujours accompagnée de convulsions , & souvent suivie d'une mort violente. Le cerveau , qu'on dit être le siège des sensations , n'est donc pas le centre du sentiment , puisqu'on peut au contraire le blesser , l'enrager , sans que la mort suive , & qu'on a l'expérience qu'après avoir enlevé une portion considérable de la cervelle , l'animal n'a pas cessé de vivre , de se mouvoir , & de sentir dans toutes ses parties.

Distinguons donc la sensation du sentiment : la sensation n'est qu'un ébranlement dans le sens , & le sentiment est cette même sensation devenue agréable ou désagréable par la propagation de cet ébranlement dans tout le système sensible : je dis la sensation devenue agréable ou désagréable , car c'est là ce qui constitue l'essence du sentiment : son caractère unique est le plaisir ou la douleur ; & tous les mouvemens qui ne tiennent ni de l'une ni de l'autre , quoiqu'ils se passent au dedans de nous-mêmes , nous sont indifférens & ne nous affectent point. C'est du sentiment que dépend tout le mouvement extérieur & l'exercice de toutes les forces de l'animal ;

il n'agit qu'autant qu'il est affecté , c'est-à-dire , autant qu'il sent ; & cette même partie , que nous regardons comme le centre du sentiment , sera aussi le centre des forces ou , si l'on veut , le point d'appui commun sur lequel elles s'exercent. Le diaphragme est dans l'animal ce que le collet est dans la plante , tous deux les divisent transversalement , tous deux servent de point d'appui aux forces opposées ; car les forces qui dans un arbre poussent en haut les parties qui doivent former le tronc & les branches , portent & appuient sur le collet , aussi-bien que les forces opposées qui poussent en bas les parties qui forment les racines.

Pour peu qu'on s'examine , on s'apercevra aisément que toutes les affections intimes , les émotions vives , les épanouissemens de plaisir , les faisissemens , les douleurs , les nausées , les défaillances , toutes les impressions fortes des sensations devenues agréables ou désagréables , se font sentir au-dedans du corps , à la région même du diaphragme. Il n'y a au contraire nul indice de sentiment dans le cerveau , & l'on n'a dans la tête que les sensations pures , ou plutôt les représentations de ces mêmes sensations simples & dénuées des caractères du sentiment ; seulement on se souvient , on se rappelle que telle ou telle sensation nous a été agréable ou désagréable ; & si cette opération , qui se fait dans la tête , est suivie d'un sentiment vif & réel , alors on en sent l'impression au-dedans du corps , & toujours à la région du diaphragme. Ainsi ,

dans le fœtus , où cette membrane est sans exercice , le sentiment est nul , ou si foible qu'il ne peut rien produire ; aussi les petits mouvemens que le fœtus se donne , sont plutôt machinaux que dépendans des sensations & de la volonté.

Quelle que soit la matière qui sert de véhicule au sentiment , & qui produit le mouvement musculaire , il est sûr qu'elle se propage par les nerfs , & se communique dans un instant indivisible d'une extrémité à l'autre du système sensible. De quelque maniere que ce mouvement s'opere , que ce soit par des vibrations comme dans des cordes élastiques , que ce soit par un feu subtil , par une matière semblable à celle de l'électricité , laquelle non-seulement réside dans les corps animés , comme dans tous les autres corps , mais y est même continuellement régénérée par le mouvement du cœur & des poumons , par le frottement du sang dans les artères , & aussi par l'action des causes extérieures sur les organes des sens , il est encore sûr que les nerfs & les membranes sont les seules parties sensibles dans le corps animal. Le sang , la lymphe , toutes les autres liqueurs , les graisses , les os , les chairs , tous les autres solides , sont par eux-mêmes insensibles ; la cervelle l'est aussi , c'est une substance molle & sans élasticité , incapable dès-lors de propager ou de rendre le mouvement , les vibrations ou les ébranlemens du sentiment. Les méninges au contraire sont très sensibles , ce sont les enveloppes de tous les nerfs ; elles prennent , comme eux , leur origine

origine dans la tête ; elles se divisent comme les branches des nerfs , & s'étendent jusqu'à leurs plus petites ramifications ; ce font , pour ainsi dire , des nerfs aplatis , elles sont de la même substance , elles ont à-peu-près le même degré d'élasticité , elles font partie , & partie nécessaire du système sensible . Si l'on veut donc que le siège des sensations soit dans la tête , il sera dans les méninges , & non dans la partie médullaire du cerveau , dont la substance est toute différente .

Ce qui a pu donner lieu à cette opinion , que le siège de toutes les sensations & le centre de toute sensibilité étoient dans le cerveau , c'est que les nerfs , qui sont les organes du sentiment , aboutissent tous à la cervelle , qu'on a regardé dès-lors comme la seule partie commune qui pût en recevoir tous les ébranlemens , toutes les impressions . Cela feul a suffi pour faire du cerveau le principe du sentiment , l'organe essentiel des sensations , en un mot le *sensorium commun.* Cette supposition a paru si simple & si naturelle , qu'on n'a fait aucune attention à l'impossibilité physique qu'elle renferme , & qui cependant est assez évidente ; car comment se peut-il qu'une partie insensible , une substance molle & inactive , telle qu'est la cervelle , soit l'organe même du sentiment & du mouvement ? comment se peut-il que cette partie molle & insensible , non-seulement reçoive ces impressions , mais les conserve long-temps , & en propage les ébranlemens dans toutes les parties solides & sen-

sibles ? L'on dira peut-être d'après Descartes ou d'après M. de la Peyronie , que ce n'est point dans la cervelle , mais dans la glande pinéale où dans le corps calleux que réside ce principe ; mais il suffit de jeter les yeux sur la conformation du cerveau pour reconnoître que ces parties de la glande pinéale , le corps calleux , dans lesquelles on a voulu mettre le siège des sensations , ne tiennent point aux nerfs , qu'elles sont toutes environnées de la substance insensible de la cervelle , & séparées des nerfs de maniere qu'elles ne peuvent en recevoir les mouvemens , & dès-lors ces suppositions tombent aussi-bien que la premiere.

Mais quel sera donc l'usage , quelles seront les fonctions de cette partie si noble , si capitale ? Le cerveau ne se trouve-t-il pas dans tous les animaux ? n'est-il pas dans l'homme , dans les quadrupèdes , dans les oiseaux , qui tous ont beaucoup de sentiment , plus étendu , plus grand , plus considérable que dans les poissons , les insectes & les autres animaux , qui en ont peu ? Dès qu'il est comprimé , tout mouvement n'est-il pas suspendu ? toute action ne cesse-t-elle pas ? Si cette partie n'est pas le principe du mouvement , pourquoi y est-elle si nécessaire , si essentielle ? pourquoi même est-elle proportionnelle , dans chaque espèce d'animal , à la quantité de sentiment dont il est doué ?

Je crois pouvoir répondre d'une maniere satisfaisante à ces questions quelque difficiles qu'elles paroissent ; mais pour cela il faut se prêter un instant à ne voir avec moi le

cerveau que comme de la cervelle , & n'y rien supposer que ce que l'on peut y appercevoir par une inspection attentive & par un examen réfléchi. La cervelle , aussi-bien que la moelle alongée & la moelle épinière , qui n'en sont que la prolongation , est une espèce de mucilage à peine organisé ; on y distingue seulement les extrémités des petites artères qui y aboutissent en très grand nombre , & qui n'y portent pas du sang , mais une lymphe blanche & nourricière : ces mêmes petites artères , ou vaisseaux lymphatiques , paroissent dans toute leur longueur en forme de filets très déliés , lorsqu'on désunit les parties de la cervelle par la macération. Les nerfs au contraire ne pénètrent point la substance de la cervelle , ils n'aboutissent qu'à la surface ; ils perdent auparavant leur solidité , leur élasticité , & les dernières extrémités des nerfs , c'est-à-dire , les extrémités les plus voisines du cerveau , sont molles & presque mucilagineuses. Par cette exposition , dans laquelle il n'entre rien d'hypothétique , il paroît que le cerveau , qui est nourri par les artères lymphatiques , fournit à son tour la nourriture aux nerfs , & que l'on doit les considérer comme une espèce de végétation qui part du cerveau par troncs & par branches , lesquelles se divisent ensuite en une infinité de rameaux. Le cerveau est aux nerfs ce que la terre est aux plantes ; les dernières extrémités des nerfs sont les racines qui , dans tout végétal , sont plus tendres & plus molles que le tronc ou les branches ; elles contiennent une

matière ductile , propre à faire croître & à nourrir l'arbre des nerfs ; elles tirent cette matière ductile de la substance même du cerveau, auquel les artères rapportent continuellement la lymphe nécessaire pour y suppléer. Le cerveau , au lieu d'être le siège des sensations , le principe du sentiment , ne sera donc qu'un organe de sécrétion & de nutrition , mais un organe très essentiel , sans lequel les nerfs ne pourroient ni croître , ni s'entretenir.

Cet organe est plus grand dans l'homme , dans les quadrupèdes , dans les oiseaux , parce que le nombre ou le volume des nerfs dans ces animaux , est plus grand que dans les poissons & les insectes , dont le sentiment est foible par cette même raison ; ils n'ont qu'un petit cerveau proportionné à la petite quantité de nerfs qu'il nourrit. Et je ne puis me dispenser de remarquer , à cette occasion , que l'homme n'a pas , comme on l'a prétendu , le cerveau plus grand quaucun des animaux ; car il y a des espèces de singes & de cétacées qui , proportionnellement au volume de leur corps , ont plus de cerveau que l'homme ; autre fait qui prouve que le cerveau n'est ni le siège des sensations , ni le principe du sentiment , puisqu'alors ces animaux auroient plus de sensations & plus de sentiment que l'homme.

Si l'on considère la maniere dont se fait la nutrition des plantes ; on observera qu'elles ne tirent pas les parties grossières de la terre ou de l'eau ; il faut que ces parties soient réduites par la chaleur en vapeurs ténues , pour que les racines puissent les pomper.

De même , dans les nerfs , la nutrition ne se fait qu'au moyen des parties les plus subtiles de l'humidité du cerveau , qui sont pompées par les extrémités ou racines des nerfs ; & de-là sont portées dans toutes les branches du système sensible : ce système fait , comme nous l'avons dit , un tout dont les parties ont une connexion si serrée , une correspondance si intime qu'on ne peut en blesser une sans ébranler violemment toutes les autres ; la blessure , le simple tiraillement du plus petit nerf , suffit pour causer une vive irritation dans tous les autres , & mettre le corps en convulsion ; & l'on ne peut faire cesser la douleur & les convulsions qu'en coupant ce nerf au-dessus de l'endroit lézé , mais dès-lors toutes les parties auxquelles le nerf aboutissoit deviennent à jamais immobiles , insensibles. Le cerveau ne doit pas être considéré comme partie du même genre , ni comme portion organique du système des nerfs , puisqu'il n'a pas les mêmes propriétés , ni la même substance , n'étant ni solide , ni élastique , ni sensible. J'avoue que lorsqu'on le comprime , on fait cesser l'action du sentiment ; mais cela même prouve que c'est un corps étranger à ce système , qui agissant alors par son poids sur les extrémités des nerfs , les presse & les engourdit , de la même maniere qu'un poids appliqué sur le bras , la jambe , ou sur quelqu'autre partie du corps , en engourdit les nerfs , & en amortit le sentiment. Il est si vrai que cette cessation de sentiment par la compres-

sion n'est qu'une suspension, un engourdissement, qu'à l'instant où le cerveau cesse d'être comprimé, le sentiment renaît & le mouvement se rétablit. J'avoue encore qu'en déchirant la substance médullaire, & en blessant le cerveau jusques au corps calleux, la convulsion, la privation de sentiment, & la mort même suit ; mais c'est qu'alors les nerfs sont entièrement dérangés, qu'ils sont, pour ainsi dire, déracinés & blessés tous ensemble & dans leur origine.

Je pourrois ajouter à toutes ces raisons des faits particuliers, qui prouvent également que le cerveau n'est ni le centre du sentiment ni le siège des sensations. On a vu des animaux, & même des enfans, naître sans tête & sans cerveau, qui cependant avoient sentiment, mouvement & vie. Il y a des classes entières d'animaux, comme les insectes & les vers, dans lesquels le cerveau ne fait point une masse distincte ni un volume sensible ; ils ont seulement une partie correspondante à la moelle allongée & à la moelle épinière. Il y auroit donc plus de raison de mettre le siège des sensations & du sentiment dans la moelle épinière, qui ne manque à aucun animal, que dans le cerveau, qui n'est pas une partie générale & commune à tous les êtres sensibles.

Le plus grand obstacle à l'avancement des connaissances de l'homme est moins dans les choses mêmes, que dans la manière dont il les considère ; quelque compliquée que soit la machine de son corps, elle est en-

core plus simple que ses idées. Il est moins difficile de voir la Nature telle qu'elle est, que de la reconnoître telle qu'on nous la présente ; elle ne porte aucun voile, nous lui donnons un masque, nous la couvrons de préjugés, nous supposons qu'elle agit, qu'elle opère comme nous agissons & pensons. Cependant ces actes sont évidens, & nos pensées sont obscures ; nous portons dans ses ouvrages les abstractions de notre esprit, nous lui prêtons nos moyens, nous ne jugeons de ses fins que par nos vues, & nous mêlons perpétuellement à ses opérations, qui sont constantes, à ses faits, qui sont toujours certains, le produit illusoire & variable de notre imagination.

Je ne parle point de ces systèmes purement arbitraires, de ces hypothèses frivoles, imaginaires, dans lesquelles on reconnoît à la première vue qu'on nous donne la chimère au lieu de la réalité : j'entends les méthodes par lesquelles on recherche la Nature. La route expérimentale elle-même a produit moins de vérités que d'erreurs : cette voie, quoique la plus sûre, ne l'est néanmoins qu'autant qu'elle est bien dirigée ; pour peu qu'elle soit oblique, on arrive à des plages stériles, où l'on ne voit obscurément que quelques objets épars : cependant on s'efforce de les rassembler, en leur supposant des rapports entre eux & des propriétés communes ; & comme l'on passe & repasse avec complaisance sur les pas tortueux qu'on a faits, le chemin paraît frayé ; & quoiqu'il n'aboutisse à rien, tout le monde le suit, on adopte la

méthode , & l'on en reçoit les conséquences comme principes. Je pourrois en donner la preuve en exposant à nu l'origine de ce que l'on appelle principes dans toutes les sciences , abstraites ou réelles : dans les premières , la base générale des principes est l'abstraction , c'est-à-dire , une ou plusieurs suppositions (*b*) ; dans les autres , les principes ne sont que les conséquences , bonnes ou mauvaises , des méthodes que l'on a suivies. Et pour ne parler ici que de l'anatomie , le premier qui , surmontant la répugnance naturelle , s'avisa d'ouvrir un corps humain , ne crut-il pas qu'en le parcourant , en le disséquant , en le divisant dans toutes ses parties , il en connoîtroit bientôt la structure , le mécanisme & les fonctions ? mais ayant trouvé la chose infiniment plus compliquée qu'on ne pensoit , il fallut bientôt renoncer à ces prétentions , & l'on fut obligé de faire une méthode , non pas pour connoître & juger , mais seulement pour voir , & voir avec ordre. Cette méthode ne fut pas l'ouvrage d'un seul homme , puisqu'il a fallu tous les siècles pour la perfectionner , & qu'encore aujourd'hui elle occupe seule nos plus habiles Anatomistes ; cependant cette méthode n'est pas la science , ce n'est que le chemin qui devroit y conduire , & qui peut-être y auroit conduit en effet , si , au

[*b*] Voyez les preuves que j'en donne , vol. I de cet Ouvrage , à la fin du premier discours.

lieu de toujours marcher sur la même ligne dans un sentier étroit, on eût étendu la voie & mené de front l'anatomie de l'homme & celle des animaux. Car quelle connoissance réelle peut-on tirer d'un objet isolé ? le fondement de toute science n'est-il pas dans la comparaison que l'esprit humain fait faire des objets semblables & différens, de leurs propriétés analogues ou contraires, & de toutes leurs qualités relatives ? L'absolu, s'il existe, n'est pas du ressort de nos connaissances, nous ne jugeons & ne pouvons juger des choses que par les rapports qu'elles ont entr'elles ; ainsi, toutes les fois que dans une méthode on ne s'occupe que du sujet, qu'on le considère seul & indépendamment de ce qui lui ressemble & de ce qui en diffère, on ne peut arriver à aucune connoissance réelle, encore moins s'élever à aucun principe général ; on ne pourra donner que des noms & faire des descriptions de la chose & de toutes ses parties : aussi, depuis trois mille ans que l'on dissèque des cadavres humains, l'anatomie n'est encore qu'une nomenclature, & à peine a-t-on fait quelques pas vers son objet réel, qui est la science de l'économie animale. De plus, que de défauts dans la méthode elle-même, qui cependant devroit être claire & simple, puisqu'elle dépend de l'inspection & n'aboutit qu'à des dénominations ! comme l'on a pris cette connoissance nominale pour la vraie science, on ne s'est occupé qu'à augmenter, à multiplier le nombre des noms, au lieu de limiter celui des choses ; on s'est appesanti sur les détails,

on a voulu trouver des différences où tout étoit semblable ; en créant de nouveaux noms, on a cru donner des choses nouvelles ; on a décrit avec une exactitude minutieuse les plus petites parties , & la description de quelque partie encore plus petite , oubliée ou négligée par les anatomistes précédens , s'est appellée découverte : les dénominations elles-mêmes ayant souvent été prises d'objets qui n'avoient aucun rapport avec ceux qu'on vouloit désigner , n'ont servi qu'à augmenter la confusion. Ce que l'on appelle *Testes & Nates* dans le cerveau , qu'est-ce autre chose , sinon des parties de cervelle semblable au tout , & qui ne méritoient pas un nom ? Ces noms empruntés à l'aventure ou donnés par préjugé , ont ensuite produit eux-mêmes de nouveaux préjugés & des opinions de hasard ; d'autres noms donnés à des parties mal vues , ou qui n'existoient pas , ont été de nouvelles sources d'erreurs. Que de fonctions & d'usages n'a-t-on pas voulu donner à la glande pinéale , à l'espace prétendu vide qu'on appelle la *voute* dans le cerveau , tandis que l'un n'est qu'une glande , & qu'il est fort douteux que l'autre existe , puisque cet espace vide n'est peut-être produit que par la main de l'anatomiste & la méthode de dissection (c) !

Ce qu'il y a de plus difficile dans les sciences n'est donc pas de connoître les choses qui en font l'objet direct , mais c'est qu'il

[c] Voyez à ce sujet le discours de Sténon.

faut auparavant les dépouiller d'une infinité d'enveloppes dont on les a couvertes , leur ôter toutes les fausses couleurs dont on les a masquées , examiner le fondement & le produit de la méthode par laquelle on les recherche , en séparer ce que l'on y a mis d'arbitraire , & enfin tâcher de reconnoître les préjugés & les erreurs adoptées que ce mélange de l'arbitraire au réel a fait naître , il faut tout cela pour retrouver la Nature ; mais ensuite , pour la connoître. Il ne faut plus que la comparer avec elle-même. Dans l'économie animale , elle nous paroît très mystérieuse & très cachée , non-seulement parce que le sujet en est fort compliqué , & que le corps de l'homme est de toutes ses productions la moins simple , mais surtout parce qu'on ne l'a pas comparée avec elle-même , & qu'ayant négligé ces moyens de comparaison , qui seuls pouvoient nous donner des lumières , on est resté dans l'obscurité du doute , ou dans la vague des hypothèses. Nous avons des milliers de volumes sur la description du corps humain , & à peine a-t-on quelques mémoires commencés sur celle des animaux : dans l'homme on a reconnu , nommé , décrit les plus petites parties , tandis que l'on ignore si dans les animaux l'on retrouve , non-seulement ces petites parties , mais même les plus grandes ; on attribue certaines fonctions à de certains organes , sans être informé si dans d'autres êtres , quoique privés de ces organes , les mêmes fonctions ne s'exercent pas ; en sorte que dans toutes ces explications qu'on a voulu don-

tier des différentes parties de l'économie animale, on a eu le double désavantage d'avoir d'abord attaqué le sujet le plus compliqué, & ensuite d'avoir raisonné sur ce même sujet sans fondement de la relation, & sans le secours de l'analogie.

Nous avons suivi par-tout, dans le cours de cet ouvrage, une méthode très différente : comparant toujours la Nature avec elle-même, nous l'avons considérée dans ses rapports, dans ses opposés, dans ses extrêmes ; & pour ne citer ici que les parties relatives à l'économie animale, que nous avons eu occasion de traiter, comme la génération, les sens, le mouvement, le sentiment, la nature des animaux, il sera aisé de reconnoître qu'après le travail, quelquefois long, mais toujours nécessaire, pour écarter les fausses idées, détruire les préjugés, séparer l'arbitraire du réel de la chose ; le seul art que nous ayons employé est la comparaison : si nous avons réussi à répandre quelque lumière sur ces sujets, il faut moins l'attribuer au génie, qu'à cette méthode que nous avons suivie constamment, & que nous avons rendue aussi générale, aussi étendue que nos connaissances nous l'ont permis. Et comme tous les jours nous en acquérons de nouvelles par l'examen & la dissection des parties intérieures des animaux, & que pour bien raisonner sur l'économie animale, il faut avoir vu de cette façon au moins tous les genres d'animaux différens, nous ne nous préférerons pas de donner

des idées générales avant d'avoir présenté les résultats particuliers.

Nous nous contenterons de rappeler certains faits qui, quoique dépendans de la théorie du sentiment & de l'appétit, sur laquelle nous ne voulons pas, quant-à-présent, nous étendre davantage, suffiront cependant seuls pour prouver que l'homme, dans l'état de nature, ne s'est jamais borné à vivre d'herbes, de graines ou de fruits, & qu'il a dans tous les temps, aussi-bien que la plupart des animaux, cherché à se nourrir de chair.

La diète Pythagorique, préconisée par les Philosophes anciens & nouveaux, recommandée même par quelques Médecins, n'a jamais été indiquée par la Nature. Dans le premier âge aux siècles d'or, l'homme, innocent comme la colombe, mangeoit du gland, buvoit de l'eau ; trouvant partout sa subsistance, il étoit sans inquiétude, vivoit indépendant, toujours en paix avec lui-même, avec les animaux ; mais dès qu'oubliant sa noblesse, il sacrifia sa liberté pour se réunir aux autres, la guerre, l'âge de fer prirent la place de l'or & de la paix ; la cruauté, le goût de la chair & du sang furent les premiers fruits d'une nature dépravée, que les mœurs & les arts achievèrent de corrompre.

Voilà ce que dans tous les temps certains philosophes austères, sauvages par tempérament, ont reproché à l'homme en société : rehaussant leur orgueil individuel par l'humiliation de l'espèce entière, ils ont exposé

ce tableau , qui ne vaut que par le contraste , & peut-être parce qu'il est bon de présenter quelquefois aux hommes des chimères de bonheur .

Cet état idéal d'innocence , de haute tempérance , d'abstinence entière de la chair , de tranquillité parfaite , de paix profonde , a-t-il jamais existé ? n'est-ce pas un apologue , une fable , où l'on emploie l'homme comme un animal , pour nous donner des leçons ou des exemples ? peut-on même supposer qu'il y eût des vertus avant la société ; peut-on dire de bonne foi que cet état sauvage mérite nos regrets , que l'homme animal farouche fut plus digne que l'homme citoyen civilisé ? Oui , car tous les malheurs viennent de la société ; & qu'importe qu'il y eût des vertus dans l'état de nature , s'il y avoit du bonheur , si l'homme dans cet état étoit seulement moins malheureux qu'il ne l'est ; la liberté , la sanié , la force , ne sont-elles pas préférables à la mollesse , à la sensualité , à la volupté même , accompagnées de l'esclavage ? la privation des peines vaut bien l'usage des plaisirs ; & pour être heureux , que faut-il , sinon de ne rien désirer ?

Si cela est , disons en même temps qu'il est plus doux de végéter que de vivre , de ne rien appéter que de satisfaire son appétit , de dormir d'un sommeil apathique que d'ouvrir les yeux pour voir & pour sentir ; consentons à laisser notre ame dans l'engourdissement , notre esprit dans les ténèbres , à ne nous jamais servir ni de l'une ni de l'autre , à nous mettre au-dessous des animaux , à n'être enfin

que des masses de matière brute attachées à la terre.

Mais au lieu de disputer, discutons ; après avoir dit des raisons, donnons des faits. Nous avons sous les yeux, non l'état idéal, mais l'état réel de nature : le sauvage habitant les déserts est-il un animal tranquille ? est-il un homme heureux ; car nous ne supposerons pas avec un Philosophe, l'un des plus fiers censeurs de notre humanité (*d*), qu'il y a une plus grande distance de l'homme en pure nature au sauvage, que du sauvage à nous ; que les âges qui se sont écoulés avant l'invention de l'art de la parole, ont été bien plus longs que les siècles qu'il a fallu pour perfectionner les signes & les langues, parce qu'il me paraît que lorsqu'on veut raisonner sur des faits, il faut éloigner les suppositions, & se faire une loi de n'y remonter qu'après avoir épuisé tout ce que la Nature nous offre. Or, nous voyons qu'on descend par degrés assez insensibles des nations les plus éclairées, les plus polies, à des peuples moins industriels ; de ceux-ci à d'autres plus grossiers, mais encore soumis à des Rois, à des loix ; de ces hommes grossiers aux sauvages, qui ne se ressemblent pas tous, mais chez lesquels on trouve autant de nuances différentes que parmi les peuples polis ; que les uns forment des nations assez nombreuses soumises à des chefs ; que d'autres, en plus petite société, ne font soumis qu'à des

[*d*] M. Rousseau.

usages ; qu'enfin les plus solitaires , les plus indépendans , ne laissent pas de former des familles & d'être soumis à leurs pères. Un Empire , un Monarque , une famille , un pere , voilà les deux extrêmes de la société : ces extrêmes sont aussi les limites de la Nature ; si elles s'étendoient au-delà , n'auroit-on pas trouvé , en parcourant toutes les solitudes du globe , des animaux humains privés de la parole , sourds à la voix comme aux signes , les mâles & les femelles dispersés , les petits abandonnés , &c ? Je dis même qu'à moins de prétendre que la constitution du corps humain fût toute différente de ce qu'elle est aujourd'hui , & que son accroissement fût bien plus prompt , il n'est pas possible de soutenir que l'homme ait jamais existé sans former des familles , puisque les enfans périraient s'ils n'étoient secourus & soignés pendant plusieurs années ; au lieu que les animaux nouveaux-nés n'ont besoin de leur mere que pendant quelques mois. Cette nécessité physique suffit donc seule pour démontrer que l'espèce humaine n'a pu durer & se multiplier qu'à la faveur de la société ; que l'union des peres & meres aux enfans est naturelle , puisqu'elle est nécessaire. Or cette union ne peut manquer de produire un attachement respectif & durable entre les parens & l'enfant , & cela seul suffit encore pour qu'ils s'accoutument entr'eux à des gestes , à des signes , à des sons , en un mot à toutes les expressions du sentiment & du besoin ; ce qui est aussi prouvé par le fait , puisque les sauvages les plus solitaires ,

ont, comme les autres hommes, l'usage des signes & de la parole.

Ainsi l'état de pure nature est un état connu ; c'est le sauvage vivant dans le désert, mais vivant en famille, connoissant ses enfans, connu d'eux, usant de la parole & se faisant entendre. La fille sauvage ramassée dans les bois de Champagne, l'homme trouvé dans les forêts d'Hanovre, ne prouvent pas le contraire ; ils avoient vécu dans une folitude absolue, ils ne pouvoient donc avoir aucune idée de société, aucun usage des signes ou de la parole ; mais s'ils se fussent seulement rencontrés, la pente de nature les auroit réunis ; attachés l'un à l'autre, ils se seroient bientôt entendus, ils auroient d'abord parlé la langue de l'amour entre eux, & ensuite celle de la tendresse entre eux & leurs enfans ; & d'ailleurs ces deux Sauvages étoient issus d'hommes en société & avoient sans doute été abandonnés dans les bois, non pas dans le premier âge, car ils auroient péri ; mais à quatre, cinq ou six ans, à l'âge en un mot auquel ils étoient déjà assez forts de corps pour se procurer leur subsistance, & encore trop faibles de tête pour conserver les idées qu'on leur avoit communiquées.

Examinons donc cet homme en pure nature, c'est-à-dire, ce sauvage en famille. Pour peu qu'elle prospere, il sera bientôt le chef d'une société plus nombreuse, dont tous les membres auront les mêmes manieres, suivront les mêmes usages & parleront la même langue ; à la troisième, ou tout au plus tard à la quatrième génération, il y aura de

nouvelles familles qui pourront demeurer séparées, mais qui, toujours réunies par les liens communs des usages & du langage, formeront une petite nation ; laquelle s'augmentant avec le temps, pourra, suivant les circonstances, ou devenir un peuple, ou demeurer dans un état semblable à celui des nations sauvages que nous connoissons. Cela dépendra sur-tout de la proximité ou de l'éloignement où ces hommes nouveaux se trouveront des hommes polis : si, sous un climat doux, dans un terrain abondant, ils peuvent en liberté occuper un espace considérable au-delà duquel ils ne rencontrent que des solitudes ou des hommes tout aussi nus qu'eux, ils demeureront sauvages & deviendront, suivant d'autres circonstances, ennemis ou amis de leurs voisins ; mais lorsque sous un ciel dur, dans une terre ingrate, ils se trouveront gênés entre eux par le nombre & serrés par l'espace, ils feront des colonies ou des irruptions, ils se répandront, ils se confondront avec les autres peuples dont ils seront devenus les conquérans ou les esclaves. Ainsi l'homme, en tout état, dans toutes les situations & sous tous les climats, tend également à la société ; c'est un effet constant d'une cause nécessaire, puisqu'elle tient à l'essence même de l'espèce, c'est-à-dire, à sa propagation.

Voilà pour la société ; elle est, comme l'on voit, fondée sur la Nature. Examinant de même quels sont les appétits, quel est le goût de nos Sauvages, nous trouverons qu'aucun ne vit uniquement de fruits, d'herbes

ou de graines , que tous préfèrent la chair & le poisson aux autres alimens , que l'eau pure leur déplaît , & qu'ils cherchent les moyens de faire eux-mêmes ou de se procurer d'ailleurs une boisson moins insipide. Les Sauvages du Midi boivent l'eau du palmier ; ceux du Nord avalent à longs traits l'huile dégoûtante de la baleine ; d'autres font des boissons fermentées , & tous en général ont le goût le plus décidé , la passion la plus vive pour les liqueurs fortes. Leur industrie , dictée par les besoins de première nécessité , excitée par leurs appétits naturels , se réduit à faire des instrumens pour la chasse & pour la pêche. Un arc , des flèches , une massue , des filets , un canot , voilà le sublime de leurs arts , qui tous n'ont pour objet que les moyens de se procurer une subsistance convenable à leur goût. Et ce qui convient à leur goût , convient à la Nature ; car , comme nous l'avons déjà dit (e) , l'homme ne pourroit pas se nourrir d'herbe seule , il périssoit d'inanition s'il ne prenoit des alimens plus substantiels ; n'ayant qu'un estomac & des intestins courts , il ne peut pas , comme le bœuf qui a quatre estomacs & des boyaux très longs , prendre à la fois un grand volume de cette maigre nourriture , ce qui seroit cependant absolument nécessaire pour compenser la qualité par la quantité. Il en est à-peu-près de même des fruits & des grai-

[e] Voyez le premier volume de cet ouvrage , article du bœuf.

nes, elles ne lui suffroient pas , il en faudroit encore un trop grand volume pour fournir la quantité de molécules organiques nécessaire à la nutrition ; & quoique le pain soit fait de ce qu'il y a de plus pur dans le blé , & que le blé même & nos autres grains & légumes , ayant été perfectionnés par l'art , soient plus substantiels & plus nourrissans que les graines qui n'ont que leurs qualités naturelles , l'homme réduit au pain & aux légumes pour toute nourriture , traîneroit à peine une vie foible & languissante.

Voyez ces pieux solitaires qui s'abstinent de tout ce qui a eu vie , qui par de saints motifs renoncent aux dons du Créateur , se privent de la parole , fuient la société , s'enferment dans des murs sacrés contre lesquels se brise la Nature ; confinés dans ces asyles ou plutôt dans ces tombeaux vivans où l'on ne respire que la mort , le visage mortifié , les yeux éteints , ils ne jettent autour d'eux que des regards languissans ; leur vie semble ne se soutenir que par efforts , ils prennent leur nourriture sans que le besoin cesse : quoique soutenus par leur ferveur (car l'état de la tête fait à celui du corps) , ils ne résistent que pendant peu d'années à cette abstinence cruelle ; ils vivent moins qu'ils ne meurent chaque jour par une mort anticipée , & ne s'éteignent pas en finissant de vivre , mais en achevant de mourir .

Ainsi l'abstinence de toute chair , loin de convenir à la Nature , ne peut que la détruire : si l'homme y étoit réduit , il ne pour-

roit, du moins dans ces climats, ni subsister, ni se multiplier. Peut-être cette diète seroit possible dans les pays méridionaux, où les fruits sont plus cuits, les plantes plus substantielles, les racines plus succulentes, les graines plus nourries; cependant les Brachmanes font plutôt une secte qu'un peuple, & leur religion, quoique très ancienne, ne s'est guere étendue au-delà de leurs écoles, & jamais au-delà de leur climat.

Cette religion fondée sur la métaphysique, est un exemple frappant du sort des opinions humaines. On ne peut pas douter, en ramassant les débris qui nous restent, que les sciences n'ayent été très anciennement cultivées, & perfectionnées peut-être au-delà de ce qu'elles le sont aujourd'hui. On a su avant nous que tous les êtres animés contenoient des molécules indestructibles, toujours vivantes, & qui passoient de corps en corps. Cette vérité, adoptée par les Philosophes, & ensuite par un grand nombre d'hommes, ne conserva sa pureté que pendant les siècles de lumiere: une révolution de ténèbres ayant succédé, on ne se souvint des molécules organiques vivantes, que pour imaginer que ce qu'il y avoit de vivant dans l'animal étoit apparemment un tout indestructible, qui se séparoit du corps après la mort. On appela ce tout idéal, une *ame*, qu'on regarda bientôt comme un être réellement existant dans tous les animaux; & joignant à cet être fantastique l'idée réelle, mais défigurée, du passage des molécules vivantes, on dit qu'après la mort cette ame passoit

successivement & perpétuellement de corps en corps. On n'excepta pas l'homme ; on joignit bientôt le moral au métaphysique ; on ne douta pas que cet être survivant ne conservât , dans sa transmigration , ses sentiments , ses affections , ses désirs : les têtes foibles frémirent ! Quelle horreur en effet pour cette âme , lorsqu'au sortir d'un domicile agréable , il falloit aller habiter le corps infect d'un animal immonde ? On eut d'autres frayeurs (chaque crainte produit sa superstition), on eut peur en tuant un animal , d'égorger sa maîtresse ou son père ; on respecta toutes les bêtes , on les regarda comme son prochain ; on dit enfin qu'il falloit , par amour , par devoir , s'abstenir de tout ce qui avoit eu vie. Voilà l'origine & le progrès de cette religion , la plus ancienne du continent des Indes ; origine qui indique assez que la vérité livrée à la multitude est bientôt défigurée , qu'une opinion philosophique ne devient opinion populaire , qu'après avoir changé de forme ; mais qu'au moyen de cette préparation elle peut devenir une religion d'autant mieux fondée , que le préjugé sera plus général , & d'autant plus respectée , qu'ayant pour base des vérités mal entendues , elle sera nécessairement environnée d'obscurités , & par conséquent paraîtra mystérieuse , auguste , incompréhensible ; qu'ensuite , la crainte se mêlant au respect , cette religion dégénérera en superstitions , en pratiques ridicules , lesquelles cependant prendront racines , produiront des usages qui seront d'abord scrupuleusement sui-

vis, mais qui s'altérant peu-à-peu, changeront tellement avec le temps, que l'opinion même dont ils ont pris naissance ne se conservera plus que par de fausses traditions, par des proverbes, & finira par des contes puériles & des absurdités ; d'où l'on doit conclure que toute religion fondée sur des opinions humaines est fausse & variable, & qu'il n'a jamais appartenu qu'à Dieu de nous donner la vraie religion, qui ne dépendant pas de nos opinions, est inaltérable, constante, & sera toujours la même.

Mais revenons à notre sujet. L'abstinence entière de la chair ne peut qu'affoiblir la Nature. L'homme, pour se bien porter, a non-seulement besoin d'user de cette nourriture solide, mais même de la varier. S'il veut acquérir une vigueur complète, il faut qu'il choisisse ce qui lui convient le mieux ; & comme il ne peut se maintenir dans un état actif qu'en se procurant des sensations nouvelles, il faut qu'il donne à ses sens toute leur étendue, qu'il se permette la variété de mets comme celle des autres objets, & qu'il prévienne le dégoût qu'occasionne l'uniformité de nourriture ; mais qu'il évite les excès, qui sont encore plus nuisibles que l'abstinence.

Les animaux qui n'ont qu'un estomac & les intestins courts, sont forcés, comme l'homme, à se nourrir de chair. On s'assurera de ce rapport & de cette vérité en comparant au moyen des descriptions, le volume relatif du canal intestinal dans les animaux carnassiers & dans ceux qui ne vivent

que d'herbes : on trouvera toujours que cette différence dans leur maniere de vivre , dépend de leur conformation , & qu'ils prennent une nourriture plus ou moins solide , relativement à la capacité plus ou moins grande du magasin qui doit la recevoir.

Cependant il n'en faut pas conclure que les animaux qui ne vivent que d'herbes , soient , par nécessité physique , réduits à cette seule nourriture , comme les animaux carnassiers sont , par cette même nécessité , forcés à se nourrir de chair : nous disons seulement que ceux qui ont plusieurs estomacs ou des boyaux très amples , peuvent se passer de cet aliment substantiel & nécessaire aux autres ; mais nous ne disons pas qu'ils ne pussent en user , & que si la Nature leur eût donné des armes , non-seulement pour se défendre mais pour attaquer & pour saisir , ils n'en eussent fait usage & ne se fussent bientôt accoutumés à la chair & au sang , puisque nous voyons que les moutons , les veaux , les chèvres , les chevaux , mangent avidement le lait , les œufs , qui sont des nourritures animales , & que , sans être aidés de l'habitude , ils ne refusent pas la viande hachée & assaisonnée de sel . On pourroit donc dire que le goût pour la chair & pour les autres nourritures solides est l'appétit général de tous les animaux , qui s'exerce avec plus ou moins de véhémence ou de modération , selon la conformation particulière de chaque animal , puisqu'à prendre la Nature entière , ce même appétit se trouve non-seulement dans l'homme & dans les animaux

animaux quadrupèdes, mais aussi dans les oiseaux, dans les poissons, dans les insectes & dans les vers, auxquels en particulier il semble que toute chair ait été ultérieurement destinée.

La nutrition, dans tous les animaux, se fait par les molécules organiques, qui, séparées du marc de la nourriture au moyen de la digestion, se mêlent avec le sang & s'assimilent à toutes les parties du corps. Mais indépendamment de ce grand effet qui paraît être le principal but de la Nature, & qui est proportionnel à la qualité des alimens, ils en produisent un autre qui ne dépend que de leur quantité, c'est-à-dire, de leur masse & de leur volume. L'estomac & les boyaux sont des membranes souples qui forment au dedans du corps une capacité très considérable ; ces membranes, pour se soutenir dans leur état de tension, & pour contrebalancer les forces des autres parties qui les avoisinent, ont besoind'être toujours remplies en partie : si, faute de prendre de la nourriture, cette grande capacité se trouve entièrement vide, les membranes n'étant plus soutenues au dedans, s'affaissent, se rapprochent, se collent l'une contre l'autre, & c'est ce qui produit l'affaissement & la foibleesse, qui sont les premiers symptômes de l'extrême besoin. Les alimens, avant de servir à la nutrition du corps, lui servent donc de lest ; leur présence, leur volume, est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre les parties intérieures qui agissent & réagissent toutes les unes contre les autres. Lorsqu'on

meurt par la faim , c'est donc moins parce que le corps n'est pas nourri , que parce qu'il n'est plus lesté : aussi les animaux , surtout les plus gourmands , les plus voraces , lorsqu'ils sont pressés par le besoin ou seulement avertis par la défaillance qu'occasionne le vide intérieur , ne cherchent qu'à le remplir , & avalent de la terre & des pierres : nous avons trouvé de la glaise dans l'estomac d'un loup ; j'ai vu des cochons en manger ; la plupart des oiseaux avalent des cailloux , &c. Et ce n'est point par goût , mais par nécessité , & parce que le plus pressant n'est pas de rafraîchir le sang par un chyle nouveau , mais de maintenir l'équilibre des forces dans les grandes parties de la machine animale..



2




3



I



1 Le Loup. 2 Le Renard. 3 Le Blaireau



L E L O U P [a].

Voyez planche V, figure 1 de ce Volume.

LE Loup est l'un de ces animaux dont l'appétit pour la chair est le plus vénélement; & quoiqu'avec ce goût il ait reçu de la Nature les moyens de le satisfaire, qu'elle lui ait donné des armes, de la ruse, de l'agilité, de la force, tout ce qui est nécessaire en un mot pour trouver, attaquer, vaincre, saisir, & dévorer sa proie, cependant il meurt souvent de faim, parce que l'homme lui ayant déclaré la guerre, l'ayant même proscrit en mettant sa tête à prix, le force à fuir, à demeurer dans les bois, où il ne trouve que quelques animaux sauvages qui lui échappent par la vitesse de leur course, & qu'il ne peut surprendre que par hasard ou par patience, en les attendant long-temps, & sou-

(a) Le loup, en Grec, *Auxos*; en Latin, *lupus*; en Italien, *Lupo*; en Espagnol, *lobo*; en Allemand, *wolff*; en Anglois, *wolff*; en Suédois, *ulf*; en Polonois, *wilk*.

Lupus, Gesner, *Icon. animal. quadr.*, p. 79.

Lupus, Ray, *Synops. animal. quadr.* p. 173.

Canis caudā rectā, corpore breviore. Linn, edit. IV.

Canis caudā incurva edit. VI.

Lupus vulgaris. Klein, *Hist. nat. quad.* p. 70.

Canis ex griseo flavescens. *Lupus vulgaris*. Brisson, *Reg. animal.* p. 235.

vent en vain, dans les endroits où ils doivent passer. Il est naturellement grossier & poltron, mais il devient ingénieux par besoin, & hardi par nécessité ; pressé par la famine, il brave le danger, vient attaquer les animaux qui sont sous la garde de l'homme, ceux surtout qu'il peut emporter aisément, comme les agneaux, les petits chiens, les chevreaux ; & lorsque cette maraude lui réussit, il revient souvent à la charge, jusqu'à ce qu'ayant été blessé ou chassé & maltraité par les hommes & les chiens, il se recèle pendant le jour dans son fort, n'en sort que la nuit, parcourt la campagne rôde autour des habitations, ravit les animaux abandonnés, vient attaquer les bergeries, gratte & creuse la terre sous les portes, entre furieux, met tout à mort avant de choisir & d'emporter sa proie. Lorsque ces courses ne lui produisent rien, il retourne au fond des bois, se met en quête, cherche, suit à la piste, chasse, poursuit les animaux sauvages, dans l'espérance qu'un autre loup pourra les arrêter, les saisir dans leur fuite, & qu'ils en partageront la dépouille. Enfin, lorsque le besoin est extrême, il s'expose à tout, il attaque les femmes & les enfans, se jette même quelquefois sur les hommes, devient furieux par ces excès, qui finissent ordinairement par la rage & la mort.

Le loup, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ressemble si fort au chien, qu'il paraît être modelé sur la même forme ; cependant il n'offre tout au plus que le revers de l'em-

preinte , & ne présente les mêmes caractères que sous une face entièrement opposée : si la forme est semblable , ce qui en résulte est bien contraire ; le naturel est si différent , que non-seulement ils sont incompatibles , mais antipathiques par nature , ennemis par instinct. Un jeune chien frissonne au premier aspect du loup ; il fuit à l'odeur seule , qui , quoique nouvelle , inconnue , lui répugne si fort , qu'il vient en tremblant se ranger entre les jambes de son maître : un matin qui connoît ses forces , se hérisse , s'indigne , l'attaque avec courage , tâche de le mettre en suite , & fait tous ses efforts pour se délivrer d'une présence qui lui est odieuse ; jamais ils ne se rencontrent sans se fuir ou sans combattre , & combattre à outrance jusqu'à ce que la mort suive. Si le loup est le plus fort , il déchire , il dévore sa proie ; le chien au contraire , plus généreux , se contente de la victoire , & ne trouve pas que le *corps d'un ennemi mort sente bon* , il l'abandonne pour servir de pâture aux corbeaux , & même aux autres loups , car ils s'entre-dévoient ; & lorsqu'un loup est grièvement blessé , les autres le suivent au sang & s'attroupent pour l'achever.

Le chien , même sauvage , n'est pas d'un naturel farouche ; il s'apprivoise aisément , s'attache & demeure fidèle à son maître. Le loup pris jeune , le prive , mais ne s'attache point ; la nature est plus forte que l'éducation , il reprend avec l'âge son caractère féroce , & retourne , dès qu'il le peut , à son état sauvage. Les chiens , même les plus

grossiers, cherchent la compagnie des autres animaux ; ils sont naturellement portés à les suivre & à les accompagner ; & c'est par instinct seul, & non par éducation, qu'ils savent conduire & garder les troupeaux. Le loup est au contraire l'ennemi de toute société, il ne fait pas même compagnie à ceux de son espèce ; lorsqu'on les voit plusieurs ensemble, ce n'est point une société de paix, c'est un attrouement de guerre, qui se fait à grand bruit avec des hurlements affreux, & qui dénote un projet d'attaquer quelque gros animal, comme un cerf, un bœuf, ou de se défaire de quelque redoutable matin. Dès que leur expédition militaire est consommée, ils se séparent & retournent en silence à leur solitude. Il n'y a pas même une grande habitude entre le mâle & la femelle ; ils ne se cherchent qu'une fois par an, & ne demeurent que peu de temps ensemble. C'est en hiver que les louves deviennent en chaleur : plusieurs mâles suivent la même femelle, & cet attrouement est encore plus sanguinaire que le premier ; car ils se la disputent cruellement, ils grondent, ils frémissent, ils se battent, ils se déchirent, & il arrive souvent qu'ils mettent en pièces celui d'entr'eux qu'elle a préféré. Ordinairement elle fuit long-temps, laisse tous ses aspirans, & se dérobe, pendant qu'ils dorment, avec le plus allerte ou le mieux aimé.

La chaleur ne dure que douze ou quinze jours, & commence par les plus vieilles louves ; celle des plus jeunes n'arrive que

plus tard. Les mâles n'ont point de rut marqué , ils pourroient s'accoupler en tout temps ; ils passent successivement de femelles en femelles à mesure qu'elles deviennent en état de les recevoir ; ils ont des vieilles à la fin de décembre , & finissent par les jeunes au mois de février & au commencement de mars. Le temps de la gestation est d'environ trois mois & demi (*b*) , & l'on trouve des louveteaux nouveaux-nés depuis la fin d'avril jusqu'au mois de juillet. Cette différence dans la durée de la gestation entre les louves , qui portent plus de cent jours , & les chiens qui n'en portent guere plus de soixante , prouve que le loup & le chien , déjà si différents par le naturel , le sont aussi par le tempérament & par l'un des principaux résultats des fonctions de l'économie animale. Aussi le loup & le chien n'ont jamais été pris pour le même animal que par les nomencrateurs en histoire naturelle , qui ne connoissoit la Nature que superficiellement , ne la considèrent jamais pour lui donner toute son étendue , mais seulement pour la resserrer & la réduire à leur méthode , toujours fautive , & souvent démentie par les faits. Le chien & la louve ne peuvent ni s'accoupler (*c*) ni produire ensemble , il n'y a pas de races intermédiaires en-

(*b*) Voyez le nouveau traité de Vénérerie. Paris , 1750 , pages 75 & 76.

(*c*) Voyez les expériences que j'ai faites à ce sujet , vol. I quadr. de cet ouvrage , à l'article du chien.

tr'eux ; il sont d'un naturel tout opposé , d'un tempérément différent ; le loup vit plus long-temps que le chien ; les louves ne portent qu'une fois par an , les chiennes portent deux ou trois fois. Ces différences si marquées sont plus que suffisantes pour démontrer que ces animaux sont d'espèces assez éloignées : d'ailleurs , en y regardant de près , on reconnoît aisément que , même à l'extérieur , le loup diffère du chien par des caractères essentiels & constants. L'aspect de la tête est différent , la forme des os l'est aussi ; le loup a la cavité de l'œil obliquement posée , l'orbite inclinée , les yeux étincelans , brillans pendant la nuit ; il a le hurlement au lieu de l'aboïement , les mouvements différens , la démarche plus égale , plus uniforme , quoique plus prompte & plus précipitée , le corps beaucoup plus fort & bien moins souple (*d*) , les membres plus fermes , les mâchoires & les dents plus grosses ; le poil plus rude & plus fourré.

Mais ces animaux se ressemblent beaucoup par la conformation des parties intérieures. Les loups s'accouplent comme les chiens ; ils ont comme eux la verge oseuse & environnée d'un bourlet qui se gonfle & les em-

(d) Aristote a dit mal-à-propos que le loup avoit dans le cou un seul os continu ; le loup a , comme le chien & comme les autres animaux quadrupèdes , plusieurs vertèbres dans le cou , & il peut le flétrir & le plier de la même façon : on trouve seulement quelquefois une des vertèbres lombaires adhérente à la vertèbre voisine.

pêche de se séparer. Lorsque les louves sont prêtes à mettre bas , elles cherchent au fond du bois un fort , un endroit bien fourré , au milieu duquel elles applanissent un espace assez considérable en coupant , en arrachant les épines avec les dents ; elles y apportent ensuite une grande quantité de mousse ; & préparent un lit commode pour leurs petits ; elles en font ordinairement cinq ou six , quelquefois sept , huit & même neuf , & jamais moins de trois ; ils naissent les yeux fermés comme les chiens , la mère les allaite pendant quelques semaines & leur apprend bientôt à manger de la chair qu'elle leur prépare en la mâchant. Quelque temps après elle leur apporte des mulots , des levreaux , des perdrix , des volailles vivantes ; les louveteaux commencent par jouer avec elles & finissent par les étrangler , la louve ensuite les déplume , les écorche , les déchire , & en donne une part à chacun. Ils ne sortent du fort où ils ont pris naissance , qu'au bout de six semaines ou deux mois ; ils suivent alors leur mère qui les mène boire dans quelque tronc d'arbre ou à quelque mare voisine ; elle les ramène au gîte , ou les oblige à se receler ailleurs lorsqu'elle craint quelque danger. Ils la suivent ainsi pendant plusieurs mois. Quand on les attaque , elle les défend de toutes ses forces ; & même avec fureur : quoique dans les autres temps elle soit , comme toutes les femelles , plus timide que le mâle ; lorsqu'elle a des petits elle devient intrépide , semble

ne rien craindre pour elle , & s'expose à tout pour les sauver : aussi ne l'abandonnent-ils que quand leur éducation est faite , quand il se sentent assez forts pour n'avoir plus besoin de secours , c'est ordinairement à dix mois ou un an , lorsqu'ils ont refait leurs premières dents , qui tombent à six mois (e) , & lorsqu'ils ont acquis de la force , des armes & des talens pour la rapine

Les mâles & les femelles sont en état d'engendrer à l'âge d'environ deux ans. Il est à croire que les femelles , comme dans presque toutes les autres espèces , sont à cet égard plus précocees que les mâles : ce qu'il y a de sûr , c'est qu'elles ne deviennent en chaleur tout au plutôt qu'au second hiver de leur vie , ce qui suppose dix-huit ou vingt mois d'âge , & qu'une louve que j'ai fait élever n'est entrée en chaleur qu'au troisième hiver , c'est-à-dire , à plus de deux ans & demi. Les chasseurs (f) assurent que dans toutes les portées il y a plus de mâles que de femelles ; cela confirme cette observation qui paroît générale , du moins dans ces climats , que dans toutes les espèces , à commencer par celle de l'homme , la Nature produit plus de mâles que de femelles. Ils disent aussi qu'il y a des loups qui dès le temps de la chaleur s'attachent à leur femelle , l'accompagnent toujours jusqu'à ce qu'elle soit sur le point

[e] V. *la Venerie de du Fouilloux. Paris , 1613 , page 109 , verso.*

(f) Voyez le nouveau *Traité de la Vénérerie* , p. 276.

de mettre bas ; qu'alors elle se dérobe , cache soigneusement ses petits , de peur que leur pere ne les dévore en naissant ; mais que lorsqu'ils sont nés , il prend de l'affection pour eux , leur apporte à manger , & que si la mere vient à manquer , il la remplace & en prend soin comme elle. Je ne puis assurer ces faits , qui me paroissent même un peu contradictoires. Ces animaux qui sont deux ou trois ans à croître , vivent quinze ou vingt ans ; ce qui s'accorde encore avec ce que nous avons observé sur beaucoup d'autres espèces , dans lesquelles le temps de l'accroissement fait la septième partie de la durée totale de la vie. Les loups blanchissent dans la vieillesse , ils ont alors toutes les dents usées. Ils dorment lorsqu'ils sont rassasiés ou fatigués , mais plus le jour que la nuit , & toujours d'un sommeil léger ; ils boivent fréquemment , & dans les temps de sécheresse , lorsqu'il n'y a point d'eau dans les ornières ou dans les vieux troncs d'arbres , ils viennent plus d'une fois par jour aux mares & aux ruisseaux. Quoique très voraces , ils supportent aisément la diète ; ils peuvent passer quatre ou cinq jours sans manger , pourvu qu'ils ne manquent pas d'eau.

Le loup a beaucoup de force , surtout dans les parties antérieures du corps , dans les muscles du cou & de la mâchoire. Il porte avec sa gueule un mouton , sans le laisser toucher à terre , & court en même temps plus vite que les bergers , en sorte qu'il n'y a que les chiens qui puissent l'atteindre & lui faire lâcher

prise. Il mord cruellement , & toujours avec d'autant plus d'acharnement qu'on lui résiste moins ; car il prend des précautions avec les animaux qui peuvent se défendre. Il craint pour lui , & ne se bat que par nécessité , & jamais par un mouvement de courage : lorsqu'on le tire & que la balle lui casse quelque membre il crie , & cependant lorsqu'on l'achève à coups de bâton , il ne se plaint pas comme le chien ; il est plus dur , moins sensible , plus robuste ; il marche , court , rôde des jours entiers & des nuits ; il est infatigable , & c'est peut-être de tous les animaux le plus difficile à forcer à la course. Le chien est doux & courageux ; le loup , quoique féroce , est timide. Lorsqu'il tombe dans un piège , il est si fort & si long-temps épouvanté , qu'on peut ou le tuer sans qu'il se défende , ou le prendre vivant sans qu'il résiste ; on peut lui mettre un collier , l'enchaîner , le museler , le conduire ensuite par-tout où l'on veut sans qu'il ose donner le moindre signe de colere ou même de mécontentement. Le loup a les sens très bons , l'œil , l'oreille , & surtout l'odorat , il sent souvent de plus loin qu'il ne voit : l'odeur du carnage l'attire de plus d'une lieue ; il sent aussi de loin les animaux vivans , il les chasse même assez long-temps en les suivant aux portées. Lorsqu'il veut sortir du bois , jamais il ne manque de prendre le vent ; il s'arrête sur la lisiere , évente de tous côtés , & reçoit ainsi les émanations des corps morts ou vivans que le vent lui apporte de loin. Il préfère la chair vivante

à la morte, & cependant il dévore les voies
rites les plus infectes. Il aime la chair hu-
maine, & peut-être, s'il étoit le plus fort,
n'en mangeroit-il pas d'autre. On a vu des
loups suivre les armées, arriver en nombre
à des champs de bataille où l'on n'a-
voit enterré que négligemment les corps,
les découvrir, les dévorer avec une insa-
tiable avidité, & ces mêmes loups, accou-
tumés à la chair humaine, se jeter ensuite
sur les hommes, attaquer le berger plutôt
que le troupeau, dévorer des femmes, em-
porter des enfans, &c. L'on a appelle ces
mauvais loups, *loups garoux* (g), c'est-à-
dire, loups dont il faut se garder.

On est donc obligé quelquefois d'armer
tout un pays pour se défaire des loups. Les
Princes ont des équipages pour cette chasse,
qui n'est point désagréable, qui est utile,
& même nécessaire. Les chasseurs distinguent
les loups en *jeunes loups*, *vieux loups*, & *grands
vieux loups*; ils les connaissent par les *pieds*,
c'est-à-dire par les *voies*, les traces qu'ils
laissent sur la terre: plus le loup est âgé,
plus il a le pied gros; la louve l'a plus
long & plus étroit, elle a aussi le talon plus
petit & les ongles plus minces. On a be-
soin d'un bon limier pour la quête du loup,
il faut même l'animer, l'encourager, lors-
qu'il tombe sur la voie; car tous les chiens
ont de la répugnance pour le loup, & se
rabattent froidement. Quand le loup est dé-

(g) Voyez la chasse du loup, de Gaston Phœbus.

tourné , on amène les levriers qui doivent le chasser , on les partage en deux ou trois laisses , on n'en garde qu'une pour le lancer , & on mène les autres en avant pour servir de relais. On lâche donc d'abord les premiers à sa suite , un homme à cheval les appuie ; on lâche les seconds à sept ou huit cents pas plus loin , lorsque le loup est prêt à passer , & ensuite les troisièmes lorsque les autres chiens commencent à le joindre & à le harceler. Tous ensemble le réduisent bientôt aux dernières extrémités , & le veneur l'achève en lui donnant un coup de couteau. Les chiens n'ont nulle ardeur pour le fouler , & répugnent si fort à manger de sa chair , qu'il faut la préparer & l'affaisonner lorsqu'on veut leur en faire curée. On peut aussi le chasser avec des chiens courans ; mais comme il perce toujours droit en avant , & qu'il court tout un jour sans être rendu , cette chasse est ennuyeuse , à moins que les chiens courans ne soient soutenus par des levriers qui le faisaissent , le harcelent , & leur donnent le temps de l'approcher.

Dans les campagnes , on fait des battues à force d'hommes & de mâtins , on tend des pièges , on présente des appâts , on fait des fosses , on répand des boulettes empoisonnées ; tout cela n'empêche pas que ces animaux ne soient toujours en même nombre , surtout dans les pays où il y a beaucoup de bois. Les Anglois prétendent en avoir purgé leur isle , cependant on m'a assuré qu'il y en avoit en Ecosse. Comme il y a peu de bois dans la partie méridionale

de la Grande-Bretagne , on a eu plus de facilité pour les détruire.

La couleur & le poil de ces animaux changent suivant les différens climats , & varient quelquefois dans le même pays. On trouve en France & en Allemagne , outre les loups ordinaires , quelques loups à poil plus épais & tirant sur le jaune. Ces loups plus sauvages & moins nuisibles que les autres , n'approchent jamais ni des maisons , ni des troupeaux , & ne vivent que de chasse & non pas de rapine. Dans les pays du nord , on en trouve de tout blancs & de tout noirs ; ces derniers sont plus grands & plus forts que les autres. L'espèce commune est très généralement répandue , on l'a trouvée en Asie (h) , en Afrique (i) & en Amérique (k) comme en Europe. Les loups du Sénégal (l) ressemblent à ceux de France , cependant ils sont un peu plus gros , & beaucoup plus cruels ; ceux d'Egypte sont plus petits que ceux de Grèce (m). En Orient , & surtout en Perse , on fait servir les loups

(h) Voyez le voyage de Pietro della Valle. Rouen , 1745 , vol IV , pages 4 & 5.

(i) V. l'Histoire générale des voyages , par M. l'abbé Prevost , tome V , page 85.

(k) V. le voyage du P. Leclercq. Paris , 1691 , pages 488 & 489.

(l) V. l'Histoire générale des voyages , par M. l'abbé Prevost , tome III , page 285. Voyez aussi le voyage du sieur Lemaire aux îles Canaries , Cap verd , Sénégal , &c. Paris , 1695 , p. 100.

(m) Vide Aristot. hist. animal. lib. VIII , cap. 28.

à des spectacles pour le peuple (*n*) ; on les exerce de jeunesse à la danse, ou plutôt à une espèce de lutte contre un grand nombre d'hommes. On achette jusqu'à cinq cents écus, dit Chardin, un loup bien dressé à la danse. Ce fait prouve au moins qu'à force de temps & de contrainte ces animaux sont susceptibles de quelque espèce d'éducation. J'en ai fait éléver & nourrir quelques-uns chez moi : tant qu'ils sont jeunes, c'est à dire, dans la première & la seconde année, ils sont assez dociles, ils sont même caressans, & s'ils sont bien nourris, ils ne se jettent ni sur la volaille, ni sur les autres animaux ; mais à dix-huit mois ou deux ans ils reviennent à leur naturel, on est obligé de les enchaîner pour les empêcher de s'enfuir & de faire du mal. J'en ai eu un qui ayant été élevé en toute liberté dans une basse-cour avec des poules pendant dix-huit ou dix-neuf mois, ne les avoit jamais attaquées, mais pour son coup d'essai ; il les tua toutes en une nuit sans en manger aucune ; un autre qui ayant rompu sa chaîne à l'âge d'environ deux ans, s'enfuit après avoir tué un chien avec lequel il étoit familier ; une louve que j'ai gardée trois ans, & qui quoiqu'enfermée toute jeune & seule avec un mâtin de même âge dans une cour assez spacieuse, n'a pu

(*n*) *V.* le voyage de Chardin. Londres, 1686. *V.* aussi le voyage de Pietro della Valie. Rouen, 1745, vol. IV, page 4.

pendant tout ce temps s'accoutumer à vivre avec lui, ni le souffrir, même quand elle devint en chaleur. Quoique plus foible, elle étoit la plus méchante, elle provoquoit, elle attaquoit, elle mordoit le chien, qui d'abord ne fit que se defendre, mais qui finit par l'étrangler.

Il n'y a rien de bon dans cet animal que sa peau; on en fait des fourrures grossières, qui sont chaudes & durables. Sa chair est si mauvaise, qu'elle répugne à tous les animaux, & il n'y a que le loup qui mange volontiers du loup. Il exhale une odeur infecte par la gueule: comme pour assouvir sa faim, il avale indistinctement tout ce qu'il trouve, des chairs corrompues, des os, du poil, des peaux à demi tannées & encore toutes couvertes de chaux, il vomit fréquemment, & se vide encore plus souvent qu'il ne se remplit. Enfin, désagréable en tout, la mine basse, l'aspect sauvage, la voix effrayante, l'odeur insupportable, le naturel pervers, les mœurs féroces, il est odieux, nuisible de son vivant, inutile après sa mort.



LE RENARD [a].

Voyez planche V , figure 2 de ce Volume.

LE Renard est fameux par ses ruses , & mérite en partie sa réputation ; ce que le loup ne fait que par la force , il le fait par adresse , & réussit plus souvent. Sans chercher à combattre les chiens ni les bergers , sans attaquer les troupeaux , sans traîner les cadavres , il est plus sûr de vivre. Il emploie plus d'esprit que de mouvement , ses ressources semblent être en lui-même : ce sont , comme l'on fait , celles qui manquent le moins. Fin au-tant que circonspect , ingénieux & prudent , même jusqu'à la patience , il varie sa conduite , il a des moyens de réserve qu'il fait n'employer qu'à propos. Il veille de près à sa conservation ; quoiqu'aussi infatigable , & même plus léger que le loup , il ne se fie pas entièrement

[a]) Le Renard , en Grec. Αλεπης ; en Latin, *Vulpes* ; en Italien , *Volpe* ; en Espagnol , *Raposa* ; en Allemand , *Fuchſſ* ; en Anglois , *Fox* ; en Suédois , *Ræf* ; en Polonois. *Liszka*.

Vulpes , Gesner. *Icon. animal. quadr.* p. 88.

Vulpes , Ray. *Synops. animal. quadr.* page 177.

Canis caudâ rectâ. Linnæus.

Vulpes vulgaris. Klein. *hist. nat. quad.* p. 77.

Canis fulvus . pileis cinereis intermixtis. Brisson. *Regn. animal.* page 239.

à la véteſſe de ſa course , il fait ſe mettre en ſûreté en ſe pratiquant un aſyle où il ſe retire dans les dangers pressans , où il s'établit , où il élève ſes petits ; il n'eft point animal vagabond , mais animal domicilié.

Cette diſſérence , qui fe fait ſentir même parmi les hommes , a de bien plus grands effets , & ſuſpoſe de bien plus grandes cauſes parmi les animaux. L'idée ſeule du domi-
cile pŕefuppoſe une attention ſinguliere ſur ſoi-même ; ensuite le choix du lieu , l'art de faire ſon manoir , de le rendre commode , d'en dérober l'entrée , ſont autant d'indices d'un ſentiment ſupérieur. Le renard en eſt doué , & tourne tout à ſon profit ; il ſe loge au bord des bois , à portée des hameaux ; il écoute le chant des coqs & le cri des vo-
lailes ; il les favoure de loin , il prend habilement ſon temps , cache ſon deſſein & ſa marche , ſe gliffe , ſe traîne , arrive , & fait rarement des tentatives inutiles. S'il peut franchir les clôtures , ou paſſer par-deſſous , il ne perd pas un instant , il ravage la basſe-
cour , il y met tout à mort , ſe retire en-
ſuite leſtemenr en emportant ſa proie , qu'il cache ſous la mousse , ou porte à ſon ter-
rier ; il revient quelques momens après en chercher une autre , qu'il emporte & cache de même , mais dans un autre endroit , enſuite une troiſième , une quatrième , &c. jusqu'à ce que le jour ou le mouvement dans la maſion l'avertiffe qu'il faut ſe retirer & ne plus revenir. Il fait la même manœuvre dans les pipées & dans les poquetaux où l'on prend les grives & les bécasses au lacer ;

il devance le pipeur , va de très grand matin , & souvent plus d'une fois par jour visiter les lacets , les gluaux , emporte successivement les oiseaux qui se sont empêtrés , les dépose tous en différens endroits , sur tout au bord des chemins , dans les ornières , sous de la mousse , sous un genièvre , les y laisse quelquefois deux ou trois jours , & fait parfaitement les retrouver au besoin . Il chasse les jeunes levreaux en plaine ; saisit quelquefois les lièvres au gîte , ne les manque jamais lorsqu'ils sont blessés , déterre les lapreaux dans les garennes , découvre les nids de perdrix , de cailles , prend la mère sur les œufs , & détruit une quantité prodigieuse de gibier . Le loup nuit plus au paysan , le renard nuit plus au gentilhomme .

La chasse du renard demande moins d'appareil que celle du loup ; elle est plus facile & plus amusante . Tous les chiens ont de la répugnance pour le loup , tous les chiens au contraire , chassent le renard volontiers , & même avec plaisir ; car quoiqu'il ait l'odeur très forte , ils le préfèrent souvent au cerf , au chevreuil & au lièvre . On peut le chasser avec des bassetts , des chiens courans , des briquets : dès qu'il se sent poursuivi , il court à son terrier ; les bassetts à jambes tortes sont ceux qui s'y glissent le plus aisément : cette maniere est bonne pour prendre une portée entière de renards , la mère avec les petits ; pendant qu'elle se défend & combat les bassetts , on tâche de découvrir le terrier par-dessus , & on la tue

ou on la faisit vivante avec des pinces. Mais comme les terriers sont souvent dans des rochers , sous des troncs d'arbres , & quelquefois trop enfoncés sous terre , on ne réussit pas toujours. La façon la plus ordinaire , la plus agréable & la plus sûre de chasser le renard , est de commencer par boucher les terriers : on place les tireurs à portée , on quête alors avec les briquets ; dès qu'ils font tombés sur la voie , le renard gagne son gîte , mais en arrivant il effuie une première décharge : s'il échappe à la balle , il fuit de toute sa vitesse , fait un grand tour , & revient encore à son terrier , on le tire une seconde fois , & où trouvant l'entrée fermée , il prend le parti de se sauver au loin en perçant droit en avant pour ne plus revenir. C'est alors qu'on se fert des chiens courans , lorsqu'on veut le poursuivre : il ne laissera pas de les fatiguer beaucoup , parce qu'il passe à dessein dans les endroits les plus fourrés , où les chiens ont grand peine à le suivre , & que quand il prend la plaine il va très loin sans s'arrêter.

Pour détruire les renards , il est encore plus commode de tendre des pièges , où l'on met de la chair pour appât , un pigeon , une volaille vivante , &c. Je fis un jour suspendre à neuf pieds de hauteur sur un arbre , les débris d'une halte de chasse , de la viande , du pain , des os ; dès la première nuit les renards s'étoient si fort exercés à sauter , que le terrain autour de l'arbre étoit battu comme une aire de grange .

Le renard est aussi vorace que carnassier ; il mange de tout avec une égale avidité , des œufs , du lait , du fromage , des fruits , & surtout des raisins : lorsque les levreaux & les perdrix lui manquent , il se rabat sur les rats , les mulots , les serpens , les lézards , les crapauds , &c. il en détruit un grand nombre ; c'est là le seul bien qu'il procure. Il est très avide de miel , il attaque les abeilles sauvages , les guêpes , les frelons , qui d'abord tâchent de le mettre en fuite , en le perçant de mille coups d'aiguillon ; il se retire en effet , mais c'est en se roulant pour les écraser , & il revient si souvent à la charge , qu'il les oblige à abandonner le guêpier ; alors il le déterre & en mange le miel & la cire. Il prend aussi les hérissons , les roule avec ses pieds , & les force à s'étendre. Enfin , il mange du poisson , des écrevisses , des haninetons , des sauterelles , &c.

Cet animal ressemble beaucoup au chien , surtout par les parties intérieures ; cependant il en diffère par la tête , qu'il a plus grosse à proportion de son corps ; il a aussi les oreilles plus courtes , la queue beaucoup plus grande , le poil plus long & plus touffu , les yeux plus inclinés ; il en diffère encore par une mauvaise odeur très forte qui lui est particulière , & enfin par le caractère le plus essentiel , par le naturel ; car il ne s'apprivoise pas aisément , & jamais tout-à-fait : il languit lorsqu'il n'a pas la liberté , & meurt d'ennui quand on veut le garder trop long-temps en domesticité. Il ne s'accouple point

avec la chienne (*b*) ; s'ils ne sont pas antipathiques, ils sont au moins indifférens. Il produit en moindre nombre, & une seule fois par an ; les portées sont ordinairement de quatre ou cinq, rarement de six, & jamais moins de trois. Lorsque la femelle est pleine, elle se recèle, sort rarement de son terrier, dans lequel elle prépare un lit à ses petits. Elle devient en chaleur en hiver, & l'on trouve déjà de petits renards au mois d'avril : lorsqu'elle s'apperçoit que sa retraite est découverte, & qu'en son absence ses petits ont été inquiétés, elle les transporte tous les uns après les autres, & va chercher un autre domicile. Ils naissent les yeux fermés, ils sont, comme les chiens, dix-huit mois ou deux ans à croître, & vivent de même treize ou quatorze ans.

Le renard a les sens aussi bons que le loup, le sentiment plus fin, & l'organe de la voix plus souple & plus parfait. Le loup ne se fait entendre que par des hurlements affreux, le renard glapit, aboie, & pousse un son triste, semblable au cri du paon ; il a des tons differens selon les sentimens différens dont il est affecté ; il a la voix de la chasse, l'accent du désir, le son du murmure, le ton plaintif de la tristesse, le cri de la douleur, qu'il ne fait jamais entendre qu'au moment où il reçoit un coup de feu qui lui casse quelque membre ; car il ne crie point pour

(*b*) Voyez les expériences que j'ai faites à ce sujet, vol. 1 de cet ouvrage, article du chien.

toute autre blessure , & il se laisse tuer à coups de bâton , comme le loup , sans se plaindre , mais toujours en se défendant avec courage. Il mord dangereusement , opiniâtrement , & l'on est obligé de se servir d'un ferrement ou d'un bâton pour le faire démordre. Son glapissement est une espèce d'abolement qui se fait par des sons semblables & très précipités. C'est ordinairement à la fin du glapissement qu'il donne un coup de voix plus fort , plus élevé , & semblable au cri du paon. En hiver , surtout pendant la neige & la gelée , il ne cesse de donner de la voix , & il est au contraire presque muet en été. C'est dans cette saison que son poil tombe & se renouvelle ; l'on fait peu de cas de la peau des jeunes renards , ou des renards pris en été. La chair du renard est moins mauvaise que celle du loup , les chiens & même les homimes en mangent en automne , surtout lorsqu'il s'est nourri & engrangé de raisins , & sa peau d'hiver fait de bonnes fourrures. Il a le sommeil profond , on l'approche aisément sans l'éveiller : lorsqu'il dort , il se met en rond comme les chiens ; mais lorsqu'il ne fait que se reposer , il étend les jambes de derrière & demeure étendu sur le ventre : c'est dans cette posture qu'il épie les oiseaux le long des haies. Ils ont pour lui une si grande antipathie , que dès qu'ils l'aperçoivent ils font un petit cri d'avertissement ; les geais , les merles surtout le conduisent du haut des arbres , répètent souvent le petit cri d'avis , & le suivent

vent quelquefois à plus de deux ou trois cents pas.

J'ai fait élever quelques renards pris jeunes : comme ils ont une odeur très forte , on ne peut les tenir que dans des lieux éloignés , dans des écuries , des étables , où l'on n'est pas à portée de les voir souvent ; & c'est peut-être par cette raison qu'ils s'apprivoisent moins que le loup , qu'on peut garder plus près de la maison . Dès l'âge de cinq à six mois les jeunes renards courroient après les canards & les poules , & il fallut les enchaîner . J'en fis garder trois pendant deux ans , une femelle & deux mâles : on tenta inutilement de le faire accoupler avec des chiennes ; quoiqu'ils n'eussent jamais vu des femelles de leur espèce , & qu'ils parussent pressés du besoin de jouir , ils ne purent s'y déterminer , ils refusèrent constamment toutes les chiennes ; mais dès qu'on leur présenta leur femelle légitime , ils la couvrirent quoiqu'enchaînés , & elle produisit quatre petits . Ces mêmes renards qui se jetoient sur les poules lorsqu'ils étoient en liberté , n'y touchoient plus dès qu'ils avoient leur chaîne : on attachoit souvent auprès d'eux une poule vivante , on les laissoit passer la nuit ensemble , on les fairoit même jeûner auparavant ; malgré le besoin & la commodité , ils n'oublioient pas qu'ils étoient enchaînés , & ne touchoient point à la poule .

Cette espèce est une des plus sujettes aux influences du climat , & l'on y trouve presque autant de variétés que dans les es-

pèces d'animaux domestiques. La plupart de nos renards sont roux, mais il s'en trouve aussi dont le poil est gris-argenté; tous deux ont le bout de la queue blanc. Les derniers s'appellent en Bourgogne, renards, *charbonniers*, parce qu'ils ont les pieds plus noirs que les autres. Ils paroissent aussi avoir le corps plus court, parce que leur poil est plus fourni. Il y en a d'autres qui ont le corps réellement plus long que les autres, & qui sont d'un gris-sale, à-peu-près de la couleur des vieux loups; mais je ne puis décider si cette différence de couleur est une vraie variété, ou si elle n'est produite que par l'âge de l'animal qui peut-être blanchit en vieillissant. Dans les pays du nord il y en a de toutes couleurs, des noirs, des bleus, des gris, des gris-de-fer, des gris-argentés, de blancs, des blancs à pieds fauves, des blancs à tête noire, des blancs avec le bout de la queue noir, des roux avec la gorge & le ventre entièrement blancs, sans aucun mélange de noir, & enfin des croisés qui ont une ligne noire le long de l'épine du dos, & une autre ligne noire sur les épaules, qui traverse la première : ces derniers sont plus grands que les autres, & ont la gorge noire. L'espèce commune est plus généralement répandue qu'aucune des autres, on la trouve par-tout, en Europe (*c*), dans l'Asie septentrionale (*d*)

(c) *Voyez les œuvres de Regnard.* Paris, 1742, tom. I, page 175.

(d) *V. la relation du voyage d'Adam Olæarius.* Paris, 1656, tome I, page 368.

& tempérée ; on la trouve de même en Amérique (*e*), mais elle est fort rare en Afrique & dans les pays voisins de l'Équateur. Les Voyageurs qui disent en avoir vu à Calécut (*f*) & dans les autres provinces des Indes, ont pris les chacals pour des renards. Aristote lui-même est tombé dans une erreur semblable, lorsqu'il a dit (*g*) que les renards d'Égypte étoient plus petits que ceux de Grèce, ces petits renards d'Égypte sont des putois (*h*), dont l'odeur est insupportable. Nos renards, originaires des climats froids, sont devenus naturels aux pays tempérés, & ne se sont pas étendus vers le midi au-delà de l'Espagne & du Japon (*i*). Ils sont originaires des pays froids, puisqu'on y trouve toutes les variétés de l'espèce, & qu'on ne les trouve que là; d'ailleurs ils supportent aisément le froid le plus extrême; il y en a du côté du pôle antarctique (*k*) comme vers le pôle arctique (*l*). La four-

(*e*) *V. le voyage de la Hontan*, tome II, p. 42.

(*f*) *V. les Voyages de François Pyrard*. Paris, 1619, tome I, page 427.

(*g*) Aristot. *Hist. animal. lib. VIII, cap. XVIII.*

(*h*) Aldrovande, *Quadrup. hist. p 197.*

(*i*) Voyez l'*Histoire du Japon*, par Kœmpfer. La Haye, 1719, tome I, page 110.

(*k*) Voyez le voyage de Narborong à la mer du Sud. Second volume des voyages de Coréal. Paris, 1722, tome II, page 184.

(*l*) Voyez le Recueil des voyages du nord. Rouen, 1716, tome II, pages 113 & 114. Voyez aussi le Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes orientales. Amsterdam, 1702, tome I, pages 39 & 40.

rure des renards blanchs n'est pas fort estimée , parce que le poil tombe aisément , les gris-argentés sont meilleurs , les bleus & les croisés sont recherchés à cause de leur rareté ; mais les noirs sont les plus précieux de tous , c'est après la zibeline la fourrure la plus belle & la plus chère. On en trouve au Spitzberg (*m*) , en Groenland (*n*) , en Canada (*o*) , où il y en a aussi de croisés , & où l'espèce commune est moins rousse qu'en France , & a le poil plus long & plus fourni.

(*m*) Voyez le Recueil des voyages du Nord , &c.

(*n*) Les renards abondent dans toute la Laponie. Ils sont presque tous blancs , quoiqu'il s'en rencontre de la couleur ordinaire. Les blancs sont les moins estimés ; mais il s'en trouve quelquefois de noirs , & ceux-là sont les plus rares & les plus chers ; leurs peaux sont quelquefois vendues quarante ou cinquante écus , & le poil en est si fin & si long , qu'il pend de tel côté que l'on veut , en sorte que prenant la peau par la queue , le poil tombe du côté des oreilles , &c. Œuvres de Regnard . tome I , page 175.

(*o*) Voyez le voyage du pays des Hurons , par Sagard Théodat. Paris , 1632 , pages 304 & 305.





LE BLAIREAU (a).

Voyez planche V, figure 3 de ce Volume.

LE Blaireau est un animal paresseux, déifiant, solitaire, qui se retire dans les lieux les plus écartés, dans les bois les plus sombres, & s'y creuse une demeure souterraine ; il semble fuir la société, même la lumiere, & passe les trois quarts de sa vie dans ce séjour ténébreux, dont il ne sort que pour chercher sa subsistance. Comme il a le corps alongé, les jambes courtes, les ongles, surtout ceux des pieds de devant, très longs & très fermes, il a plus de facilité qu'un autre pour ouvrir la terre, y fouiller, y pénétrer, & jeter derriere lui les déblais de

(a) Le Blaireau ou Taïson, en Latin, *Meles*, *Taxus*; en Italien, *Tasso*; en Espagnol, *Tesu o texon*; en Allemand, *Tachs*, *Dachs*, *Dar*; en Anglois, *Badger*, *Brock*, *Grai*, *Bauffon patte*; en Suédois, *Graf-swin*, en Polonois, *Jazwic*, *Borsuc*, *Kol-dziki*, *Zlik*.

Meles. Gesner, *Icon. animal. quadr.* p. 86.

Taxus sive *Meles*. Ray, *Synops. animal quadrup.* page 185.

Meles unguibus anticis longissimis. Taxus, Linnæus.

Coati caudâ brevi. Taxus, *Meles*. *Coati griseus*. Klein, *de quadrup.* p. 73.

Meles pilis ex folidé albo & nigro variegatis vestita, capite tæniis alternatim albis & nigris variegato. Meles, Brullon, *Regn. animal.* p. 253.

son excavation , qu'il rend tortueuse , oblique , & qu'il pousse quelquefois fort loin. Le Renard qui n'a pas la même facilité pour creuser la terre , profite de ses travaux : ne pouvant le contraindre par la force , il l'oblige par adresse à quitter son domicile , en l'inquiétant , en faisant sentinelle à l'entrée , en l'infectant même de ses ordures ; ensuite il s'en empare , l'élargit , l'approprie , & en fait son terrier. Le blaireau , forcé à changer de manoir , ne change pas de pays ; il ne va qu'à quelque distance travailler sur nouveaux frais à se pratiquer un autre gîte , dont il ne sort que la nuit , dont il ne s'écarte guere , & où il revient dès qu'il sent quelque danger. Il n'a que ce moyen de se mettre en sûreté , car il ne peut échapper par la fuite ; il a les jambes trop courtes pour pouvoir bien courir. Les chiens l'atteignent promptement , lorsqu'ils le surprennent à quelque distance de son trou : cependant il est rare qu'ils l'arrêtent tout-à-fait & qu'ils en viennent à bout , à moins qu'on ne les aide. Le blaireau a le poil très épais , les jambes , la mâchoire & les dents très fortes , aussi-bien que les ongles ; il se sert de toute sa force , de toute sa résistance & de toutes ses armes en se couchant sur le dos , & il fait aux chiens de profondes blessures. Il a d'ailleurs la vie très dure ; il combat long-temps , se défend courageusement , & jusqu'à la dernière extrémité.

Autrefois que ces animaux étoient plus communs qu'ils ne le sont aujourd'hui , on dressoit des basiliers pour les chasser & les

prendre dans leurs terriers. Il n'y a guere que les bassets à jambes torses qui puissent y entrer aisément ; le blaireau se défend en reculant, éboule de la terre, afin d'arrêter ou d'enterrer les chiens. On ne peut le prendre qu'en faisant ouvrir le terrier par-dessus, lorsqu'on juge que les chiens l'ont acculé jusqu'au fond ; on le ferre avec des tenailles, & ensuite on le musèle pour l'empêcher de mordre : on m'en a apporté plusieurs qui avoient été pris de cette façon, & nous en avons gardé quelques-uns long-temps. Les jeunes s'apprivoisent, aisément, jouent avec les petits chiens, & suivent comme eux la personne qu'ils connoissent & qui leur donne à manger ; mais ceux que l'on prend vieux demeurent toujours sauvages ; ils ne sont ni mal-faisans, ni gourmands comme le renard & le loup, & cependant ils sont animaux carnassiers ; ils mangent de tout ce qu'on leur offre, de la chair, des œufs, du fromage, du beurre, du pain, du poisson, des fruits, des noix, des graines, des racines, &c. & ils préfèrent la viande crue à tout le reste. Ils dorment la nuit entière & les trois quarts du jour, sans cependant être sujets à l'engourdissement pendant l'hiver, comme les marmottes ou les loirs. Ce sommeil fréquent fait qu'ils sont toujours gras, quoiqu'ils ne mangent pas beaucoup ; & c'est par la même raison qu'ils supportent aisément la diète, & qu'ils restent souvent dans leur terrier trois ou quatre jours sans en sortir, surtout dans les temps de neige..

Il tiennent leur domicile propre, ils n'y

font jamais leurs ordures. On trouve rarement le mâle avec la femelle : lorsqu'elle est prête à mettre bas , elle coupe de l'herbe , en fait une espèce de fagot , qu'elle traîne entre ses jambes jusqu'au fond du terrier , où elle fait un lit commode pour elle & ses petits. C'est en été qu'elle met bas , & la portée est ordinairement de trois ou de quatre. Lorsqu'ils sont un peu grands , elle leur apporte à manger ; elle ne sort que la nuit , va plus au loin que dans les autres temps ; elle déterre les nids des guêpes , en emporte le miel , perce les rabouillieres des lapins , prend les jeunes lapreaux , sait aussi les mulots , les lézards , les serpens , les sautérelles , les œufs des oiseaux , & porte tout à ses petits , qu'elle fait sortir souvent sur le bord du terrier , soit pour les allaiter , soit pour leur donner à manger.

Ces animaux sont naturellement frileux ; ceux qu'on élève dans la maison ne veulent pas quitter le coin du feu , & souvent s'en approchent de si près qu'ils se brûlent les pieds , & ne guérissent pas aisément. Ils sont aussi fort sujets à la galle ; les chiens qui entrent dans leurs terriers prennent le même mal , à moins qu'on n'ait grand soin de les laver. Le blaireau a toujours le poil gras & mal propre ; il a entre l'anus & la queue une ouverture assez large , mais qui ne communique point à l'intérieur & ne pénètre guere qu'à un pouce de profondeur ; il en suinte continuellement une liqueur onctueuse ; d'assez mauvaise odeur , qu'il se plaît à sucer. Sa chair n'est pas absolument mauvaise à manger ,

manger, & l'on fait de sa peau des fourrures grossières, des colliers pour les chiens, des couvertures pour les chevaux, &c.

Nous ne connaissons point de variétés dans cette espèce, & nous avons fait chercher par-tout le blaireau-cochon dont parlent les chasseurs, sans pouvoir le trouver. Du Fouilloux (*b*) dit qu'il y a deux espèces de *tessons* ou *blaireaux*, les *porchins* & les *chenins*; que les porchins sont un peu plus gras, un peu plus blancs, un peu plus gros de corps & de tête que les chenins. Ces différences sont, comme l'on voit, assez légères, & il avoue lui-même qu'elles sont peu apparentes, à moins qu'on n'y regarde de bien près (*c*). Je crois donc que cette distinction du blaireau, en *blaireau-chien* & *blaireau-cochon*, n'est qu'un préjugé, fondé sur ce que cet animal a deux noms, en latin *meles* & *taxus*, en françois *blaireau* & *taïsson*, &c. & que c'est une de ces erreurs produites par la nomenclature. D'ailleurs, les espèces qui ont des variétés, sont ordinairement très abondantes, & très généralement répandues; celle du blaireau est au contraire une des moins nombreuses & des plus confinées. On n'est pas sûr qu'elle se trouve en Amérique, à moins qu'on ne regarde comme une variété de l'espèce, l'animal envoyé de la Nouvelle-Yorck, dont M. Brisson a donné une courte description

(*b*) Voyez la Vénerie de du Fouilloux. Paris, 1613,
page 72 verso, & 73 recto.

(*c*) *Idem*, *ibid.*

(d), sous le nom de *blaireau blanc*. Elle n'est point en Afrique ; car l'animal du cap de Bonne-espérance décrit par Kolbe (e) sous le nom de *blaireau puant*, est un animal différent ; & nous doutons que le *fossa* de Madagascar, dont parle Flaccourt dans sa relation, page 152, & qu'il dit ressembler au blaireau de France, soit en effet un blaireau. Les autres Voyageurs n'en parlent pas : le docteur Shaw dit même (f) qu'il est entièrement inconnu en Barbarie. Il paroît aussi qu'il ne se trouve point en Asie ; il n'étoit pas connu des Grecs, puisqu'Aristote n'en fait aucune mention, & que le blaireau n'a pas même de nom dans la langue grecque. Ainsi cette espèce, origi-


(d) *Meles suprà alba, infra ex albo flavicans . . . Meles alba.* Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, un pied neuf pouces de long ; sa queue est longue de neuf pouces. Ses yeux sont petits à proportion de la grandeur de son corps, ses oreilles courtes, ses jambes très courtes, ses ongles blancs. Tout son corps est couvert de poils très épais, blancs dans toute la partie supérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. On le trouve dans la Nouvelle-Yorck, d'où il a été apporté à M. de Reaumur. Brisson, *Regn. animal.* page 255. On doit ajouter à cette description, qu'il est en tout plus petit, & qu'il a le nez plus court que notre blaireau ; & d'ailleurs on ne voit pas sur la peau, qui est empaillée, s'il y a une houfse sous la queue.

(e) Voyez la Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe. Amsterdam, 1741, tome III, page 64.

(f) Voyez le voyage de M. Shaw. La Haye, 1743, tome I, page 320.

naire du climat tempéré de l'Europe , ne s'est guere répandue au-delà de l'Espagne , de la France , de l'Italie , de l'Allemagne , de l'Angleterre , de la Pologne & de la Suède ; & elle est par-tout assez rare. Et non-seulement il n'y a que peu ou point de variétés dans l'espèce , mais même elle n'approche d'aucune autre. Le blaireau a des caractères tranchés & fort singuliers : les bandes alternatives qu'il a sur la tête , l'espèce de poche qu'il a sous la queue , n'appartiennent qu'à lui ; il a le corps presque blanc par-dessus , & presque noir par-dessous , ce qui est tout le contraire des autres animaux , dont le ventre est toujours d'une couleur moins foncée que le dos.





LA LOUTRE [a].

Voyez planche VI, figure 1 de ce Volume.

LA Loutre est un animal vorace, plus avide de poisson que de chair, qui ne quitte guère le bord des rivieres ou des lacs, & qui dépeuple quelquefois les étangs; elle a plus de facilité qu'un autre pour nager, plus même que le castor, car il n'a de membranes qu'aux pieds de derrière, & il a les doigts séparés dans les pieds de devant, tandis que la loutre a des membranes à tous les pieds, elle nage presque aussi vite qu'elle marche: elle ne va point à la mer comme le castor, mais elle parcourt les eaux douces, & remonte ou descend les rivieres à des distances considérables: souvent elle nage entre deux eaux, & y demeure assez

[a] La Loutre, en Grec, Εὐθύπις; en Latin *Lutra vel Lytra*, vel *etiam Lutris*, *Lutrix*; en Italien, *Lodra*, *Lodria*, *Loutra*; en Espagnol, *Nutria*; en Allemand, *Fischotter*; en Anglois, *Otter*; en Suédois, *Witer*; en Polonois, *Widra*; en Savoie, *Leure*.

Lutra, Gesner, hist. quadrup. p. 684. Icon. animal. quadrup. p. 85.

Lutra, Ray, Synops. animal. quadrup. p. 187.

Lutra digitis æqualibus. Linnæus.

Lutra, Klein, de quadr. p. 91.

Lutra castanei coloris, . . . *Lutra*, Briffon, Regn. animal. p. 277.



La Loutre. 2 La Fouine. 3 La Marte. 4
Le Putois.

long-temps; elle vient ensuite à la surface afin de respirer. A parler exactement, elle n'est point animal amphibia, c'est - à - dire, animal qui peut vivre également & dans l'air & dans l'eau; elle n'est pas conformée pour demeurer dans ce dernier élément, & elle a besoin de respirer à-peu-près comme tous les autres animaux terrestres: si même il arrive qu'elle s'engage dans une nasse à la poursuite d'un poisson, on la trouve noyée, & l'on voit qu'elle n'a pas eu le temps d'en couper tous les osiers pour en sortir. Elle a les dents comme la fouine, mais plus grosses & plus fortes, relativement au volume de son corps. Faute de poisson, d'écrevisses, de grenouilles, de rats d'eau, ou d'autre nourriture, elle coupe les jeunes rameaux, & mange l'écorce des arbres aquatiques; elle mange aussi de l'herbe nouvelle au printemps: elle ne craint pas plus le froid que l'humidité; elle devient en chaleur en hiver, & met bas au mois de mars: on m'a souvent apporté des petits au commencement d'avril; les portées sont de trois ou quatre. Ordinairement les jeunes animaux sont jolis: les jeunes loutres sont plus laidés que les vieilles. La tête mal faite, les oreilles placées bas, des yeux trop petits & couverts, l'air obscur, les mouvements gauches, toute la figure ignoble, informe, un cri qui paroît machinal, & qu'elles répètent à tout moment, sembleroient annoncer un animal stupide; cependant la loutre devient industriuse avec l'âge, au moins assez pour faire la guerre

avec grand avantage aux poissons, qui pour l'instinct & le sentiment sont très inférieurs aux autres animaux ; mais j'ai grand peine à croire qu'elle ait, je ne dis pas les talents du castor, mais même les habitudes qu'on lui suppose, comme celle de commencer toujours par remonter les rivieres, afin de revenir plus aisément & de n'avoir plus (b) qu'à se laisser entraîner au fil de l'eau lorsqu'elle s'est rassasiée ou chargée de proie ; celle d'approprier son domicile & d'y faire un plancher, pour n'être point incommodée de l'humidité ; celle d'y faire une ample provision de poisson, afin de n'en pas manquer ; & enfin la docilité & la facilité de s'apprivoiser au point de pécher pour son maître, & d'apporter le poisson jusque dans la cuisine. Tout ce que je fais, c'est que les loutres ne creusent point leur domicile elles-mêmes, qu'elles se gîtent dans le premier trou qui se présente, sous les racines des peupliers, des saules, dans les fentes des rochers, & même dans les piles de bois à flotter ; qu'elles y font aussi leurs petits sur un lit fait de bûchettes & d'herbes ; que l'on trouve dans leur gîte des têtes & des arêtes de poisson ; qu'elles changent souvent de lieu : qu'elles emmènent ou dispersent leurs petits au bout de six semaines ou de deux mois ; que ceux que j'ai voulu priver cherchoient à mordre, même en prenant du lait, & avant

[b] Vide Gesner, hist. quad. p. 685, ex Alberto, Belone, Scaligero, Olao magno, &c.

que d'être assez forts pour mâcher du poisson ; qu'au bout de quelques jours ils devenoient plus doux, peut-être parce qu'ils étoient malades & foibles ; que loin de s'accoutumer aisément à la vie domestique, tous ceux que j'ai essayé de faire éléver sont morts dans le premier âge ; qu'enfin la loutre est, de son naturel, sauvage & cruelle ; que quand elle peut entrer dans un vivier, elle y fait ce que le putois fait dans un poulaillier : qu'elle tue beaucoup plus de poisson qu'elle ne peut en manger, & qu'ensuite elle en emporte dans sa gueule.

Le poil de la loutre ne mue guere, sa peau d'hiver est cependant plus brune, & se vend plus cher que celle d'été ; elle fait une très bonne fourrure. Sa chair se mange en magre, & a en effet un mauvais goût de poisson ou plutôt de marais. Sa retraite est infectée de la mauvaise odeur des débris du poisson qu'elle y laisse pourrir ; elle sent elle-même assez mauvais ; les chiens la chassent volontiers & l'atteignent aisément, lorsqu'elle est éloignée de son gîte & de l'eau ; mais quand ils la saisissent, elle se défend, les mord cruellement, & quelquefois avec tant de force & d'acharnement, qu'elle leur brise les os des jambes, & qu'il faut la tuer pour la faire démordre. Le castor cependant, qui n'est pas un animal bien fort, chasse la loutre, & ne lui permet pas d'habiter sur les bords qu'il fréquente.

Cette espèce, sans être en très grand

nombre , est généralement répandue en Europe , depuis la Suède jusqu'à Naples , & se retrouve dans l'Amérique septentrionale (*c*) ; elle étoit bien connue des Grecs (*d*) , & se trouve vraisemblablement dans tous les climats tempérés , sur-tout dans les lieux où il y a beaucoup d'eau ; car la loutre ne peut habiter ni les sables brûlans ni les déserts arides : elle fuit également les rivières stériles & les fleuves trop fréquentés. Je ne crois pas qu'elle se trouve dans les pays très chauds ; car le Jiya ou Carigueibeju (*e*) , qu'on a appelé *loutre du Brésil* , & qui se trouve aussi à Cayenne (*f*) paroît être d'une espèce voisine mais différente , au lieu que la loutre de l'Amérique septentrionale ressemble en tout à celle d'Europe , si ce n'est que la fourrure est encore plus noire & plus belle que celle de la loutre de Suède ou de Moscovie (*g*) .

[*c*] Voyez le voyage de la Hontan , tome II , p. 28.


[*d*] Vide Aristotelem , hist. animal. lib. VIII , cap. v.

[*e*] Jiya quæ & Carigueibeju appellatur à Brasiliensibus. Marcg. hist. Brasil. page 234. Lutra Bafiliensis. Ray , Synops. animal. quadrup. p. 189. Lutra pollice digitis breviore. Linnæus. Lutra atri coloris , macula sub gutture flavâ. Brisson , Regn. animal. p. 278.

[*f*] Lutra nigricans , caudâ depressâ & glabrâ. Barere Hist. de la France équinoxiale , page 155.

(*g*) Voyez le voyage de la Hontan , tome I , p. 84.





L A F O U I N E (a).

Voyez Planche VI, fig. 2 de ce Volume.

FA plupart des Naturalistes ont écrit que la Fouine & la Marte étoient des animaux de la même espèce. Gesner (b) & Ray ont dit, d'après Albert, qu'ils se mêloient ensemble. Cependant ce fait, qui n'est appuyé par aucun autre témoignage, nous paroît au moins douteux, & nous croyons au contraire que ces animaux ne se mêlant point ensemble, font deux espèces distinctes & séparées. Je puis ajouter, aux raisons qu'en donne M. Daubenton (c), des exemples qui

(a) La Fouine, en Latin, *Martes domesticus*, *Foyna*, *Gainus*, *Schismus*; en Italien, *Faina*, *Fouina*; en Allemand, *Huhff marder*.

Martes domesticus. Gesner, *Icon. animal. quadrup.* p. 97 & 98.

Martes, aliis *Foyna*. Ray, *Synops. animal. quadrup.* page 200.

Mustela fulvo nigricans, *gula pallidâ*. *Martes*. Linnaeus.

Martes Saxorum non fagorum, seu *domesticus*. Klein, *de quadrup.* p. 64.

Mustela pilis in exortu albidis, *castaneo colore terminatis*, *vestita*, *guttur albo*. *Foyna*. Brisson, *Regn. animal.* p. 246.

(b) Gesner, *hist. animal. quadrup.* p. 76. Ray, *Synops. animal. quadrup.* p. 200.

(c) Voyez la description de la marte, tome XIV de l'édition en 31 volumes.

rendront la chose plus sensible. Si la marte étoit la fouine sauvage , ou la fouine la marte domestique , il en seroit de ces deux animaux comme du chat sauvage & du chat domestique ; le premier conserveroit constamment les mêmes caractères , & le second varieroit , comme on le voit dans le chat sauvage qui demeure toujours le même , & dans le chat domestique qui prend toutes sortes de couleurs. Au contraire , la fouine , ou si l'on veut la marte domestique , ne varie point ; elle a ses caractères propres , particuliers , & tous aussi constans que ceux de la marte sauvage ; ce qui suffiroit seul pour prouver que ce n'est pas une pure variété , une simple différence produite par l'état de domesticité : d'ailleurs , c'est sans aucun fondement qu'on appelle la fouine , *marte domestique* , puisqu'elle n'est pas plus domestique que le renard , le putois , qui , comme elle , s'approchent des maisons pour y trouver leur proie , & qu'elle n'a pas plus d'habitude , pas plus de communication avec l'homme , que les autres animaux que nous appellons sauvages. Elle diffère donc de la marte par le naturel & par le tempérament , puisque celle-ci fuit les lieux découverts , habite au fond des bois , demeure sur les arbres , ne se trouve en grand nombre que dans les climats froids , au lieu que la fouine s'approche des habitations , s'établit même dans les vieux bâtimens , dans les greniers à foin , dans des trous de muraille ; qu'enfin l'espèce en est généralement répandue en grand nombre dans tous les pays tempérés ,

& même dans les climats chauds , comme à Madagascar (*d*) , aux Maldives (*e*) & qu'elle ne se trouve pas dans les pays du Nord.

La fouine a la physionomie très fine , l'œil vif , le saut léger , les membres souples , le corps flexible , tous les mouvemens très prestes : elle saute & bondit plutôt qu'elle ne marche ; elle grimpe aisément contre les murailles qui ne sont pas bien enduites , entre dans les colombiers , les poulaillers , &c , mange les œufs , les pigeons , les poules , &c , en tue quelquefois un grand nombre , & les porte à ses petits ; elle prend aussi les souris , les rats , les taupes , les oiseaux dans leurs nids. Nous en avons élevé une que nous avons gardée long-temps : elle s'apprivoise à un certain point ; mais elle ne s'attache pas , & demeure toujours assez sauvage pour qu'on soit obligé de la tenir enchaînée ; elle faisoit la guerre aux chats ; elle se jetoit aussi sur les poules dès qu'elle se trouvoit à portée ; elle s'échappoit souvent , quoiqu'attachée par le milieu du corps ; les premières fois elle ne s'éloignoit guere & revenoit au bout de quelques heures , mais sans marquer de la joie , sans attachement pour personne. Elle demandoit cependant à manger comme le chat & le chien ; peu après elle fit des absences plus

(*d*) Voyez les voyages de Jean Struys. Rouen , 1719 , tome I , page 30.


(*e*) V. les Voyages de François Pyrard. Paris , 1619 , tome I page 132.

longues, & enfin ne revint plus. Elle avoit alors un an & demi, l'âge apparemment auquel la nature avoit pris le dessus. Elle mangeoit de tout ce qu'on lui donnoit, à l'exception de la salade & des herbes ; elle aimoit beaucoup le miel, & préféroit le chenevis à toutes les autres graines : on a remarqué qu'elle buvoit fréquemment, qu'elle dormoit quelquefois deux jours de suite, & qu'elle étoit aussi quelquefois deux ou trois jours fans dormir ; qu'avant le sommeil elle se mettoit en rond, cachoit sa tête & l'enveloppoit de sa queue ; que tant qu'elle ne dormoit pas, elle étoit dans un mouvement continual si violent & si incommode, que quand même elle ne se seroit pas jetée sur les volailles, on auroit été obligé de l'attacher pour l'empêcher de tout briser. Nous avons eu quelques autres fouines plus âgées, que l'on avoit prises dans des pièges, mais celles-là demeurerent tout-à-fait sauvages ; elles mordoient ceux qui vouloient les toucher, & ne vouloient manger que de la chair crue.

Les fouines, dit-on, portent autant de temps que les chats. On trouve des petits depuis le printemps jusqu'en automne, ce qui doit faire présumer qu'elles produisent plus d'une fois par an ; les plus jeunes ne font que trois ou quatre petits, les plus âgées en font jusqu'à sept. Elles s'établissent pour mettre bas dans un magasin à foin, dans un trou de murailles, où elles poussent de la paille & des herbes ; quelquefois dans une fente de rocher ou dans un

tronc d'arbre , où elles portent de la mousse ; & lorsqu'on les inquiète , elles déménagent & transportent ailleurs leurs petits , qui grandissent assez vite ; car celle que nous avons élevée avoit au bout d'un an pres- qu'atteint sa grandeur naturelle , & de-là on peut inférer que ces animaux ne vivent que huit ou dix ans. Ils ont une odeur de faux musc qui n'est pas absolument désagréable ; les martes & les fouines , comme beaucoup d'autres animaux , ont des vésicules intérieures qui contiennent une matière odorante , semblable à celle que fournit la civette : leur chair a un peu de cette odeur ; cependant celle de la marte n'est pas mauvaise à manger ; celle de la fouine est plus désagréable , & sa peau est aussi beaucoup moins estimée.





LA MARTE [a].

Voyez planche VI, fig. 3 de ce Volume.

LA Marte, originaire du Nord, est naturelle à ce climat & s'y trouve en si grand nombre qu'on est étonné de la quantité de fourrures de cette espèce qu'on y consomme & qu'on en tire. Elle est au contraire en petit nombre dans les climats tempérés, & ne se trouve point dans les pays chauds (b) : nous en avons quelques-unes dans nos bois de Bourgogne, il s'en trouve aussi dans la forêt de Fontainebleau ; mais en

(a) La Marte, en Latin, *Martes*, *Marta*, *Marterus*; en Italien, *Marta*, *Matura*, *Martaro*, *Marerello*, *Martire*; en Espagnol, *Marta*; en Allemand, *Feld-marder*, *Wild-marder*; en Anglois, *Martin*, *Martlet*; en Suédois, *Mard*; en Polonois, *Kuna*.

Martes sylvestris. *Martis altera species nobilior*. *Gesner. Icon. animal. quadrup. p. 99.*

Martes. *Ray, Synops. animal. quadrup. p. 200.*

Mustela fulvo nigricans, *gulâ pallida*. *Martes. Linnaeus.*

Mustela, martes. *Klein, de quadrup. p. 64.*

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis, castaneo colore terminatis vestita, gutture flavo. *Martes. Briffon, Regn. animal. p. 247.*

(b) Il y a toute apparence que les martes du pays des Anzicos, voisin du royaume de Congo, dont il est fait mention dans l'histoire générale des voyages, tom. V, page 87, sont des fouines, & non pas des martes.

général elles sont aussi rares en France que la fouine y est commune. Il n'y en a point du tout en Angleterre , parce qu'il n'y a pas de bois ; elle fuit également les pays habités & les lieux découverts ; elle demeure au fond des forêts , ne se cache point dans les rochers , mais parcourt les bois & grimpe au-dessus des arbres ; elle vit de chasse , & détruit une quantité prodigieuse d'oiseaux , dont elle cherche les nids pour en sucer les œufs : elle prend les écureuils , les mus-
lots , les lérots , &c. elle mange aussi du miel comme la fouine & le putois. On ne la trouve pas en pleine campagne , dans les prairies , dans les champs , dans les vi-
gnes ; elle ne s'approche jamais des habi-
tations , & elle diffère encore de la fouine par la maniere dont elle se fait chasser ; dès que la fouine se sent poursuivie par un chien , elle se soustrait en gagnant promptement son grenier ou son trou ; la marte au contraire se fait suivre assez long-temps par les chiens : avant de grimper sur un ar-
bre , elle ne se donne pas la peine de mon-
ter jusqu'au-dessus des branches , elle se tient sur la tige , & de-là les regarde passer ; la trace que la marte laisse sur la neige pa-
roît être celle d'une grande bête , parce qu'elle ne va qu'en sautant & qu'elle marque tou-
jours des deux pieds à la fois ; elle est un peu plus grosse que la fouine , & cepen-
dant elle a la tête (c) plus courte ; elle a

(c) Comparez les deux premières tables des descrip-

les jambes (*d*) plus longues, & court par conséquent plus aisément : elle a la gorge jaune, au lieu que la fouine l'a blanche : son poil est aussi bien plus fin, bien plus fourni & moins sujet à tomber ; elle ne prépare pas comme la fouine, un lit à ses petits ; néanmoins elle les loge encore plus commodément. Les écureuils font, comme l'on fait, des nids au-dessus des arbres, avec autant d'art que les oiseaux ; lorsque la marte est prête à mettre bas, elle grimpe au nid de l'écureuil, l'en chasse, en élargit l'ouverture, s'en empare & y fait ses petits ; elle se sert aussi des anciens nids de ducs & de buses, & des trous des vieux arbres, dont elle déniche les pics-de-bois & les autres oiseaux ; elle met bas au printemps, la portée n'est que de deux ou trois ; les petits naissent les yeux fermés, & cependant grandissent en peu de temps ; elle leur apporte bientôt des oiseaux, des œufs, & les mène ensuite à la chasse avec elle : les oiseaux

tions de la fouine & de la marte, & vous verrez que le corps de la fouine ayant en longueur un pied quatre pouces six lignes, & en grosseur huit pouces quatre lignes, la longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, est de quatre pouces ; au lieu que dans la marte la longueur du corps étant d'un pied six pouces huit lignes, & la grosseur de dix pouces quatre lignes, la longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, n'est cependant que de trois pouces dix lignes. Voyez vol. XIV de l'édition en trente-un volumes.

(*d*) Comparez dans les mêmes tables les longueurs des jambes. *Idem.*

connoissent


connoissent si bien leurs ennemis , qu'ils font pour la marte comme pour le renard , le même petit cri d'avertissement ; & une preuve que c'est la haine qui les anime , plutôt encore que la crainte , c'est qu'ils les suivent assez loin , & qu'ils font ce cri contre tous les animaux voraces & carnassiers , tels que le loup , le renard , la marte , le chat sauvage , la belette , & jamais contre le cerf , le chevreuil , le lièvre , &c.

Les martes sont aussi communes dans le nord de l'Amérique que dans le nord de l'Europe & de l'Asie : on en apporte beaucoup du Canada ; il y en a dans toute l'étendue des terres septentrionales de l'Amérique , jusqu'à la baie de Hudson (*e*) , & en Asie jusqu'au nord du royaume de Tunquin (*f*) & de l'empire de la Chine (*g*). Il ne faut pas la confondre avec la marte zibeline , qui est un autre animal dont la fourrure est bien plus précieuse. La zibeline est noire , la marte n'est que brune & jaune. La partie de la peau qui est la plus estimée dans la marte , est celle qui est la plus brune , & qui s'étend tout le long du dos jusqu'au bout de la queue.

(*e*) Voyez le voyage du capitaine Robert Lade , traduit par l'abbé Prévôt , Paris , 1744 , tome II , p. 227.

(*f*) Voyez les voyages de Tavernier . Rouen 1713 , tome IV , page 182. Voyez aussi l'Histoire générale des voyages , par M. l'abbé Prévôt , tome VII , p. 117.

(*g*) Voyez l'Histoire générale des voyages , tome VI , page 562.



LE PUTOIS (a).

Voyez planche VI, fig. 4 de ce volume.

LE Putois ressemble beaucoup à la fouine par le tempérament, par le naturel, par les habitudes ou les mœurs, & aussi par la forme du corps. Comme elle, il s'approche des habitations, monte sur les toits, s'établit dans les greniers à foin, dans les granges & dans les lieux peu fréquentés, d'où il ne sort que la nuit pour chercher sa proie. Il se glisse dans les basse-cours, monte aux volières, aux colombiers, où sans faire autant de bruit que la fouine il fait plus de dégât; il coupe ou écrase la tête à toutes les volailles, & ensuite il les

(a) Le Putois, en Latin, *Putorius*; en Italien, *Foetta*, *Puzolo*; en Allemand, *Iltis*, *Ulk*, *Buntsing*; en Anglois, *Polecat*, *Fitchet*; en Polonois, *Vidra*, *Tcherz*.

Putorius. Gesner, *Hist. quadrup.* p. 767. *Ieon. anim. quadrup.* p. 99.

Putorius. Ray, *Synops. animal. quadrup.* p. 199.

Mustela flavescens nigricans, ore albo, collari flavescente. *Putorius.* Linnæus.

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis vestita, crinis circumferentiâ albâ. *Putorius.* Brisson, *Regn. animal.* page 249.

transporte une à une & en fait magasin ; si, comme il arrive souvent, il ne peut les emporter entières, parce que le trou par où il est entré se trouve trop étroit, il leur mange la cervelle & emporte les têtes. Il est aussi fort avide de miel ; il attaque les ruches en hiver, & force les abeilles à les abandonner. Il ne s'éloigne guère des lieux habités ; il entre en amour au printemps ; les mâles se battent sur les toits & se disputent la femelle, ensuite ils l'abandonnent & vont passer l'été à la campagne ou dans les bois ; la femelle au contraire reste dans son grenier jusqu'à ce qu'elle ait mis bas, & n'emmène ses petits que vers le milieu ou la fin de l'été ; elle en fait trois ou quatre & quelquefois cinq, ne les allait pas long-temps, & les accoutume de bonne heure à sucer du sang & des œufs.

A la ville ils vivent de proie, & de chasse à la campagne ; ils s'établissent pour passer l'été dans des terriers de lapins, dans des fentes de rochers, dans des troncs d'arbres creux, d'où ils ne sortent guère que la nuit pour se répandre dans les champs, dans les bois ; ils cherchent les nids des perdrix, des alouettes & des cailles ; ils grimpent sur les arbres pour prendre ceux des autres oiseaux : ils épient les rats, les taupe, les mulots & font une guerre continue aux lapins, qui ne peuvent leur échapper, parce qu'ils entrent aisément dans leurs trous ; une seule famille de putois suffit pour détruire une garenne. Ce seroit le moyen le plus simple pour diminuer le nombre


des lapins dans les endroits où ils deviennent trop abondans.

Le putois est un peu plus petit que la fouine ; il a la queue plus courte, le museau plus pointu, le poil plus épais & plus noir ; il a du blanc sur le front, aussi-bien qu'aux côtés du nez & autour de la gueule. Il en diffère encore par la voix ; la fouine a le cri aigu & assez éclatant, le putois a le cri plus obscur ; ils ont tous deux, aussi-bien que la marte & l'écureuil, un grognement d'un ton grave & colere, qu'ils répètent souvent lorsqu'on les irrite ; enfin le putois ne ressemble point à la fouine par l'odeur, qui loin d'être agréable, est au contraire si fétide, qu'on l'a d'abord distingué & dénommé par-là. C'est surtout lorsqu'il est échauffé, irrité, qu'il exhale & répand au loin une odeur insupportable. Les chiens ne veulent point manger de sa chair ; & sa peau même, quoique bonne, est à vil prix, parce qu'elle ne perd jamais entièrement son odeur naturelle. Cette odeur vient de deux follécules ou vésicules que ces animaux ont auprès de l'anus, & qui filtrent & contiennent une matière onctueuse dont l'odeur est très désagréable dans le putois, le furet, la belette, le blaireau, &c, & qui n'est au contraire qu'une espèce de parfum dans la civette, la fouine, la marte, &c.

Le putois paroît être un animal des pays tempérés : on n'en trouve que peu ou point dans les pays du Nord, & ils sont plus rares que la fouine dans les climats méridionaux. Le puant d'Amérique est un animal

différent , & l'espèce du putois paroît être confinée en Europe , depuis l'Italie jusqu'à la Pologne. Il est sûr que ces animaux craignent le froid , puisqu'ils se retirent dans les maisons pour y passer l'hiver , & qu'on ne voit jamais de leurs traces sur la neige dans les bois & dans les champs éloignés des maisons ; & peut être aussi craignent-ils la trop grande chaleur , puisqu'on n'en trouve point dans les pays méridionaux.





L E F U R E T (*a*).

Voyez planche VII fig. 1 de ce Volume.

QUELQUES Auteurs ont douté si le Furet & le Putois étoient des animaux d'espèces différentes (*b*). Ce doute est peut-être fondé sur ce qu'il y a des furets qui ressemblent aux putois par la couleur du poil : cependant le putois, naturel aux pays tempérés, est un animal sauvage comme la fouine ; & le furet, originaire des climats chauds, ne peut subsister en France que comme animal domestique. On ne se sert point du putois, mais du furet pour la chasse du lapin, parce qu'il s'apprivoise plus aisément ; car

(*a*) Le Furet, en Latin, *Viverra*, *Furo*, *Furunculus*; en Espagnol, *Huron*, *Faram*; en Allemand, *Frett*, *Frettel*, *Furette*; en Anglois, *Ferret*; en Polonois, *Laska*.

Viverra, *Furo*, *Ictis*. Gesner, hist. quadrup. p. 762.
Iccn. animal. quadrup. p. 101.

Mustela sylvestris viverra dicta. Ray, *Synops. animal. quadrup.* p. 198.

Mustela viverra dicta. Klein, de quadrup. p. 63.
Mustela pilis subflavis longioribus, *castaneo colore terminatis vestita*, *viverra mas*. *Mustela pilis ex albo subflavis vestita*. . . *Viverra fæmina*. Brisson, *Regn. animal.* p. 244.

(*b*) *Vidac Linnæi Syst. nat. Mustela flavescente nigricans*, *ore albo*, *colla*i* flavescente putorius*. . . *Mustela sylyvestris viverra dicta* an cincta.



Le Furet. 2 Le Furet Putois. 3 L'Hermine.
4 Le Roselet.



d'ailleurs il a , comme le putois , l'odeur très forte & très désagréable ; mais ce qui prouve encore mieux que ce sont des animaux différens , c'est qu'ils ne se mêlent point ensemble , & qu'ils diffèrent d'ailleurs par un grand nombre de caractères essentiels. Le furet a le corps plus alongé (c) & plus mince , la tête plus étroite , le museau plus pointu que le putois , il n'a pas le même instinct pour trouver sa subsistance ; il faut en avoir foin , le nourrir à la maison , du moins dans ces climats ; il ne va pas s'établir à la campagne ni dans les bois ; & ceux que l'on perd dans les trous de lapins , & qui ne reviennent pas , ne se sont jamais multipliés dans les champs ni dans les bois , ils périssent apparemment pendant l'hiver ; le furet varie aussi par la couleur du poil , comme les autres animaux domestiques , & il est aussi commun dans les pays chauds (d) que le putois y est rare.

La femelle est dans cette espèce sensiblement plus petite que le mâle ; lorsqu'elle est en chaleur , elle le recherche ardemment , & l'on assure (e) qu'elle meurt si elle ne trou-

(c) Voyez la description du furet , où il est dit qu'il a quinze côtes , au lieu que le putois , la fouine & la marte , n'en ont que quatorze , & qu'il a aussi un os de plus dans le sternum : vo¹, XV de l'édition en trente-un volumes.

(d) Le furet se trouve en Barbarie , & se nomme *Nimse*. Voyez les voyages du docteur Shaw. Amsterdam , 1743 , tome I , page 222.

(e) *Vide* Gesner , *hist. animal. quadrup.* p. 763.

ve pas à se satisfaire ; aussi a-t-on soin de ne les pas séparer. On les élève dans des tonneaux ou dans des caisses où on leur fait un lit d'étoupes ; ils dorment presque continuellement : ce sommeil si fréquent ne leur tient lieu de rien ; car dès qu'ils s'éveillent , ils cherchent à manger ; on les nourrit de son , de pain , de lait , &c. Ils produisent deux fois par an : les femelles portent six semaines ; quelques - unes dévorent leurs petits presque aussi-tôt qu'elles ont mis bas , & alors elles deviennent de nouveau en chaleur & font trois portées , lesquelles sont ordinairement de cinq ou six , & quelquefois de sept , huit & même neuf.

Cet animal est naturellement ennemi mortel du lapin : lorsqu'on présente un lapin , même mort , à un jeune furet qui n'en a jamais vu , il se jette dessus , & le mord avec fureur ; s'il est vivant , il le prend par le cou , par le nez , & lui suce le sang ; lorsqu'on le lâche dans les trous des lapins , on le musèle , afin qu'il ne les tue pas dans le fond du terrier , & qu'il les oblige seulement à sortir & à se jeter dans le filet dont on couvre l'entrée. Si on laisse aller le furet sans museliere , on court risque de le perdre , parce qu'après avoir sucé le sang du lapin , il s'endort , & la fumée qu'on fait dans le terrier , n'est pas toujours un moyen sûr pour le ramener , parce que souvent il y a plusieurs issues , & qu'un terrier communique à d'autres , dans lesquels le furet s'engorge à mesure que la fumée le gagne. Les enfans se servent aussi du furet pour déniccher

cher les oiseaux ; il entre aisément dans les trous des arbres & des murailles , & il les apporte au-dehors.

Selon le témoignage de Strabon , le furet a été apporté d'Afrique en Espagne , & cela ne me paroît pas sans fondement , parce que l'Espagne est le climat naturel des lapins , & le pays où ils étoient autrefois le plus abondans : on peut donc présumer que pour en diminuer le nombre , devenu peut - être très incommodé , on fit venir des furets avec lesquels on fait une chasse utile ; au lieu qu'en multipliant les putois , on ne pourroit que détruire les lapins , mais sans aucun profit , & les détruire peut-être beaucoup au-delà de ce qu'on voudroit.

Le furet , quoique facile à apprivoiser & même assez docile , ne laisse pas d'être fort colère ; il a une mauvaise odeur en tout temps , qui devient bien plus forte lorsqu'il s'échauffe ou qu'on l'irrite ; il a les yeux vifs , le regard enflammé , tous les mouvemens très souples , & il est en même temps si vigoureux , qu'il vient aisément à bout d'un lapin qui est au moins quatre fois plus gros que lui.

Malgré l'autorité des interprètes & des commentateurs , nous doutons que le furet soit l'*ictis* des Grecs .

» L'*ictis* , dit Aristote , est une espèce de belette sauvage , plus petite qu'un petit chien de Malte , mais semblable à la belette par le poil , par la forme , par la blancheur de la partie inférieure , & aussi par l'astuce des mœurs ; il s'apprivoise beaucoup ; il fait

grand tort aux ruches , étant avide de miel ; il attaque aussi les oiseaux ; il a , comme le chat , le membre génital osseux. *Hist. animal. lib. IX, cap. 6^a.* Il paroît 1^o. qu'il y a une espèce de contradiction ou de mal-entendu à dire que l'ictis est une espèce de belette sauvage qui s'apprivoise beaucoup , puisque la belette ordinaire , qui est ici la moins sauvage des deux , ne s'apprivoise point. 2^o. Le furet , quoique plus gros que la belette , n'est pas trop comparable au petit épagneul ou au chien bichon dont il n'approche pas pour la grosseur. 3^o. Il ne paroît pas que le furet ait l'astuce des mœurs de la belette , ni même aucune ruse ; enfin , il ne fait aucun tort aux ruches , & n'est nullement avide de miel. J'ai prié M. le Roi , Inspecteur des chasses du Roi , de vérifier ce dernier fait , & voici sa réponse : *M. de Buffon peut être assuré que les furets n'ont pas à la vérité un goût décidé pour le miel , mais qu'avec un peu de diète on leur en fait manger ; nous en avons nourri pendant quatre jours avec du pain trempé dans de l'eau miellée , ils en ont mangé , & même en assez grande quantité les deux derniers jours ; il est vrai que les plus faibles de ceux-là commençoient à maigrir d'une manière sensible.* Ce n'est pas la première fois que M. le Roi , qui joint à beaucoup d'esprit un grand amour pour les sciences , nous a donné des faits plus ou moins importans , & dont nous avons fait usage. J'ai essayé moi - même , n'ayant pas de furet sous ma main , de faire la même épreuve sur une hermine , en ne lui donnant que du miel pur à manger , &

en même temps du lait à boire, elle en est morte au bout de quelques jours; ainsi, ni l'hermine ni le furet ne sont avides de miel comme l'*itis* des Anciens, & c'est ce qui me fait croire que ce mot *itis* n'est peut-être qu'un nom générique, ou que s'il désigne une espèce particulière, c'est plutôt la fouine ou le putois, qui tous deux en effet ont l'astuce de la belette, entrent dans les ruches, & sont très avides de miel.





LA BELETTE [a].

Voyez planche VIII, figure 2 de ce Volume.

LA Belette ordinaire est aussi commune dans les pays tempérés & chauds (b), qu'elle est rare dans les climats froids; l'hermine au contraire très abondante dans le Nord, n'est qu'en petit nombre dans les régions tempérées, & ne se trouve point vers le midi. Ces animaux forment donc deux espèces distinctes & séparées; ce qui a pu donner lieu de les confondre & de les prendre pour le même animal, c'est que parmi les belettes ordi-

(a) La Belette, en Grec, Μαύλη; en Latin, *Mustela*; en Italien, *Donnola*, *Ballottula*, *Renuta*; en Espagnol, *Comadreia*; en Allemand, *Wisele*; en Anglois, *Weasel*, *Weesel*, & dans quelques endroits d'Angleterre, *Foumart*.

Mustela propriè sic dicta. Gesner, hist. quadrup. p. 752. Icon. animal. quadrup. p. 99.

Mustela vulgaris. Ray, Synops. animal. quadrup. page 195.

Mustela vulgaris. Klein, de quadrup. p. 62.

Mustela suprà rutila, infra alba . . . Mustela vulgaris. Briston, Regn. animal. p. 242.

(b) La Belette se trouve en Barbatie; on la nomme *Fert-el-Steile*. Voyez les voyages du docteur Shaw. La Haie, 1743, tome I, page 332.

3



2



I



L'Ecureuil. 2 La Belette. 3 Le Rat.

maires il y en a quelques-unes qui , comme l'hermine , deviennent blanches pendant l'hiver , même dans notre climat : mais si ce caractère leur est commun , elles en ont d'autres qui sont très différens ; l'hermine , rousse en été , blanche en hiver , a en tout temps le bout de la queue noire ; la belette , même celle qui blanchit en hiver , a le bout de la queue jaune ; elle est d'ailleurs sensiblement plus petite , & a la queue beaucoup plus courte que l'hermine ; elle ne demeure pas comme elle dans les déserts & dans les bois , elle ne s'écarte guere des habitations : nous avons eu les deux espèces , & il n'y a nulle apparence que ces animaux qui diffèrent par le climat , par le tempérament , par le naturel & par la taille , se mêlent ensemble ; il est vrai que parmi les belettes il y en a de plus grandes & de plus petites ; mais cette différence ne va guere qu'à un pouce (c) sur la longueur entiere du corps ; au lieu que l'hermine est de deux pouces plus longue que la belette la plus grande : ni l'une ni l'autre ne s'apprivoisent , elles demeurent toujours très sauvages dans les cages de fer où l'on est obligé de les garder ; ni l'une ni l'autre ne veulent manger de miel ; elles n'entrent pas dans les ruches comme le putois & la fouine ; ainsi l'hermine n'est pas la belette

(c) Voyez les descriptions de la belette & de l'hermine , & comparez ensemble les dimensions de ces deux animaux , vol. XV de l'édition en trente-un volumes.

sauvage , l'*ictis* d'Aristote , puisqu'il dit qu'elle devient fort privée , & qu'elle est fort avide de miel ; la belette & l'hermine , loin de s'apprivoiser , sont si sauvages , qu'elles ne veulent pas manger lorsqu'on les regarde : elles sont dans une agitation continue , cherchent toujours à se cacher ; & si l'on veut les conserver , il faut leur donner un paquet d'étoipes dans lequel elles puissent se fourrer ; elles y traînent tout ce qu'on leur donne , ne mangent guere que la nuit , & laissent pendant deux ou trois jours la viande fraîche se corrompre avant d'y toucher ; elles passent les trois quarts du jour à dormir ; celles qui sont en liberté attendent aussi la nuit pour chercher leur proie . Lorsqu'une belette peut entrer dans un poulailler , elle n'attaque pas les coqs ou les vieilles poules , elle choisit les petits poussins , les tue par une seule blessure qu'elle leur fait à la tête , & ensuite les emporte tous les uns après les autres : elle casse aussi les œufs , & les suce avec une incroyable avidité ; en hiver , elle demeure ordinairement dans les greniers , dans les granges ; souvent même elle y reste au printemps pour y faire ses petits dans le foin ou la paille ; pendant tout ce temps , elle fait la guerre avec plus de succès que le chat , aux rats & aux souris , parce qu'ils ne peuvent lui échapper & qu'elle entre après eux dans leurs trous ; elle grimpe aux colombiers , prend les pigeons , les moineaux , &c ; en été elle va à quelque distance des maisons , surtout dans

les lieux bas , autour des moulins , le long des ruisseaux , des rivières , se cache dans les buissons pour attraper des oiseaux , & souvent s'établit dans le creux d'un vieux saule pour y faire ses petits ; elle leur prépare un lit avec de l'herbe , de la paille , des feuilles , des étoipes ; elle met bas au printemps ; les portées sont quelquefois de trois , & ordinairement de quatre ou de cinq ; les petits naissent les yeux fermés , aussi-bien que ceux du putois , de la marte , de la fouine , &c ; mais en peu de temps ils prennent assez d'accroissement & de force pour suivre leur mère à la chasse ; elle attaque les couleuvres , les rats d'eau , les taupes , les mulots , parcourt les prairies , dévore les cailles & leurs œufs. Elle ne marche jamais d'un pas égal , elle ne va qu'en bondissant par petits sauts inégaux & précipités ; & lorsqu'elle veut monter sur un arbre , elle fait un bond par lequel elle s'élève tout d'un coup à plusieurs pieds de hauteur ; elle bondit de même lorsqu'elle veut attraper un oiseau.

Ces animaux ont , aussi-bien que le putois & le furet , l'odeur si forte , qu'on ne peut guere les garder dans une chambre habitée ; ils sentent plus mauvais en été qu'en hiver ; & lorsqu'on les poursuit ou qu'on les irrite , ils infectent de loin. Ils marchent toujours en silence , ne donnent jamais de voix qu'on ne les frappe ; ils ont un cri aigre & enroué qui exprime bien le ton de la colere. Comme ils sentent eux-mêmes fort mauvais , ils ne craignent pas l'infection. Un paysan

de ma campagne prit un jour trois belettes nouvellement nées dans la carcasse d'un loup qu'on avoit suspendu à un arbre par les pieds de derrière ; le loup étoit presqu'entièrement pourri , & la mere belette avoit apporté des herbes , des pailles & des feuilles pour faire un lit à ses petits dans la cavité du thorax.



L'HERMINE

OU LE ROSELET (a).

Voyez planche VII, fig. 3 & 4 de ce volume.

TLA Belette à queue noire s'appelle *Hermine* & *Roselet*, Hermine lorsqu'elle est blanche, Roselet lorsqu'elle est rouille ou jaunâtre ; quoique moins commune que la belette ordinaire, on ne laisse pas d'en trouver beaucoup, sur-tout dans les anciennes forêts, & quelquefois pendant l'hiver dans les champs voisins des bois ; il est aisè de la distinguer en tout temps de la belette commune, parce qu'elle a toujours le bout de la queue d'un noir foncé, le bord des oreilles & l'extrémité des pieds blancs.

(a) Hermine, Roselet, en Latin, *Hermellanus*, animal *Ermineum*; en Italien, *Armellino*; en Allemand, *Hermelin*; en Anglois, *Ermine*, *Stoat*; en Suédois, *Hermelin*, *Lekatt*; en Polonois, *Gronostay*.

Mustela alba. Géßner, *Hist. quadrup.* page 753. *Icon. animal. quadrup.* page 100.

Mustela candida, sive *animal Ermineum recentiorum*. Ray, *Synop. animal. quadrup.* page 198.

Mustela caudæ apice atro. Linnæus.

Mustela Armellina; *mustela alba*, *extremâ caudâ nigra*. Klein, *de quadrup.* page 63.

Mustela hieme alba, *ætate suprà rutila*, *infra alba*; *caudâ apice nigro*. Brisson, *Regn. animal.* page 248.

Nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous avons déjà dit de cet animal (*b*), & à ce que M. Daubenton en a écrit dans sa description (*c*); nous observerons seulement, que comme d'ordinaire l'hermine change de couleur en hiver, il y a toute apparence que celle dont il parle, & que nous avions encore au mois d'avril 1758, seroit devenue blanche & telle qu'elle étoit l'année passée lorsqu'on la prit au 1er. mars 1757, si elle fût demeurée libre; mais comme elle a été enfermée depuis ce temps dans une cage de fer, qu'elle se frotte continuellement contre les barreaux, & que d'ailleurs elle n'a pas effuyé toute la rigueur du froid, ayant toujours été à l'abri sous une arcade contre un mur, il n'est pas surprenant qu'elle ait gardé son poil d'été; elle est toujours extrêmement sauvage; elle n'a rien perdu de sa mauvaise odeur; à cela près, c'est un joli petit animal, les yeux vifs, la physionomie fine, & les mouvements si prompts qu'il n'est pas possible de les suivre de l'œil; on l'a toujours nourrie avec des œufs & de la viande, mais elle la laisse corrompre avant que d'y toucher; elle n'a jamais voulu manger du miel, qu'après avoir été privée pendant trois jours de toute autre nourriture, & elle est morte après en avoir mangé. La peau de cet animal est précieuse; tout le

(*b*) Voyez dans ce volume l'article de la belette.

(*c*) Voyez la description de l'hermine au tome XV de l'édition en trente-un volumes.

monde connoît les fourrures d'hermine, elles sont bien plus belles & d'un blanc plus mat que celles du lapin blanc, mais elles jaunissent avec le temps, & même les hermines de ce climat ont toujours une légère teinte de jaune.

Les hermines sont très communes dans tout le nord, surtout en Russie, en Norvège, en Laponie (*d*) : elles y sont, comme ailleurs, rousses en été, & blanches en hiver ; elles se nourrissent de petits-gris, & d'une espèce de rats dont nous parlerons dans la suite de cet ouvrage, & qui est très abondante en Norvège & en Laponie ; les hermines sont rares dans les pays tempérés, & ne se trouvent point dans les pays chauds. L'animal du cap de Bonne-espérance, que Kolbe appelle *hermine* (*e*), & duquel il dit que la chair est saine & agréable au palais, n'est point une hermine, ni même rien d'approchant ; les belettes de Cayenne dont parle M. Barrère (*f*), & les hermines grises de la Tartarie orientale & du nord de la Chine, dont il est fait mention par quelques voyageurs (*g*), sont aussi des animaux différens de nos belettes & de nos hermines.

(*d*) Voyer les Œuvres de Regnard. Paris, 1742, tome I, page 178.

(*e*) Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe. Amsterdam, 1741, partie III, chap. vi, p. 54.

(*f*) Description de la France équinoxiale, par M. Barrere.

(*g*) Voyer l'*Histoire générale des voyages*, par M. l'abbé Prevot, tome VI, pages 565 & 603.



L'ÉCUREUIL [a].

Voyez planche VIII, fig. 1 de ce Volume.

L'ÉCUREUIL est un joli petit animal qui n'est qu'à demi sauvage, & qui, par sa gentillesse, par sa docilité, par l'innocence même de ses mœurs, mériteroit d'être épargné; il n'est ni carnassier ni nuisible, quoiqu'il fasse quelquefois des oiseaux; sa nourriture ordinaire sont des fruits, des amandes, des noisettes, de la faine & du gland; il est propre, leste, vif, très alerte, très éveillé, très industrious; il a les yeux pleins de feu, la physionomie fine, le corps nerveux, les membres très dispos: sa jolie figure est encore rehaussée, parée par une belle queue en forme de panache, qu'il relève jusque

(.) L'Ecureuil ; en Grec & en Latin, *Sciurus* ; en Italien, *Schirivola*, *Chirivolo*, *Schirato*, *Schiratolo* ; en Espagnol, *Harda-Esquilo* ; en Allemand, *Eychorn*, *Eichhermlin*; en Anglois, *Squirrel* ; en Suédois, *Ikorn* ; en Polonois, *Wijervijorga* ; ancien François, *Escurieu*, *Escuriau*.

Sciurus. *Gesner*, *hist. quadrup.* page 845. *Icon. animal. quadrup.* page 110.

Sciurus vulgaris. *Ray*, *Synops. animal. quadrup.* page 214.

Sciurus palnis solis saliens. *Linnæus*.

Sciurus vulgaris rubicundus. *Klein*, *de quadrup.* p. 53.

Sciurus rufus, quandoque griseo admixto ... *Sciurus vulgaris*. *Brisson*, *Regn. animal.* page 150.

dessus sa tête, & sous laquelle il se met à l'ombre ; le dessous de son corps est garni d'un appareil tout aussi remarquable, & qui annonce de grandes facultés pour l'exercice de la génération ; il est, pour ainsi dire, moins quadrupède que les autres, il se tient ordinairement assis presque debout, & se sert de ses pieds de devant, comme d'une main, pour porter à sa bouche ; au lieu de se cacher sous terre, il est toujours en l'air ; il approche des oiseaux par sa légèreté, il demeure comme eux sur la cime des arbres, parcourt les forêts en sautant de l'un à l'autre, y fait son nid, cueille les graines, boit la rosée, & ne descend à terre que quand les arbres sont agités par la violence des vents. On ne le trouve point dans les champs, dans les lieux découverts, dans les pays de plaine, il n'approche jamais des habitations ; il ne reste point dans les taillis, mais dans les bois de hauteur, sur les vieux arbres des plus belles futaines. Il craint l'eau plus encore que la terre, & l'on assure (*b*) que lorsqu'il faut la passer, il se sert d'une

(*b*) *Rei veritate nescitur quod Gesnerus ex Vicentio Bejuancensi & Olao magno refert. Sciuros, quando aquam transfere cupiunt, lignum levissimum aquæ imponere; eique insidentes & caudâ non tamen ut vult erectâ, sed continuo motâ, velificantes, neque flante vento, sed tranquillo æquore transvchi, quod fide dignus fidusque meus emissarius ad insulas Gothlandiæ, plus simplici vice observavit, & cum spoliis in littoribus ibidem collectis redux mirabundus mihi retulit. Dissert. de Sciuro volante. Phil. Trans. n°. 97, pag. 38. Klein, de quadrup. p. 53.*

écorce pour vaisseau , & de sa queue pour voiles & pour gouvernail. Il ne s'engourdit pas comme le loir pendant l'hiver, il est en tout temps très éveillé , & pour peu que l'on touche au pied de l'arbre sur lequel il repose , il sort de sa petite bauge , fuit sur un autre arbre , ou se cache à l'abri d'une branche. Il ramasse des noisettes pendant l'été , en remplit les troncs , les fentes d'un vieux arbre , & a recours en hiver à sa provision , il les cherche aussi sous la neige qu'il détourne en grattant. Il a la voix éclatante , & plus perçante encore que celle de la fouine ; il a de plus un murmure à bouche fermée , un petit grognement de mécontentement qu'il fait entendre toutes les fois qu'on l'irrite. Il est trop léger pour marcher , il va ordinairement par petits sauts & quelquefois par bonds ; il a les ongles si pointus & les mouvements si prompts , qu'il grimpe en un instant sur un hêtre dont l'écorce est fort lisse.

On entend les écureuils , pendant les belles nuits d'été , crier en courant sur les arbres les uns après les autres ; ils semblent craindre l'ardeur du soleil , ils demeurent pendant le jour à l'abri dans leur domicile , dont ils sortent le soir pour s'exercer , jouer , faire l'amour & manger : ce domicile est propre , chaud & impénétrable à la pluie , c'est ordinairement sur l'enfourchure d'un arbre qu'ils l'établissent ; ils commencent par transporter des bûchettes qu'ils mêlent , qu'ils entrelacent avec de la mousse ; ils la ferment ensuite , ils la foulent & donnent assez de capacité & de solidité à leur ouvrage , pour

y être à l'aise & en sûreté avec leurs petits ; il n'y a qu'une ouverture vers le haut , juste , étroite , & qui suffit à peine pour passer ; au-dessus de l'ouverture est une espèce de couvert en cône qui met le tout à l'abri , & fait que la pluie s'écoule par les côtés & ne pénètre pas. Ils produisent ordinairement trois ou quatre petits ; ils entrent en amour au printemps & mettent bas au mois de mai ou au commencement de juin ; ils muent au sortir de l'hiver , le poil nouveau est plus roux que celui qui tombe. Ils se peignent , ils se polissent avec les mains & les dents ; ils sont propres , ils n'ont aucune mauvaise odeur ; leur chair est assez bonne à manger. Le poil de la queue sert à faire des pinceaux ; mais leur peau ne fait pas une bonne fourrure.

Il y a beaucoup d'espèces voisines de celle de l'écureuil , & peu de variétés dans l'espèce même ; il s'en trouve quelques-uns de cendrés , tous les autres sont roux. Les petits-gris qui sont d'une espèce différente , demeurent toujours gris. Et sans citer les écureuils volans qui sont bien différents des autres , l'écureuil blond de Cambaye (c) , qui est fort petit & qui a la queue semblable à l'écureuil d'Europe , celui de Madagascar (d) nommé *Tsitsiki* , qui est gris ,

(c) Voyez les voyages de Pietro della Valle. Rouen , 1745 , tome VI , page 368.

(d) Voyez le voyage de Flaccourt. Paris , 1661 , page 164.

& qui n'est, dit Flaccourt, ni beau ni bon à apprivoiser; l'écureuil blanc de Siam (*e*), l'écureuil gris (*f*) un peu tacheté de Bengale, l'écureuil-rayé de Canada (*g*), l'écureuil noir (*h*), le grand écureuil gris de Virginie (*i*), l'écureuil de la Nouvelle Espagne à raies blanches (*k*), l'écureuil blanc de Sibérie (*l*), l'écureuil varié ou le *mus ponticus*, le petit écureuil d'Amérique, celui du Brésil, celui de Barbarie, le rat palmiste, &c. forment autant d'espèces distinctes & séparées.

(*e*) *Voyez le second voyage du P. Tachard. Paris, 1689, page 249.*

(*f*) *Voyez le Recueil des voyages de la compagnie des Indes de Hollande. Amsterdam, 1711, tome VII.*

(*g*) *Voyez les voyages de Sabard Théodat. Paris, 1632, pages 305 & 306.*

(*h*) *Voyez l'Histoire naturelle de la Caroline, par Catesby. Londres, 1743, tome II, page 73.*

(*i*) *Voyez idem, tome II, page 76.*

(*k*) *Vide Albert Sebe, vol. I, pag. 76.*

(*l*) *Vide Brisson, Regn. animal, pag. 151.*





L E R A T (a).

Voyez planche VIII , fig. 3 de ce Volume.

DESCENDANT par degrés du grand au petit , du fort au foible , nous trouverons que la Nature a su tout compenser : qu'uniquement attentive à la conservation de chaque espèce , elle fait profusion d'individus , & se soutient par le nombre dans toutes celles qu'elle a réduites au petit , ou qu'elle a laissées sans forces , sans armes & sans courage : & non-seulement elle a voulu que ces espèces inférieures fussent en état de résister ou durer par le nombre ; mais il semble qu'elle ait en même temps donné des suppléments à chacune , en multipliant les espèces voisines. Le rat , la souris , le mulot , le rat

(a) Le Rat ; en Grec *Muc* ; en Latin , *Mus major* ; *Rattus* ; en Italien , *Rato di casa* ; en Espagnol , *Raton* ; en Allemand , *Ratz* ; en Anglois , *Rat* , *Ratte* ; en Suédois , *Rotta* ; en Polonois , *Sczurcz*.

Mus domesticus major , sive *rattus*. Gesner , hist. quadr. page 731. Icon. animal. quadr. page 114.

Mus domesticus major , sive *rattus*. Ray Synops. animal. quadrup. page 217.

Mus caudâ longâ , *subnudâ* , *corpore fusco cinerascente*. Linnæus.

Mus , *Rattus domesticus*. Kleih , de quadr. p. 57.

Mus caudâ longissimâ , *obscure cinereus* . . . *Rattus*. Brillon , Regn. animal. page 168.

d'eau, le campagnol, le loir, le lerot, le muscardin, la musaraigne, beaucoup d'autres que je ne cite point parce qu'ils sont étrangers à notre climat, forment autant d'espèces distinctes & séparées, mais assez peu différentes pour pouvoir en quelque sorte se suppléer & faire que, si l'une d'entre elles venoit à manquer, le vide en ce genre seroit à peine sensible. C'est ce grand nombre d'espèces voisines qui a donné l'idée des genres aux Naturalistes ; idée que l'on ne peut employer qu'en ce sens, lorsqu'on ne voit les objets qu'en gros, mais qui s'évanouit dès qu'on l'applique à la réalité, & qu'on vient à considérer la Nature en détail.

Les hommes ont commencé par donner différens noms aux choses qui leur ont paru distinctement différentes, & en même temps ils ont fait des dénominations générales pour tout ce qui leur paroissoit à-peu-près semblable. Chez les peuples grossiers & dans toutes les langues naissantes, il n'y a presque que des noms généraux, c'est-à-dire, des expressions vagues & informes de choses du même ordre & cependant très différentes entr'elles ; un chêne, un hêtre, un tilleul, un sapin, un if, un pin, n'auront d'abord eu d'autre nom que celui d'*arbre* ; ensuite le chêne, le hêtre, le tilleul se seront tous trois appellés *chênes* lorsqu'on les aura distingués du sapin, du pin, de l'if, qui tous trois se seront appelés *sapin*. Les noms particuliers ne sont venus qu'à la suite de la comparaison & de l'examen détaillé qu'on a fait de chaque espèce de choses : on a aug-

mente le nombre de ces noms à mesure qu'on a plus étudié & mieux connu la Nature ; plus on l'examinera, plus on la comparera, plus il y aura de noms propres & de dénominations particulières. Lorsqu'on nous la présente donc aujourd'hui par des dénominations générales, c'est - à - dire , par des genres , c'est nous renvoyer à l'ABC de toute connoissance , & rappeller les ténèbres de l'enfance des hommes : l'Ignorance a fait les genres , la Science a fait & fera les noms propres , & nous ne craindrons pas d'augmenter le nombre des dénominations particulières , toutes les fois que nous voudrons désigner des espèces différentes.

L'on a compris & confondu sous ce nom générique de Rat , plusieurs espèces de petits animaux ; nous ne donnerons ce nom qu'au rat commun , qui est noirâtre & qui habite dans les maisons : chacune des autres espèces aura sa dénomination particulière , parce que ne se mêlant point ensemble , chacune est différente de toutes les autres. Le rat est assez connu par l'incommodeité qu'il nous cause ; il habite ordinairement les greniers où l'on entasse le grain , où l'on ferre les fruits , & de-là descend & se répand dans la maison. Il est carnassier , & même omnivore , il semble seulement préférer les choses dures aux plus tendres ; il ronge la laine , les étoffes , les meubles , perce le bois , fait des trous dans les murs , se loge dans l'épaisseur des planchers , dans les vides de la charpente ou de la boiserie ; il en sort pour chercher sa subsistance , & souvent il y transporte tout ce

qu'il peut traîner, il y fait même quelquefois magasin, surtout lorsqu'il a des petits. Il produit plusieurs fois par an, presque toujours en été; les portées ordinaires sont de cinq ou six. Il cherche les lieux chauds, & se niche en hiver auprès des cheminées ou dans le foin, dans la paille. Malgré les chats, le poison, les pièges, & appâts, ces animaux pullulent si fort, qu'ils causent souvent de grands dommages; c'est surtout dans les vieilles maisons à la campagne, où l'on garde du blé dans les greniers, & où le voisinage des granges & des magasins à foin facilite leur retraite & leur multiplication, qu'ils sont en si grand nombre qu'on seroit obligé de démeubler, de désérerter, s'ils ne se détruisoient eux-mêmes; mais nous avons vu par expérience qu'ils se tuent, qu'ils se mangent entr'eux pour peu que la faim les presse, en sorte que quand il y a disette à cause du trop grand nombre, les plus forts se jettent sur les plus faibles, leur ouvrent la tête & mangent d'abord la cervelle, & ensuite le reste du cadavre; le lendemain la guerre recommence, & dure ainsi jusqu'à la destruction du plus grand nombre; c'est par cette raison, qu'il arrive ordinairement, qu'après avoir été infesté de ces animaux pendant un temps, ils semblent souvent disparaître tout à coup, & quelquefois pour long temps. Il en est de même des mulots, dont la pullulation prodigieuse n'est arrêtée que par les cruautés qu'ils exercent entr'eux, dès que les vivres commencent à leur manquer. Aristote a attribué

cette destruction subite à l'effet des pluies ; mais les rats n'y sont point exposés , & les mulots savent s'en garantir ; car les trous qu'ils habitent sous terre , ne sont pas même humides.

Les rats sont aussi lascifs que voraces , ils glapissent dans leurs amours , & crient quand ils se battent ; ils préparent un lit à leurs petits , & leur apportent bientôt à manger ; lorsqu'ils commencent à sortir de leur trou , la mère les veille , les défend , & se bat même contre les chats pour les sauver. Un gros rat est plus méchant , & presqu'aussi fort qu'un jeune chat ; il a les dents de devant longues & fortes : le chat mord mal , & comme il ne se fert guere que de ses griffes , il faut qu'il soit non-seulement vigoureux , mais aguerri. La belette , quoique plus petite , est un ennemi plus dangereux , & que le rat redoute parce qu'elle le suit dans son trou : le combat dure quelquefois long-temps , la force est au moins égale , mais l'emploi des armes est différent : le rat ne peut blesser qu'à plusieurs reprises & par les dents de devant , lesquelles sont plutôt faites pour ronger que pour mordre , & qui étant posées à l'extrémité du levier de la mâchoire ont peu de force ; tandis que la belette mord de toute la mâchoire avec acharnement , & qu'au lieu de démordre , elle suce le sang de l'endroit entamé ; aussi le rat succombe-t-il toujours.

On trouve des variétés dans cette espèce , comme dans toutes celles qui sont très nombreuses en individus ; outre les rats ordinaires qui sont noirâtres , il y en a de bruns , de

presque noirs, d'autres d'un gris plus blanc ou plus roux, & d'autres tout-à-fait blancs : ces rats blancs ont les yeux rouges comme le lapin blanc, la souris blanche, & comme tous les autres animaux qui sont tout-à-fait blancs. L'espèce entiere, avec ses variétés, paroît être naturelle aux climats tempérés de notre continent, & s'est beaucoup plus répandue dans les pays chauds que dans les pays froids. Il n'y en avoit point en Amérique (*b*), & ceux qui y sont aujourd'hui, & en très grand nombre, y ont débarqué avec les Européens : ils multiplierent d'abord si prodigieusement, qu'ils ont été pendant long-temps le fléau des Colonies, où ils n'avoient guere d'autres ennemis que les grosses couleuvres qui les avaient tout vivans : les navires les ont aussi portés aux Indes orientales, & dans toutes les isles de l'Archipel indien (*c*) : il s'en trouve aussi beaucoup en Afrique (*d*). Dans le nord, au contraire, ils ne se sont guere multipliés au-delà de la Suède ; & ce qu'on appelle des rats en Norvège, en Laponie, &c. sont des animaux différens de nos rats.

(*b*) Voyez la description des Antilles, par le P. du Tertre. Paris, 1677, tome II, page 303. L'*histoire naturelle des isles Antilles*. Rotterdam, 1658, page 261. *Nouveaux voyages aux isles de l'Amérique*. Paris, 1722, tome III, page 160. *Voyage de Dampier*. Rouen, 1715, tome IV, page 225.

(*c*) Voyez les *Lettres édifiantes*, Recueil XVIII, page 161.

(*d*) Voyez le voyage de Guinée, par Bosman. Utrecht, 1705, page 241. Voyez aussi l'*histoire générale des Voyages*, par M. l'abbé Prévôt, tome IV, page 238,



I La Souris. 2 Le Mulot. 3 Le Campagnol. 4 La Musaraigne. 5 La Musaraigne d'eau. 6 La Taup.
7 Le Myscardin.

LA SOURIS (a).

Voyez planche IX, figure 1 de ce Volume.

LA Souris, beaucoup plus petite que le Rat, est aussi plus nombreuse, plus commune & plus généralement répandue : elle a le même instinct, le même tempérament, le même naturel, & n'en diffère guère que par la foiblesse & par les habitudes qui l'accompagnent ; timide par nature, familière par nécessité, la peur ou le besoin font tous ses mouvements ; elle ne sort de son trou que pour chercher à vivre ; elle ne s'en écarte guère, y rentre à la première alerte, ne va pas, comme le rat, de maisons en maisons

(a) La Souris ; en Grec *Μύοντος* ; en Latin, *Mus*, *Musculus*, *Mus minor*, *Sorex* ; en Italien, *Topo*, *Sorice*, *Sorgio di casa* ; en Espagnol, *Rat* ; en Allemand, *Mus* ; en Anglois, *Mouse* ; en Suédois, *Mus* ; en Polonois, *Myś*, *muś*.

Mus. Gelner, hist. quadrup. page 714. Mus domesticus communis vel minor. Gesner, Icon. animal quadr. page 114.

Mus domesticus vulgaris seu minor. Ray, Synops. animal. quadrup. pag. 218.

Mus caudā nudiusculā, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente. Linnæus.

Mus minor, musculus vulgaris domesticus, caudā reteti longā. Klein, de quadrup. page 57.

Mus caudā longissimā, obscure cinereus, ventre subalbescente . . . Sorex. Scillon, Regn. animal. page 169.

à moins qu'elle n'y soit forcée , fait aussi beaucoup moins de dégât , a les mœurs plus douces & s'apprivoise jusqu'à un certain point , mais sans s'attracher : comment aimer en effet ceux qui nous dressent des embûches ? plus foible , elle a plus d'ennemis auxquels elle ne peut échapper , ou plutôt se soustraire , que par son agilité , sa petitesse même. Les chouettes , tous les oiseaux de nuit , les chats , les fouines , les belettes , les rats mêmes , lui font la guerre ; on l'attire , on la leurre aisément par des appâts , on la détruit à milliers ; elle ne subsiste enfin que par son immense fécondité.

J'en ai vu qui avoient mis bas dans des souricières ; elles produisent dans toutes les saisons , & plusieurs fois par an ; les portées ordinaires sont de cinq ou six petits ; en moins de quinze jours ils prennent assez de force & de croissance pour se disperser & aller chercher à vivre : ainsi , la durée de la vie de ces petits au maux est fort courte , puisque leur accroissement est si prompt ; & cela augmente encore l'idée qu'on doit avoir de leur prodigieuse multiplication. Aristote (*b*) dit , qu'ayant mis une souris pleine dans un vase à ferrer du grain , il s'y trouva peu de temps après cent vingt souris toutes issues de la même mère.

Ces petits animaux ne sont point laids , ils ont l'air vif & même assez fin ; l'espèce d'horreur qu'on a pour eux , n'est fondée

(*b*) *Vide. Aristot. histor. animal. lib. VI, cap. 37.*

que

que sur les petites surprises & sur l'incommodité qu'ils causent. Toutes les souris sont blanchâtres sous le ventre, & il y en a de blanches sur tout le corps, il y en a aussi de plus ou moins brunes & de plus ou moins noires. L'espèce est généralement répandue en Europe, en Asie, en Afrique ; mais on prétend qu'il n'y en avoit point en Amérique, & que celles qui y sont actuellement, en grand nombre, viennent originairement de notre continent ; ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il paroît que ce petit animal suit l'homme & fuit les pays inhabités, par l'appétit naturel qu'il a pour le pain, le fromage, le lard, l'huile, le beurre & les autres alimens que l'homme prépare pour lui-même.





LE MULOT.

Voyez planche IX fig. 2 de ce Volume.

LE Mulot est plus petit que le Rat, & plus gros que la Souris ; il n'habite jamais les maisons, & ne se trouve que dans les champs & dans les bois ; il est remarquable par les yeux qu'il a gros & proéminens , & il diffère encore du rat & de la souris par la couleur du poil qui est blanchâtre sous le ventre , & d'un roux brun sur le dos : il est très généralement & très abondamment répandu , surtout dans les terres élevées. Il paroît qu'il est long-temps à croître ; parce qu'il varie considérablement pour la grandeur ; les grands ont quatre pouces deux ou trois lignes de longueur depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue ; les petits , qui paroissent adultes comme les autres , ont un pouce de moins. Et comme il s'en trouve de toutes les grandeurs intermédiaires , on ne peut pas douter que les grands & les petits ne soient tous de la même espèce ; il y a grande apparence que c'est faute d'avoir connu ce fait , que quelques Naturalistes en ont fait deux espèces ; l'une qu'ils ont appellée le *grand rat des champs* (a) , & l'autre le

(a) *Mus agricola major , macrouros Gesneri. Ray , Synopsis animal quadrup. page 319.*

mulot (b). Ray, qui le premier est tombé dans cette erreur, en les indiquant sous deux dénominations, semble avouer qu'il n'en connaît qu'une espèce (c). Et quoique les courtes descriptions qu'il donne de l'une & de l'autre espèce paroissent différer, on ne doit pas en conclure qu'elles existent toutes deux, 1^o. parce qu'il n'en connoissoit lui-même qu'une ; 2^o. parce que nous n'en connoissons qu'une, & que quelques recherches que nous ayons faites, nous n'en avons trouvé qu'une ; 3^o. parce que Gesner & les autres anciens Naturalistes ne parlent que d'une, sous le nom de *mus agrestis major*, qu'ils disent être très commune, & que Ray dit aussi que l'autre qu'il donne sous le nom de *mus domesticus medijs*, est très commune : ainsi il feroit impossible que les uns ou les autres de ces auteurs ne les eussent pas vues toutes deux, puisque, de leur aveu, toutes deux sont si communes ; 4^o. parce que dans cette seule & même espèce, comme il s'en trouve de plus grands & de plus petits, il est proba-

Le grand rat des champs. *Mus caudā longissimā fuscescens, ad latera rufus . . . Mus campestris major.* Brillon, Regn. animal. page 171.

(b) *Mus domesticus medijs.* Ray, Synops animal. quadrup. page 218.

Le Mulot. *Mus caudā longā, suprā fusco flavescens, infra ex albo cinereo.* Brillon, Regn. animal. page 274.

(c) De hic specie nullum non undevigintus satisfacter est Ray, Synops. quadrup. pag: 219.

vent éprouvé le dommage très considérable que ces animaux causent aux plantations ; ils emportent les glands nouvellement semés , ils suivent le sillon tracé par la charrue , déterrent chaque gland l'un après l'autre , & n'en laissent pas un : cela arrive surtout dans les années où le gland n'est pas fort abondant ; comme ils n'en trouvent pas assez dans les bois , ils viennent le chercher dans les terres semées , ne le mangent pas sur le lieu , mais l'emportent dans leur trou , où ils l'entassent , & le laissent souvent sécher & pourrir. Eux seuls font plus de tort à un semis de bois , que tous les oiseaux & tous les autres animaux ensemble. Je n'ai trouvé d'autre moyen pour éviter ce grand dommage , que de tendre des pièges de dix pas en dix pas dans toute l'étendue de la terre semée ; il ne faut qu'une noix grillée pour appât , sous une pierre platte soutenue par une bûchette ; ils viennent pour manger la noix qu'ils préfèrent au gland ; comme elle est attachée à la bûchette , dès qu'ils y touchent , la pierre leur tombe sur le corps , & les étouffe ou les écrase ; je me suis servi du même expédient contre les campagnols qui détruisent aussi les glands ; & comme l'on avoit soin de m'apporter tout ce qui se trouvoit sous les pièges , j'ai vu les premières fois avec étonnement , que chaque jour on prenoit une centaine , tant de mulots que de campagnols , & cela dans une pièce de terre d'environ 40 arpens ; j'en ai eu plus de deux milliers en trois semaines , depuis le 1^{er} Novembre jusqu'au 8 Décembre , & ensuite en

moindre nombre jusqu'aux grandes gelées , pendant lesquelles ils se recèlent & se nourrissent dans leur trou. Depuis que j'ai fait cette épreuve , il y a plus de 20 ans , je n'ai jamais manqué , toutes les fois que j'ai semé du bois , de me servir du même expédient , & jamais on n'a manqué de prendre des mulots en très grand nombre ; c'est surtout en automne qu'ils sont en si grande quantité , il y en a beaucoup moins au printemps ; car ils se détruisent eux-mêmes pour peu que les vivres viennent à leur manquer pendant l'hiver ; les gros mangent les petits. Ils mangent aussi les campagnols , & même les grives , les merles & les autres oiseaux qu'ils trouvent pris aux lacets , ils commencent par la cervelle , & finissent par le reste du cadavre. Nous avons mis dans un même vase douze de ces mulots vivans ; on leur donnaient à manger à huit heures du matin ; un jour qu'on les oublia d'un quart-d'heure , il y en eut un qui servit de pâture aux autres ; le lendemain ils en mangèrent un autre , & enfin au bout de quelques jours il n'en resta qu'un seul , tous les autres avoient été tués & dévorés en partie , & celui qui resta le dernier avoit lui-même les pattes & la queue mutilées.


Le rat pullule beaucoup , le mulot pullule encore davantage ; il produit plus d'une fois par an , & les portées sont souvent de neuf & dix , au lieu que celles du rat ne sont que de cinq ou six : un homme de ma campagne en prit un jour 22 dans un seul trou , il y avoit deux mères & vingt petits. Il est très

généralement répandu dans toute l'Europe ; on le trouve en Suède , & c'est celui que M. Linnæus appelle (e) *mus caudâ longâ, corpore nigro flavescente, abdomine albo.* Il est très commun en France , en Italie , en Suisse ; Gesner l'a appellé *mus agrestis major* (f). Il est aussi en Allemagne , en Angleterre , où on le nomme *fell-musz, field-mouse, c'est-à-dire, rat des champs :* il a pour ennemis les loups , les renards , les martes , les oiseaux de proie & lui-même.

(e) *Vide Linnæi Faun. Suecic. Stockholmiae, 1746, p. 111.*

(f) *Gesner, hist. quadrup. page 733. Icon. animal. quadrup. page 116.*





3



1 Le Rat d'eau. 2 Le Cochon d'Inde. 3 Le Herisson



LE RAT D'EAU (a).

Voyez planche XI, fig. I de ce volume,

LE Rat d'eau est un petit animal de la grosseur d'un rat, mais qui par le naturel & par les habitudes, ressemble beaucoup plus à la loutre qu'au rat ; comme elle , il ne fréquente que les eaux douces , & on le trouve communément sur les bords des rivières , des ruisseaux , des étangs ; comme elle , il ne vit guere que de poissons : les goujons , les mouteilles , les verrons , les ablettes , le frai de la carpe , du brochet , du barbeau , sont sa nourriture ordinaire ; il mange aussi des grenouilles , des insectes d'eau , & quelque-

(a) Le Rat d'eau ; en Latin , *Mus aquaticus* , *Mus aquatilis* ; en Italien , *Sorgo morgange* ; en Allemand , *Wasser-maus* ; en Anglois , *Water-Rat* ; en Polonois , *Myss-wudna*.

Mus aquaticus. Gefner , hist. quadrup. page 732. *Mus aquatilis* , quadrupes Bellonii. Icon. animal. aquat. p. 354.

Mus major aquaticus , sive *Rattus aquaticus*. Ray , Synops. animal. quadrup. page 317.

Castor caudâ lineari tereti. *Rattus aquaticus*. Linnæus.


Mus , *Rattus aquatilis*. Klein , de quadrup. p. 57.

Mus caudâ longâ , *pilis suprà ex nigro & flavescente mixtis* , *infra cinereis vestitus* ... *Mus aquaticus*. Brillon , Regn. animal. page 175.

fois des racines & des herbes. Il n'a pas , comme la loutre , des membranes entre les doigts des pieds : c'est une erreur de Willugby , que Ray & plusieurs autres Naturalistes ont copiée ; il a tous les doigts des pieds séparés , & cependant il nage facilement , se tient sous l'eau long temps , & rapporte sa proie pour la manger à terre , sur l'herbe ou dans son trou ; les pêcheurs l'y surprennent quelquefois en cherchant des écrevisses , il leur mord les doigts , & cherche à se sauver en se jettant dans l'eau. Il a la tête plus courte , le museau plus gros , le poil plus hérissé , & la queue beaucoup moins longue que le rat. Il fuit , comme la loutre , les grands fleuves ou plutôt les rivieres trop fréquentées. Les chiens le chassent avec une espèce de fureur. On ne le trouve jamais dans les maisons , dans les granges ; il ne quitte pas le bord des eaux , ne s'en éloigne même pas autant que la loutre , qui quelquefois s'écarte & voyage en pays sec à plus d'une lieue. Le rat d'eau ne va point dans les terres élevées , il est fort rare dans les hautes montagnes , dans les plaines arides ; mais très nombreux dans tous les vallons humides & marécageux. Les mâles & les femelles se cherchent sur la fin de l'hiver , elles mettent bas au mois d'avril ; les portées ordinaires font de six ou sept. Peut-être ces animaux produisent-ils plusieurs fois par an , mais nous n'en sommes pas informés ; leur chair n'est pas absolument mauvaise ; les payfans la mangent les jours maigres comme celle de

la loutre. On les trouve par-tout en Europe , excepté dans le climat trop rigoureux du Pôle : on les retrouve en Egypte sur les bords du Nil, si l'on en croit Bellon ; cependant la figure qu'il en donne ressemble si peu à notre rat d'eau , que l'on peut soupçonner , avec quelque fondement , que ces rats du Nil sont des animaux différens.





LE CAMPAGNOL [a].

Voyez planche IX, fig. 3 de ce Volume.

LE Campagnol est encore plus commun, plus généralement répandu que le Mulot ; celui-ci ne se trouve guere que dans les terres élevées, le campagnol se trouve partout, dans les bois, dans les champs, dans les prés, & même dans les jardins : il est remarquable par la grosseur de sa tête, & aussi par sa queue courte & tronquée, qui n'a guere qu'un pouce de long ; il se pratique des trous en terre où il amasse du grain, des noisettes & du gland ; cependant il paraît qu'il préfere le blé à toutes les autres

(a) Campagnol, mulot à courte queue ; petit rat des champs ; en Italien, *Campagnoli*.

Mus agrestis minor. Gesner, hist. quadr. page 733. Icon. animal. quadr. page 116.

Mus agrestis capite grandi. Brachiuros. Ray, Synops. animal. quadrup. page 218.

Mus caudâ brevi, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascente. Linnæus.

Mus agrestis capite grandi. Klein, de quadrup. p. 57.

Mus caudâ brevi, pilis è nigricante & sordide luteo mixtis in dorso, & saturatè cinereis in ventre vestitus . . .

Mus campestris minor. Brisson, Regn. animal. p. 176.

Rat de terre. Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1736, Mémoires sur les Musaraignes, par M. Daubenton.


nourritures. Dans le mois de juillet, lorsque les blés sont mûrs, les campagnols arrivent de tous côtés, & font souvent de grands dommages en coupant les tiges du blé pour en manger l'épi; ils semblent suivre les moissonneurs, ils profitent de tous les grains tombés & des épis oubliés; lorsqu'ils ont tout glané, ils vont dans les terres nouvellement semées, & détruisent d'avance la récolte de l'année suivante. En automne & en hiver, la plupart se retirent dans les bois où ils trouvent de la faine, des noisettes & du gland. Dans certaines années, ils paroissent en si grand nombre, qu'ils détruiroient tout s'ils subsistoient long-temps; mais ils se détruisent eux-mêmes, & se mangent dans les temps de disette: ils servent d'ailleurs de pâture aux mulots, & de gibier ordinaire au renard, au chat sauvage, à la marte & aux belettes.

Le campagnol ressemble plus au rat d'eau qu'à aucun animal par les parties intérieures, comme on peut le voir par ce qu'en dit M. Daubenton (*b*); mais à l'extérieur il en diffère par plusieurs caractères essentiels: 1^o. par la grandeur; il n'a guere que trois pouces de longueur depuis le bout du nez, jusqu'à l'origine de la queue, & le rat d'eau en a sept: 2^o. par les dimensions de la tête & du corps; le campagnol est proportionnellement à la longueur de son

(*b*) Veyez la description du Campagnol, au tome XV de l'édition en trente-un volumes.

corps , plus gros que le rat d'eau , & il a aussi la tête proportionnellement plus grosse : 3°. par la longueur de la queue , qui dans le campagnol ne fait tout au plus que le tiers de la longueur de l'animal entier , & qui dans le rat d'eau fait près des deux tiers de cette même longueur : 4°. enfin par le naturel & les mœurs ; les campagnols ne se nourrissent pas de poisson , & ne se jettent point à l'eau : ils vivent de gland dans les bois , de blé dans les champs , & dans les prés de racines tuberculeuses , comme celle du chiendent ; leurs trous ressemblent à ceux des mulots , & souvent sont divisés en deux loges , mais ils sont moins spacieux & beaucoup moins enfoncés sous terre : ces petits animaux y habitent quelquefois plusieurs ensemble . Lorsque les femelles sont prêtes à mettre bas , elles y portent des herbes pour faire un lit à leurs petits : elles produisent au printemps & en été ; les portées ordinaires sont de cinq ou six , & quelquefois de sept ou huit .





LE COCHON D'INDE (a).

.Voyez planche XI, figure 2 de ce Volume.

C E petit animal, originaire des climats chauds du Brésil & de la Guinée, ne laisse pas de vivre & de produire dans le climat tempéré, & même dans les pays froids; en le soignant & le mettant à l'abri de l'intempérie des saisons. On élève des cochons d'Inde en France, & quoiqu'ils multiplient prodigieusement, ils n'y sont pas en grand nombre, parce que les soins qu'ils demandent ne sont pas compensés par le profit qu'on en tire. Leur peau n'a presqu'aucune valeur,

(a) Le Cochon d'Inde; au Brésil, *Cavia, cobaya*; en Allemand, *Indianisch künede*, *Indisch señle*, *Meer-ferckel*, *Meer-schwein*; en Anglois, *Guiny-pig*; en Suédois, *Marswin*; en Polonois, *Swinka zamorska*.

Cavia Cobaya. Pison, hist. nat. page 102.

Cuniculus Indus. Gesner, Icon. animal. quadrup. p. 106.

Mus seu cuniculus Americanus & Guineensis, *porcelli piis & voce*, *Cavia Cobaya Brasiliensis dictus*, *Marcgravii*. Ray, Synops. animal quadrup. page 223.

Mus caudâ abruptâ, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. Linnæus.

Cavia Cobaya Brasiliensis; *quibusdam mus Pharaonis*, *tatu pilosus*, *porcellus*, *mus Indicus*. Klein, de quadrup. p. 47.

Lapin des Indes. *Cuniculus ecaudatus*, *auritus*, *albus aut rufus*, *aut ex utroque variegatus*... *Cuniculus Indicus*. Brisson, Regn. animal. page 147.

& leur chair, quoique mangeable, n'est pas assez bonne pour être recherchée : elle se-roit meilleure , si on les élevoit dans des espèces de garennes où ils auroient de l'air , de l'espace & des herbes à choisir. Ceux qu'on garde dans les maisons ont à-peu-près le même mauvais goût que les lapins clapiers , & ceux qui ont passé l'été dans un jardin ont toujours un goût fade , mais moins désagréable.

Ces animaux sont d'un tempérament si précoce & si chaud , qu'ils se recherchent & s'accouplent cinq ou six semaines après leur naissance ; ils ne prennent cependant leur accroissement entier qu'en huit ou neuf mois , mais il est vrai que c'est en grosseur apparente & en graisse qu'ils augmentent le plus , & que le développement des parties solides est fait avant l'âge de cinq ou six mois. Les femelles ne portent que trois semaines , & nous en avons vu mettre bas à deux mois d'âge. Ces premières portées ne sont pas si nombreuses que les suivantes , elles sont de quatre ou cinq , la seconde portée est de cinq ou six , & les autres de sept ou huit & même de dix ou onze. La mere n'allait ses petits que pendant douze ou quinze jours , elle les chasse dès qu'elle reprend le mâle , c'est au plus tard trois semaines après qu'elle a mis bas ; & s'ils s'obstinent à demeurer auprès d'elle , leur pere les maltraite & les tue. Ainsi , ces animaux produisent au moins tous les deux mois ; & ceux qui viennent de naître produisant de même , l'on est étonné de leur prompte

&

& prodigieuse multiplication. Avec une seule couple, on pourroit en avoir un millier dans un an ; mais ils se détruisent aussi vite qu'ils pullulent, le froid & l'humidité les font mourir, ils se laissent manger par les chats sans se défendre ; les meres même ne s'irritent pas contre eux ; n'ayant pas le temps de s'attacher à leurs petits, elles ne font aucun effort pour les sauver. Les mâles se soucient encore moins des petits, & se laissent manger eux-mêmes sans résistance ; ils n'ont de sentiment bien distinct que celui de l'amour, ils sont alors susceptibles de colere, ils se battent cruellement, ils se tuent même quelquefois entr'eux lorsqu'il s'agit de se faire & d'avoir la femelle. Ils passent leur vie à dormir, jouir & manger ; leur sommeil est court, mais fréquent ; ils mangent à toute heure du jour & de la nuit, & cherchent à jouir aussi souvent qu'ils mangent ; ils ne boivent jamais, & cependant ils urinent à tour moment. Ils se nourrissent de toutes sortes d'herbes, & surtout de persil ; ils le préfèrent même au son, à la farine, au pain ; ils aiment aussi beaucoup les pommes & les autres fruits. Ils mangent précipitamment, à-peu-près comme les lapins, peu à la fois, mais très souvent. Ils ont un grognement semblable à celui d'un petit cochon de lait ; ils ont aussi une espèce de gazouillement qui marque leurs plaisirs lorsqu'ils sont auprès de leur femelle, & un cri fort aigu lorsqu'ils ressentent de la douleur. Ils sont délicats, frileux, & l'on a de la peine à leur faire

passer l'hiver ; il faut les tenir dans un endroit sain, sec & chaud. Lorsqu'ils sentent le froid, ils se rassemblent & se ferment les uns contre les autres ; & il arrive souvent que faisis par le froid ils meurent tous ensemble. Ils sont naturellement doux & privés, ils ne font aucun mal ; mais ils sont également incapables de bien, ils ne s'attachent point : doux par tempérament, dociles par foiblesse, presque insensibles à tout, ils ont l'air d'automates montés pour la propagation, faits seulement pour figurer une espèce.





LE HÉRISSON (a).

Voyez planche XI fig. 3 de ce Volume.

HOll' oïd' ~~chien~~, all' exīnos ôr mēya : le Renard fait beaucoup de choses , le Hérisson n'en fait qu'une grande , disoient proverbialement les Anciens (b). Il fait se défendre sans combattre , & blesser sans attaquer : n'ayant que peu de force & nulle agilité pour fuir , il a reçu de la Nature une armure épineuse , avec la facilité de se resserrer en boule & de présenter de tous côtés des armes défen-

(a) Le Hérisson ; en Grec , Εχῖνος ; en Latin , *Echinus* , *Herinaceus* , *Erinaceus* ; *Echinus terestris* ; en Italien , *Erinaceo* , *Riccio* , *Aizzo* ; en Espagnol , *Erizo* ; en Portugais , *Ournzo* , *Orico cachero* ; en Allemand , *Igel* ; en Anglois , *Urchin* , *Heyde-hog* ; en Suédois , *Igelkott* ; en Danois , *Pind Swin* ; en Polonais , *Jeż* , *Ziennay* ; en Hollandois , *Iseren Vereken* ; en ancien François , *Eurchon*.

Echinus terestris. Gesner , hist. quadr. page 368.

Herinaceus. Gesner , Icon. anim. quadrup. page 106.

Echinus sive *Erinaceus terestris*. Ray , Syncop. animal. quadrup. page 231.

Erinaceus spinosus , *auriculatus* , *Echinus terestris*. Linnaeus.

Acanthion vulgaris nostras , *Herinaceus* , *Echinus* . klein , de quadrup. page 66.

Erinaceus auriculis erectis . . . *Erinaceus*. Brisson , Regn. animal. page 161.

(b) Zenodotus , Plutarchus & alii ex Archilochos.

sives, poignantes, & qui rebutent ses ennemis ; plus ils le tourmentent, plus il se hérisse & se resserre. Il se défend encore par l'effet même de la peur, il lâche son urine, dont l'odeur & l'humidité se répandant sur tout son corps, achèvent de les dégoûter. Aussi la plupart des chiens se contentent de l'aboyer & ne se soucient pas de le saisir : cependant il y en a quelques-uns qui trouvent moyen, comme le renard, d'en venir à bout en se piquant les pieds & se mettant la gueule en sang ; mais il ne craint ni la fouine, ni la marte, ni le putois, ni le furet, ni la helette, ni les oiseaux de proie. La femelle & le mâle sont également couverts d'épines depuis la tête jusqu'à la queue, & il n'y a que le dessous du corps qui soit garni de poils ; ainsi ces mêmes armes qui leur sont si utiles contre les autres, leur deviennent très incommodes lorsqu'ils veulent s'unir : ils ne peuvent s'accoupler à la manière des autres quadrupèdes, il faut qu'ils soient face à face, debout ou couchés. C'est au printemps qu'ils se cherchent, & ils produisent au commencement de l'été. On m'a souvent apporté la mère & les petits au mois de juin : il y en a ordinairement trois ou quatre, & quelquefois cinq ; ils sont blancs dans ces premiers temps, & l'on voit seulement sur leur peau la naissance des épines. J'ai voulu en élever quelques-uns, on a mis plus d'une fois la mère & les petits dans un tonneau avec une abondante provision ; mais au lieu de les allaiter, elle les a dévorés les uns après les autres. Ce n'étoit pas par le

besoin de nourriture , car elle mangeoit de la viande , du pain , du son , des fruits , & l'on n'auroit pas imaginé qu'un animal aussi lent , aussi paresseux , auquel il ne manquoit rien que la liberté , fût de si mauvaise humeur , & si fâché d'être en prison ; il a même de la malice , & de la même sorte que celle du singe. Un hérisson qui s'étoit glissé dans la cuisine découvrit une petite marmite , en tira la viande & y fit ses ordures. J'ai gardé des mâles & des femelles ensemble dans une chambre , ils ont vécu , mais ils ne se sont point accouplés. J'en ai lâché plusieurs dans mes jardins , ils n'y font pas grand mal , & à peine s'apperçoit-on qu'ils y habitent ; ils vivent de fruits tombés , ils fouillent la terre avec le nez à une petite profondeur ; ils mangent les hannetons , les scarabées , les grillons , les vers & quelques racines ; ils sont aussi très avides de viande , & la mangent cuite ou crue. A la campagne , on les trouve fréquemment dans les bois , sous les troncs des vieux arbres , & aussi dans les fentes des rochers , & surtout dans les monceaux de pierre qu'on amasse dans les champs & dans les vignes. Je ne crois pas qu'ils montent sur les arbres , comme le disent les Naturalistes (c) , ni qu'ils se servent de leurs épines pour emporter des fruits ou des grains de raisin : c'est avec la gueule

(c) *Arctores ascendit , poma & rura decucit , in illis se se
volatut ut spinis hæcant.* Sperling. *Zoologia Lipsiae ,
1808 , page 281.*

qu'ils prennent ce qu'ils veulent saisir; & quoiqu'il y en ait un grand nombre dans nos forêts, nous n'en avons jamais vu sur les arbres; ils se tiennent toujours au pied dans un creux ou sous la mousse, ils ne bougent pas tant qu'il est jour, mais ils courent ou plutôt ils marchent pendant toute la nuit; ils approchent rarement des habitations; ils préfèrent les lieux élevés & secs, quoiqu'ils se trouvent aussi quelquefois dans les prés. On les prend à la main, ils ne fuient pas, ils ne se défendent ni des pieds ni des dents, mais ils se mettent en boule dès qu'on les touche, & pour les faire étendre il faut les plonger dans l'eau. Ils dorment pendant l'hiver; ainsi les provisions qu'on dit qu'ils font pendant l'été leur seroient bien inutiles. Ils ne mangent pas beaucoup, & peuvent se passer assez long-temps de nourriture. Ils ont le sang froid à-peu près comme les autres animaux qui dorment en hiver. Leur chair n'est pas bonne à manger, & leur peau, dont on ne fait maintenant aucun usage, servoit autrefois de vergette & de frottoir pour ferancer le chanvre.

Il en est des deux espèces de hérisson, l'un à groin de cochon, & l'autre à museau de chien, dont parlent quelques Auteurs, comme des deux espèces de blaireau; nous n'en connaissons qu'une seule, & qui n'a même aucune variété dans ces climats: elle est assez généralement répandue, on en trouve par-tout en Europe, à l'exception des pays les plus froids, comme la Laponie, la Nor-

vège , &c. Il y a , dit Flaccourt (d), des hérissons à Madagascar comme en France , & on les appelle *Sora*. Le hérisson de Siam dont parle le P. Tachard (e), nous paroît être un autre animal , & le hérisson d'Amérique (f); le hérisson de Sibérie (g), sont les espèces les plus voisines du hérisson commun ; enfin le hérisson de Malaca (h), semble plus approcher de l'espèce du Porc-épic que de celle du hérisson.

(d) *Voyez le voyage de Flaccourt. Paris , 1661 , page 152.*

(e) *Voyez le second voyage du P. Tachard. Paris , 1689 , page 272.*

(f) *Echinus Indicus albus. Ray , Synops animal. quadrup. page 232. Echinus Americanus albus. Albert Seba , vol. I , page 78. Acanthion echinatus , Erinaceus Americanus albus Surinamensis. Klein , de quadrup. pag. 66.*

(g) *Erinaceus Sibericus. Albert Seba , vol. I , p. 66.*

(h) *Porcus aculeatus seu histrix Malaccensis. Albert Seba , vol. I , page 81. Acanthion aculeis longissimis , histrix gennina. Porcus aculeatus Malaccensis. Klein , de quadrup. pag. 66. Histrix pedibus pentadactylis , cauda truncata. Linnæus. Erinaceus auriculis pendulis. Brisson , Regn. animal. page 183.*





LA MUSARAIGNE [a]

Voyez planche IX, figure 4 de ce Volume.

T

LA Musaraigne semble faire une nuance dans l'ordre des petits animaux, & remplir l'intervalle qui se trouve entre le rat & la taupe, qui se ressemblent par leur petitesse, diffèrent beaucoup par la forme & sont en tout d'espèces très éloignées. La musaraigne plus petite encore que la souris, ressemble à la taupe par le museau, ayant le nez beaucoup plus alongé que les mâchoires; par les yeux, qui quoiqu'un peu plus gros que ceux

(a) La Musaraigne, en Grec, *Muyalλ*; en Latin, *Mus araneus*, *mus cæcus*; en Italien, *Toporagno*; en Espagnol, *Murciano*; en Allemand, *Miiger*, *Spignus*, *Zif-mus*, *Spitzmaus*, *Hafelmaus*; en Anglois, *Shrew*, *Shrew-mouse*, *Hardy-Shrew*; en Suédois, *Nabbmus*; en Polonois, *Keret*; en Silésie, *Bisem-mus*; chez les Grisons, *Musarring*; en Suisse, *Murei*; en Savoie, *Muset*, *Mufette*; en ancien François, *Mujerain*, *Muzeraigne*, *Muset*, *Musetre*, *Sery*, *Sri*.

Musaraneus. Gesner, hist. quadrup. page 747.

Mus, *Mochias* (parce qu'il sent le musc lorsqu'il est déshéché). Gesner, Icon animal. quadrup. page 116.

Musaraneus. Ray, Synops. animal. quadrup. p. 239.

Sorex Musaraneus. Linnæus.

Musaraneus rostro prodigiore; *mus venenosus*. Klein, de quadrup. page 58.

Musaraneus supra ex fusco rufus, *infra albicans* . . .

Musaraneus. Brillon, Regn. animal. page 178.

de

de la taupe , sont cachés de même , & sont beaucoup plus petits que ceux de la souris ; par le nombre des doigts , dont elle a cinq à tous les pieds : par la queue , par les jambes , surtout celles de derrière , qu'elle a plus courtes que la souris ; par les oreilles (b) , & enfin par les dents. Ce très petit animal a une odeur forte qui lui est particulière , & qui répugne aux chats ; ils chassent , ils tuent la musaraigne , mais ils ne la mangent pas comme la souris. C'est apparemment cette mauvaise odeur & cette répugnance des chats qui a fondé le préjugé du venin de cet animal & de sa morsure dangereuse pour le bétail , surtout pour les chevaux ; cependant il n'est ni venimeux , ni même capable de mordre , car il n'a pas l'ouverture de la gueule assez grande pour pouvoir saisir la double épaisseur de la peau d'un autre animal , ce qui cependant est absolument nécessaire pour mordre : & la maladie des chevaux que le vulgaire attribue à la dent de la musaraigne , est une enflure , une espèce d'anthrax , qui vient d'une cause interne , & qui n'a nul rapport avec la morsure , ou , si l'on veut , la piqûre de ce petit animal. Il habite assez communément , surtout pendant l'hiver , dans les greniers à foin , dans les écuries , dans les granges , dans les cours à fumier ; il mange du grain , des insectes &

(b) Voir la description de la Musaraigne , & comparez-la avec celle de la Taupe & celle de la Souris , au tome XV de l'édition en trente-un volumes.

des chairs pourries ; on le trouve aussi fréquemment à la campagne , dans les bois , où il vit de graines ; & il se cache sous la mousse , sous les feuilles , sous les troncs d'arbres , & quelquefois dans les trous abandonnés par les taupes , ou dans d'autres trous plus petits qu'il se pratique lui-même en fouillant avec les ongles & le museau. La musaraigne produit en grand nombre , autant , dit-on , que la souris , quoique moins fréquemment. Elle a le cri beaucoup plus aigu que la souris , mais elle n'est pas aussi agile à beaucoup près : on la prend aisément , parce qu'elle voit & court mal. La couleur ordinaire de la musaraigne est d'un brun mêlé de roux , mais il y en a aussi de cendrées , de presque noires , & toutes sont plus ou moins blanchâtres sous le ventre. Elles sont très communes dans toute l'Europe , mais il ne paraît pas qu'on les retrouve en Amérique. L'Animal du Bresil dont Marcgrave parle (c) sous le nom de *musaraigne* , qui a , dit-il , le museau très pointu & trois bandes noires sur le dos , est plus gros , & paraît être d'une autre espèce que notre musaraigne.

(c) *Vide Marcgravii hist. Brasil. page 229.*



LA MUSARAIGNE D'EAU (a).

Voyez planche IX, figure 5 de ce Volume.

COMME cet animal, quoique naturel à ce climat, n'étoit connu d'aucun Naturaliste, & que c'est M. Daubenton qui le premier en a fait la découverte, nous renvoyons entièrement ce que l'on en peut dire à la description très exacte qu'il en donne (b). J'aurai souvent occasion d'en user de même dans la suite de cet Ouvrage, attendu la diligence infinie avec laquelle il recherche les animaux, & les découvertes qu'il a faites de plusieurs espèces auparavant inconnues, ou confondues avec celles que l'on connoissoit. Tout ce que je puis assurer au sujet de la musaraigne d'eau, c'est qu'on la prend à la source des fontaines, au lever & au coucher du soleil; que dans le jour elle reste cachée dans des fentes de rochers ou dans des trous sous terre, le long des petits ruisseaux; qu'elle met bas au printemps, & qu'ordinairement elle produit neuf petits.

(a) La Musaraigne d'eau. *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1756, *Mémoire sur la Musaraigne*, par M. Daubenton.

(b) Voyez le tome XVI de l'édition en trente-un volumes.

LA TAUPE (*a*).

Voyez planche IX, fig. 6 de ce Volume.

LA Taupe, sans être aveugle, a les yeux si petits, si couverts, qu'elle ne peut faire grand usage du sens de la vue; en dédommagement la Nature lui a donné avec magnificence l'usage du sixième sens, un appareil remarquable de réservoirs & de vaisseaux (*b*), une

(*a*) La Taupe; en Grec, Ασπάλαξ; en Latin, *Talpa*; en Italien, *Talpa*; en Espagnol, *Topo*; en Allemand, *Maulwurf*, *Maulwurf*; en Anglois, *Mole*, *Moldward*, *Want*; en Suédois, *Mullvad*; en Polonois, *Kret*.

Σπάλαξ, Galeni.

Talpa. Gesner, hist. quadrup. page 931. Icon. animal. quadrup. page 116.

Talpa. Ray, Synops. animal. quadrup. page 236.

Talpa caudata. Linnæus.

Talpa nostrus, nigra communiter. Klein, de quadrup. page 60.

Talpa caudata nigricans, pedibus anticis & posticis pentadactylis... *Talpa vulgaris*. Brisson, Regn. animal. page 230.

(*b*) *Testes maximos, parastatas amplissimas, novum corpus seminale ab his diversum ac separatum... penem etiam facile omnium, ni fallor, animalium longissimum, ex quibus colligeret maximam præ reliquis omnibus animalibus voluptatem in coitu, hoc abjectum & vile animalculum percipere, ut habeant quod ipsi invideant qui in hoc supremas vita sua delicias collocant*. Ray, Synops. animal. quadrup. page 232.

quantité prodigieuse de liqueur séminale , des testicules énormes , le membre génital excessivement long ; tout cela secrètement caché à l'intérieur , & par conséquent plus actif & plus chaud. La taupe à cet égard est de tous les animaux le plus avantageusement doué , le mieux pourvu d'organes , & par conséquent de sensations qui y sont relatives : elle a de plus le toucher délicat ; son poil est doux comme la soie ; elle a l'ouïe très fine , & de petites mains à cinq doigts , bien différentes de l'extrémité des pieds des autres animaux , & presque semblables aux mains de l'homme ; beaucoup de force pour le volume de son corps , le cuir ferme , un embonpoint constant , un attachement vif & réciproque du mâle & de la femelle , de la crainte ou du dégoût pour toute autre société , les douces habitudes du repos & de la solitude , l'art de se mettre en sûreté , de se faire en un instant un asyle , un domicile , la facilité de l'étendre & d'y trouver sans en sortir une abondante subsistance. Voilà sa nature , ses mœurs & ses talents , sans doute préférables à des qualités plus brillantes & plus incompatibles avec le bonheur , que l'obscurité la plus profonde.

Elle ferme l'entrée de sa retraite , n'en sort presque jamais qu'elle n'y soit forcée par l'abondance des pluies d'été , lorsque l'eau la remplit ou lorsque le pied du Jardinier en affaisse le dôme : elle se pratique une voûte en rond dans les prairies , & assez ordinairement un boyau long dans les jardins , parce qu'il y a plus de facilité à diviser & à sou-

lever une terre meuble & cultivée qu'un gazon ferme & tissu de racines ; elle ne demeure ni dans la fange ni dans les terreins durs , trop compactes au trop pierreux ; il lui faut une terre douce , fournie de racines ésculentes , & sur-tout bien peuplée d'insectes & de vers , dont elle fait sa principale nourriture.

Comme les taupes ne sortent que rarement de leur domicile souterrain , elles ont peu d'ennemis , & échappent aisément aux animaux carnassiers ; leur plus grand fléau est le débordement des rivières ; on les voit dans les inondations , fuir en nombre à la nage , & faire tous leurs efforts pour gagner les terres plus élevées ; mais la plupart périssent , aussi-bien que leurs petits qui restent dans les trous ; sans cela , les grands talens qu'elles ont pour la multiplication nous deviendroient trop incommodes. Elles s'accouplent vers la fin de l'hiver ; elles ne portent pas long-temps , car on trouve déjà beaucoup de petits au mois de mai ; il y en a ordinairement quatre ou cinq dans chaque portée , & il est assez aisē de distinguer , parmi les mottes qu'elles élèvent , celles sous lesquelles elles mettent bas : ces mottes sont faites avec beaucoup d'art , & sont ordinairement plus grosses & plus élevées que les autres. Je crois que ces animaux produisent plus d'une fois par an , mais je ne puis pas l'affirmer ; ce qu'il y a de certain , c'est qu'on trouve des petits depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août : peut-être aussi que les unes s'accouplent plus tard que les autres.

Le domicile où elles font leurs petits mériteroit une description particulière Il est fait avec une intelligence singuliere , elles commencent par pousser , par éléver la terre & former une voûte assez élevée ; elles laissent des cloisons , des espèces de piliers de distance en distance ; elles pressent & battent la terre , la mêlent avec des racines & des herbes , & la rendent si dure & si solide par-dessous , que l'eau ne peut pas pénétrer la voûte à cause de sa convexité & de sa solidité ; elles élèvent ensuite un tertre par-dessous , au sommet duquel elles apportent de l'herbe & des feuilles pour faire un lit à leurs petits ; dans cette situation ils se trouvent au-dessus du niveau du terrain ; & par conséquent à l'abri des inondations ordinaires , & en même temps à couvert de la pluie , par la voûte qui recouvre le tertre sur lequel ils reposent. Ce tertre est percé tout autour de plusieurs trous en pente , qui descendent plus bas & s'étendent de tous côtés , comme autant de routes souterraines par où la mère taupe peut sortir & aller chercher la subsistance nécessaire à ses petits ; ces sentiers souterrains sont fermés & battus , s'étendent à douze ou quinze pas , & partent tous du domicile comme des rayons d'un centre. On y trouve , aussi-bien que sous la voûte , des débris d'oignons de colchique , qui sont apparemment la première nourriture qu'elle donne à ses petits. On voit bien par cette disposition qu'elle ne sort jamais qu'à une distance considérable de son domicile ,

& que la maniere la plus simple & la plus sûre de la prendre avec ses petits, est de faire autour une tranchée qui l'environne en entier & qui coupe toutes les communications ; mais comme la taupe fuit au moindre bruit, & qu'elle tâche d'emmener ses petits, il faut trois ou quatre hommes qui, travaillant ensemble avec la bêche, enlèvent la motte toute entière ou fassent une tranchée presque dans un moment, & qui ensuite les saisissent ou les attendent aux issues.

Quelques Auteurs (*c*) ont dit mal-à-propos que la taupe & le blaireau dormoient sans manger pendant l'hiver entier. Le blaireau, comme nous l'avons dit (*d*), fort de son trou en hiver comme en été, pour chercher sa subsistance, & il est aisè de s'en assurer par les traces qu'il laisse sur la neige. La taupe dort si peu pendant tout l'hiver, qu'elle pouffe la terre comme en été, & que les gens de la campagne disent, comme par proverbe : *les taupes poussent, le dégel n'est pas loin.* Elles cherchent à la vérité les endroits les plus chauds : les Jardiniers en prenaient souvent autour de leurs couches aux mois de décembre, de janvier & de février.

La taupe ne se trouve guère que dans les

(c) *Ursus, Meles, Erinaceus, Talpa, Vesperilio per hibernum dormiunt abstinent.* Linnæi *Fauna Suecica: Stockholmæ, 1746*, page 8.

(d) Voyez dans ce volume l'article du Blaireau.

pays cultivés, il n'y en a point dans les déerts arides ni dans les climats froids, où la terre est gelée pendant la plus grande partie de l'année. L'animal qu'on a appellé *Taupe de Sibérie* (*e*), qui a le poil vert & or, est d'une espèce différente de nos taupes, qui ne sont en abondance que depuis la Suède (*f*) jusqu'en Barbarie (*g*); car le silence des voyageurs nous fait présumer qu'elles ne se trouvent point dans les climats plus chauds. Celles d'Amérique sont aussi différentes : la taupe de Virginie (*h*) est cependant assez semblable à la nôtre, à l'exception de la couleur du poil, qui est mêlée de pourpre foncé; mais la taupe rouge d'Amérique (*i*) est un autre animal. Il y a seulement deux ou trois variétés dans l'espèce commune de nos taupes : on en trouve de plus ou moins brunes & de plus ou moins noires: nous en avons vu de toutes blanches, & Séba fait mention (*k*) & donne la figure d'une taupe tachée

(*d*) *Vide Albert Scba. Amstelodami, 1734, vol. I,*
page 5.

(*f*) *Vide Linnæi Faun. Suec. Stockholm. 1746, p. 7.*

(*g*) *Voyez les voyages du Dr. Shaw. Amsterdam. 1743, tome I, page 322.*

(*h*) *Voyez Albert Scba, vol. I, page 5.*


(*i*) *Ibid.*


(*k*) Cette taupe a été trouvée en Ost-Frise, dans le grand chemin ; elle est un peu plus longue que les taupes ordinaires, dont au reste elle ne diffère que par sa peau qui est toute marbrée sur le dos & sous le ventre de taches blanches & noires, dans lesquelles pourtant on distingue comme un mélange de poils gris aussi

de noir & de blane , qui se trouve en Ost-Frise ,
& qui est un peu plus grosse que la taupe or-
dinaire.


fins que de la soie. Le museau de cet animal est long
& hérissé d'un long poil ; les yeux sont si petits , que
l'on a de la peine à découvrir l'ouverture des paupie-
res. Albert Seba , vo'. I , page 68.







Les Chauves-Souris.



LA CHAUVE-SOURIS [a].

Voyez planche X de ce Volume.

QUOIQUE tout soit également parfait en soi, puisque tout est sorti des mains du Créateur, il est cependant, relativement à nous, des êtres accomplis, & d'autres qui semblent être imparfaits ou difformes. Les premiers sont ceux dont la figure nous paroît agréable & complète, parce que toutes les parties font bien ensemble, que le corps & les membres sont proportionnés, les mouvements assortis, toutes les fonctions faciles & naturelles. Les autres, qui nous paroissent hideux, sont ceux dont les qualités nous sont nuisibles, ceux dont la nature s'éloigne de la nature commune, & dont la forme est trop différente des formes ordinaires desquelles nous avons

(a) La Chauve-souris; en Grec, *Nuxterpis*; en Latin, *Vespertilio*; en Italien, *Nottolo*, *Notula*, *Barbastello*, *Vilpistrello*, *Pipistrello*, *Sportegliono*; en allemand, *Flacdermuss*; en Anglois, *Bat*, *Flittermouse*; en Suédois, *Laderlapp*; en Polonois, *Nietopersz*.

Vespertilio. Gesner, hist. avi. page 766. Icon. avi. page 17.

Vespertilio. Ray, Synops. anim. quadr. page 243.

Vespertilio caudatus, ore nasoque simplici. Linnæus.

Vespertilio vulgaris. Klein, de quadrup. page 61.

La grande chauve-souris de notre pays. *Vespertilio murini coloris*, *pedibus omnibus pentadactylis*, *auriculis simplicibus*... *Vespertilio major*. Brisson, Regn. anim. page 224.

reçu les premières sensations , & tiré les idées qui nous servent de modèle pour juger. Une tête humaine sur un cou de cheval , le corps couvert de plumes , & terminé par une queue de poisson , n'offrent un tableau d'une énorme difformité que parce qu'on y réunit ce que la Nature a de plus éloigné. Un animal qui , comme la Chauve-souris , est à demi-quadrupède , à demi-volatile , & qui n'est en tout ni l'un ni l'autre , est pour ainsi dire , un être monstre , en ce que réunissant les attributs de deux genres si différents , il ne ressemble à aucun des modèles que nous offrent les grandes classes de la Nature. Il n'est qu'imparfaitement quadrupède , & il est encore plus imparfaitement oiseau. Un quadrupède doit avoir quatre pieds , un oiseau a des plumes & des ailes ; dans la chauve-souris les pieds de devant ne sont ni des pieds ni des ailes , quoiqu'elle s'en serve pour voler , & qu'elle puisse aussi s'en servir pour se traîner : ce sont en effet des extrémités difformes , dont les os sont monstrueusement alongés , & réunis par une membrane qui n'est couverte ni de plumes , ni même de poil , comme le reste du corps : ce sont des espèces d'aileron , ou , si l'on veut , des pattes ailées , où l'on ne voit que l'ongle d'un pouce court , & dont les quatre autres doigts très longs ne peuvent agir qu'ensemble , & n'ont point de mouvements propres , ni de fonctions séparées : ce sont des espèces de mains dix fois plus grandes que les pieds , & en tout quatre fois plus longues que le corps entier de l'animal : ce sont ,

en un mot , des parties qui ont plutôt l'air d'un caprice que d'une production réguliere. Cette membrane couvre les bras , forme les ailes ou les mains de l'animal , se réunit à la peau de son corps , & enveloppe en même temps ses jambes , & même sa queue qui , par cette jonction bizarre , devient , pour ainsi dire , l'un de ses doigts. Ajoutez à ces disparates & à ces disproportions du corps & des membres , les difformités de la tête , qui souvent sont encore plus grandes ; car , dans quelques espèces , le nez est à peine visible , les yeux sont enfoncés tout près de la conque de l'oreille , & se confondent avec les joues ; dans d'autres , les oreilles sont aussi longues que le corps , ou bien la face est tortillée en forme de fer-à-cheval , & le nez recouvert par une espèce de crête. La plupart ont la tête surmontée par quatre oreillons , toutes ont les yeux petits , obscurs & couverts , le nez , ou plutôt les naseaux informes , la gueule fendue de l'une à l'autre oreille ; toutes aussi cherchent à se cacher , fuyent la lumiere , n'habitent que les lieux ténébreux , n'en sortent que la nuit , y rentrent au point du jour pour demeurer collées contre les murs. Leur mouvement dans l'air est moins un vol qu'une espèce de voltigement incertain , qu'elles semblent n'exécuter que par effort , & d'une maniere gauche ; elles s'élèvent de terre avec peine , elles ne volent jamais à une grande hauteur , elles ne peuvent qu'imparfaitement précipiter , ralentir ou même diriger leur vol ; il n'est ni très rapide ni bien direct , il se fait par des

vibrations brusques dans une direction oblique & tortueuse ; elles ne laissent pas de faire en passant les moucherons, les cousins & sur-tout les papillons phalènes qui ne volent que la nuit , elles les avalent , pour ainsi dire , tout entiers , & l'on voit dans leurs excréments les débris des ailes & des autres parties sèches qui ne peuvent se digérer. Étant un jour descendu dans les grottes d'Arci pour en examiner les stalactites , je fus surpris de trouver sur un terrain tout couvert d'albâtre , & dans un lieu si ténébreux & si profond , une espèce de terre qui étoit d'une toute autre nature ; c'étoit un tas épais & large de plusieurs pieds d'une matière noirâtre , presqu'entièrement composée de portions d'ailes & de pattes de mouches & de papillons , comme si ces insectes se fussent rassemblés en nombre immense & réunis dans ce lieu pour y périr & pourrir ensemble. Ce n'étoit cependant autre chose que de la fiente de chauve-souris , amoncelée probablement pendant plusieurs années dans l'endroit de ces voûtes souterraines , qu'elles habitoient de préférence ; car dans toute l'étendue de ces grottes , qui est de plus d'un demi - quart de lieue , je ne vis aucun autre amas d'une pareille matière , & je jugeai que les chauve-souris avoient fixé dans cet endroit leur demeure commune , parce qu'il y parvenoit encore une très foible lumière par l'ouverture de la grotte ; & qu'elles n'allioient pas plus avant pour ne pas s'enfoncer dans une obscurité trop profonde.

Les chauve-souris font de vrais quadrupè-

des, elles n'ont rien de commun que le vol avec les oiseaux ; mais comme l'action de voler suppose une très grande force dans la partie supérieure du corps & dans les membres antérieurs, elles ont les muscles pectoraux beaucoup plus forts & plus charnus qu'aucun des quadrupèdes, & l'on peut dire que par là elles ressemblent encore aux oiseaux ; elles en diffèrent par tout le reste de la conformation , tant extérieure qu'intérieure ; les poumons, le cœur, les organes de la génération , tous les autres viscères sont semblables à ceux des quadrupèdes , à l'exception de la verge qui est pendante & détachée , ce qui est particulier à l'homme , aux singes & aux chauve-souris ; elles produisent , comme les quadrupèdes , leurs petits vivans ; enfin elles ont , comme eux , des dents & des mamelles : l'on assure qu'elles ne portent que deux petits , qu'elles les allaitent & les transportent même en volant . C'est en été qu'elles s'accouplent & qu'elles mettent bas , car elles sont engourdis pendant l'hiver : les unes se recouvrent de leurs ailes comme d'un manteau , s'accrochent à la voûte de leur souterrain par les pieds de derrière , & demeurent ainsi suspendues ; les autres se collent contre les murs ou se recelent dans des trous , elles sont toujours en nombre pour se défendre du froid : toutes passent l'hiver sans bouger , sans manger , ne se réveillent qu'au printemps , & se recellent de nouveau vers la fin de l'automne . Elles supportent plus aisément la diète que le froid , elles peuvent passer plusieurs jours sans man-

ger, & cependant elles sont du nombre des animaux carnassiers ; car lorsqu'elles peuvent entrer dans un office, elles s'attachent aux quartiers de lard qui y sont suspendus, & elles mangent aussi de la viande crue ou cuite, fraîche ou corrompue.

Les Naturalistes qui nous ont précédés ne connoissoient que deux espèces de chauve-souris. M. Daubenton en a trouvé cinq autres qui sont, aussi-bien que les deux premières espèces, naturelles à notre climat ; elles y sont même aussi communes, aussi abondantes, & il est assez étonnant qu'aucun observateur ne les eût remarquées. Ces sept espèces sont très distinctes, très différentes les unes des autres, & n'habitent même jamais ensemble dans le même lieu.

La première, qui étoit connue, est la chauve-souris commune ou la chauve-souris proprement dite, dont j'ai donné ci-devant les dénominations. (*Voyez la fig. 1, planche X de ce vol.*)

La seconde est la chauve-souris à grandes oreilles, que nous nommerons l'oreillard, qui a aussi été reconnue par les Naturalistes & indiquée par les Nomenclateurs (b). L'o-

(b) *Vespertilio*. Aldrovand. *Avi.* page 571. *Vespertilio auriculis quaternis*. Jonst. *Avi.* page 34.

Vespertilio vulgaris, auriculis duplicibus. Klein, *de quadrup.* page 61.

La petite chauve-souris de notre pays. *Vespertilio reillar*

reillar est peut-être plus commun que la chauve-souris ; il est bien plus petit de corps ; il a aussi les ailes beaucoup plus courtes , le museau moins gros & plus pointu , les oreilles d'une grandeur démesurée . (Voy. la fig. 3 , planche X de ce vol.)

La troisième espèce , que nous appellerons la noctule , du mot Italien *noctula* , n'étoit pas connue ; cependant elle est très commune en France , & on la rencontre même plus fréquemment que les deux espèces précédentes . On la trouve sous les toits , sous les gouttières de plomb des châteaux , des églises , & aussi dans les vieux arbres creux ; elle est presqu'aussi grosse que la chauve-souris ; elle a les oreilles courtes & larges , le poil rousâtre , la voix aigre , perçante , & assez semblable au son d'un timbre de fer . (Voyez la figure . 4. pl. X de ce vol.)

Nous nommerons serotine la quatrième espèce , qui n'étoit nullement connue ; elle est plus petite que la chauve-souris & que la noctule ; elle est à-peu-près de la grandeur de l'oreillar , mais elle en diffère par les oreilles qu'elle a courtes & pointues , & par la couleur du poil , elle a les ailes plus noires & le poil d'un brun plus foncé . (Voy. la fig. 5 , pl. X de ce vol.)

Nous appellerons la cinquième espèce , qui n'étoit pas connue , la pipistrelle , du mot Ita-

murini coloris , pedibus omnibus pentadactylis , auriculis duplicitibus . . . Vespertilio minor . Brisson , Regn. animal. page 226.

lien *pipistrello*, qui signifie aussi chauve-souris. La pipistrelle n'est pas à beaucoup près aussi grosse que la chauve-souris ou la noctule, ni même que la sérotine ou l'oreillar : de toutes les chauve-souris c'est la plus petite & la moins laide, quoiqu'elle ait la lèvre supérieure fort renflée, les yeux très petits, très enfoncés, & le front très couvert de poil. (*Voyez la fig. 6. pl. X de ce vol.*)


La sixième espèce, qui n'étoit pas connue, fera nommée *barbastelle*, du mot Italien *barbastello*, qui signifie encore chauve-souris. Cet animal est à-peu-près de la grosseur de l'oreillar ; il a les oreilles aussi larges, mais bien moins longues : le nom de *barbastelle* lui convient d'autant mieux qu'il paroît avoir une grosse moustache, ce qui cependant n'est qu'une apparence occasionnée par le renflement des joues qui forment un bourrelet au-dessus des lèvres ; il a le museau très court, le nez fort aplati & les yeux presque dans les oreilles. (*Voy. la fig. 7, pl. X de ce vol.*)

Enfin nous nommerons *fer-à-cheval* une septième espèce qui n'étoit nullement connue ; elle est très frappante par la singulière difformité de sa face, dont le trait le plus apparent & le plus marqué est un bourrelet en forme de fer-à-cheval autour du nez & sur la lèvre supérieure ; on la trouve très communément en France dans les murs & dans les caveaux des vieux châteaux abandonnés. Il y en a de petites & de grosses, mais qui sont au reste si semblables par la forme, que nous les avons jugées de la même espèce ; seulement, comme nous en avons beaucoup

vu sans en trouver de grandeur moyenne entre les grosses & les petites, nous ne décidons pas si l'âge seul produit cette différence, ou si c'est une variété constante dans la même espèce. (*Voy, les fig. 2 & 8, pl. X de ce vol.*)

(*) Ces animaux restent pendant le jour suspendus par les pieds de derrière, & enveloppés de leurs ailes. [*Voyez pl. X, fig. 9.*]





LE LOIR (a).

Voyez planche XII, fig. 1 de ce Volume.

Nous connoissons trois espèces de Loirs, qui, comme la marmotte, dorment pendant l'hiver : le Loir, le Lérot, & le Muscardin ; le loir est le plus gros des trois, le muscardin est le plus petit. Plusieurs auteurs ont confondu l'une de ces espèces avec les deux autres, quoiqu'elles soient toutes trois très distinctes, & par conséquent très aisées à reconnoître & à distinguer. Le loir est à-peu-près de la grandeur de l'écureuil : il a, comme lui, la queue couverte de longs poils. Le lérot n'est pas si gros que le rat, il a la queue couverte de poils très courts, avec un bouquet de poils longs à l'extrémité. Le muscardin n'est pas plus gros que la

(a) Le Loir ; en Grec, *Musænēs*, selon Gesner ; *Eλεῖς* selon les Grammairiens ; en Latin, *Glis* ; en Italien, *Galero*, *Gliero*, *Ghiro* ; en Espagnol, *Liroa* ; en Allemand, *Sebens-schlæfer* selon Klein, & *Gieul* en quelques endroits d'Allemagne, selon Gesner ; en Polonois, *Szurek* ; en Suisse, *Rell*, *Rell-musc* ; en vieux François, *Liron*, *Rat-liron*, *Rat-vele*.


Glis. Gesner, hist. quadr. page 550. Icon. quadr. page 109.

Glis. Aldrovande, hist. quadr. digit. page 409.

Glis suprà obscurè cinereus, infra ex alto cinereescens. Brisson, Regn. animal. page 162.



1 Le Loir. 2 Le Lérot.



souris, il a la queue couverte de poils plus longs que le lérot, mais plus courts que le loir, avec un gros bouquet de longs poils à l'extrémité. Le lérot diffère des deux autres par les marques noires qu'il a près des yeux, & le muscardin par la couleur blonde de son poil sur le dos. Tous trois sont blancs ou blanchâtres sous la gorge & le ventre ; mais le lérot est d'un assez beau blanc, le loir n'est que blanchâtre, & le muscardin est plutôt jaunâtre que blanc dans toutes les parties inférieures.

C'est improprement que l'on dit que ces animaux dorment pendant l'hiver ; leur état n'est point celui d'un sommeil naturel, c'est une torpeur, un engourdissement des membres & des sens, & cet engourdissement est produit par le refroidissement du sang. Ces animaux ont si peu de chaleur intérieure, qu'elle n'excède guere celle de la température de l'air. Lorsque la chaleur de l'air est au thermomètre, de dix degrés au-dessus de la congélation, celle de ces animaux n'est aussi que de dix degrés. Nous avons plongé la boule d'un petit thermomètre dans le corps de plusieurs lérots vivans ; la chaleur de l'intérieur de leur corps étoit à-peu-près égale à la température de l'air ; quelquefois même le thermomètre plongé, &, pour ainsi dire, appliqué sur le cœur, a baissé d'un demi-degré ou d'un degré, la température de l'air étant à onze. Or, l'on fait que la chaleur de l'homme & de la plupart des animaux qui ont de la chair &

du sang , excède en tout temps trente degrés ; il n'est donc pas étonnant que ces animaux , qui ont si peu de chaleur en comparaison des autres , tombent dans l'engourdissement dès que cette petite quantité de chaleur intérieure cesse d'être aidée par la chaleur extérieure de l'air ; & cela arrive lorsque le thermomètre n'est plus qu'à dix ou onze degrés au-dessus de la congélation. C'est-là la vraie cause de l'engourdissement de ces animaux ; cause que l'on ignoroit , & qui cependant s'étend généralement sur tous les animaux qui dorment pendant l'hiver ; car nous l'avons reconnue dans les loirs , dans les hérissons , dans les chauve - souris ; & quoique nous n'ayons pas eu occasion de l'éprouver sur la marmotte , je suis persuadé qu'elle a le sang froid comme les autres , puisqu'elle est comme eux sujette à l'engourdissement pendant l'hiver.

Cet engourdissement dure autant que la cause qui le produit , & cesse avec le froid ; quelques degrés de chaleur au-dessus de dix ou onze suffisent pour ranimer ces animaux , & si on les tient pendant l'hiver dans un lieu bien chaud , ils ne s'engourdissent point du tout ; ils vont & viennent , ils mangent & dorment seulement de temps en temps , comme tous les autres animaux. Lorsqu'ils sentent le froid , ils se ferment & se mettent en boule pour offrir moins de surface à l'air & se conserver un peu de chaleur : c'est ainsi qu'on les trouve en hiver dans les arbres creux , dans les trous des murs exposés au midi ; ils y gissoient en boule ,

& sans aucun mouvement , sur de la mousse & des feuilles : on les prend , on les tient , on les roule sans qu'ils remuent , sans qu'ils s'étendent ; rien ne peut les faire sortir de leur engourdissement qu'une chaleur douce & graduée ; ils meurent lorsqu'on les met tout-à-coup près du feu ; il faut , pour les dégourdir , les en approcher par degrés. Quoique dans cet état ils soient sans aucun mouvement , qu'ils ayent les yeux fermés & qu'ils paroissent privés de tout usage des sens , ils sentent cependant la douleur lorsqu'elle est très vive ; une blessure , une brûlure leur fait faire un mouvement de contraction & un petit cri sourd qu'ils répètent même plusieurs fois : la sensibilité intérieure subsiste donc aussi-bien que l'action du cœur & des poumons. Cependant il est à présumer que ces mouvements vitaux ne s'exercent pas dans cet état de torpeur avec la même force , & n'agissent pas avec la même puissance que dans l'état ordinaire ; la circulation ne se fait probablement que dans les plus gros vaisseaux , la respiration est foible & lente , les sécrétions sont très peu abondantes , les déjections nulles ; la transpiration est presque nulle aussi , puisqu'ils passent plusieurs mois sans manger , ce qui ne pourroit être si dans ce temps de diète ils perdoient de leur substance autant , à proportion , que dans les autres temps où ils la réparent en prenant de la nourriture. Ils en perdent cependant , puisque dans les hivers trop longs ils meurent dans leurs trous : peut-être aussi n'est-ce pas la durée , mais la

rigueur du froid qui les fait périr ; car lorsqu'on les expose à une forte gelée, ils meurent en peu de temps. Ce qui me feroit croire que ce n'est pas la trop grande déperdition de substance qui les fait mourir dans les grands hivers , c'est qu'en automne ils sont excessivement gras , & qu'ils le sont encore lorsqu'ils se raniment au printemps : cette abondance de graisse est une nourriture intérieure qui suffit pour les entretenir & pour suppléer à ce qu'ils perdent par la transpiration.

Au reste, comme le froid est la seule cause de leur engourdissement , & qu'ils ne tombent dans cet état que quand la température de l'air est au-dessous de dix ou onze degrés , il arrive souvent qu'ils se raniment même pendant l'hiver : car il y a des heures , des jours , & même des suites de jours dans cette saison , où la liqueur du thermomètre se soutient à douze , treize , quatorze , &c. degrés , & pendant ce temps doux les loirs sortent de leurs trous pour chercher à vivre ou plutôt ils mangent les provisions qu'ils ont ramassées pendant l'automne , & qu'ils y ont transportées Aristote a dit (b) , & tous les Naturalistes ont dit après Aristote , que les loirs passent tout l'hiver sans manger , & que dans ce temps même de diète ils deviennent extrêmement gras , que le sommeil seul les nourrit plus que les alimens ne nourrissent les autres

(b) *Hist. animal. lib. VIII, cap. xvii.*

animaux,

animaux. Le fait non-seulement n'est pas vrai , mais la supposition même du fait n'est pas possible. Le loir engourdi pendant quatre ou cinq mois ne pourroit s'engraisser que de l'air qu'il respire : accordons si l'on veut (& c'est beaucoup trop accorder) qu'une partie de cet air se tourne en nourriture , en résultera-t-il une augmentation si considérable ? cette nourriture si légère pourra-t-elle même suffire à la déperdition continue qui se fait par la transpiration ? Ce qui a pu faire tomber Aristote dans cette erreur , c'est qu'en Grèce , où les hivers sont tempérés , les loirs ne dorment pas continuellement , & que prenant de la nourriture , peut-être abondamment , toutes les fois que la chaleur les ranime , il les aura trouvés très gras , quoiqu'engourdis. Ce qu'il y a de vrai , c'est qu'ils sont gras en tout temps , & plus gras en automne qu'en été : leur chair est assez semblable à celle du cochon d'Inde. Les loirs faisoient partie de la bonne chere chez les Romains ; ils en élevaient en quantité. Varron donne la manière de faire des garennes de loirs , & Apicius celle d'en faire des ragoûts : cet usage n'a point été suivi , soit qu'on ait eu du dégoût pour ces animaux , parce qu'ils ressemblent aux rats , soit qu'en effet leur chair ne soit pas de bien bon goût. J'ai ouï dire à des paysans qui en avoient mangé , qu'elle n'étoit guere meilleure que celle du rat d'eau. Au reste , il n'y a que le loir qui soit mangeable ; le lérot a la chair mauvaise & d'une odeur désagréable.

Le loir ressemble assez à l'écureuil par les habitudes naturelles ; il habite comme lui les forêts , il grimpe sur les arbres , saute de branche en branche , moins légèrement à la vérité que l'écureuil qui a les jambes plus longues , le ventre bien moins gros , & qui est aussi maigre que le loir est gras : cependant ils vivent tous deux des mêmes alimens ; de la faine , des noifettes , de la châtaigne , d'autres fruits sauvages , font leur nourriture ordinaire. Le loir mange aussi de petits oiseaux qu'il prend dans les nids : il ne fait point de bauge au-dessus des arbres comme l'écureuil , mais il se fait un lit de mousse dans le tronc de ceux qui sont creux ; il se gîte aussi dans les fentes des rochers élevés , & toujours dans des lieux secs ; il craint l'humidité , boit peu , & descend rarement à terre ; il diffère encore de l'écureuil en ce que celui-ci s'apprivoise & que l'autre demeure toujours sauvage. Les loirs s'accouplent sur la fin du printemps , ils font leurs petits en été , les portées sont ordinairement de quatre ou de cinq , ils croissent vite , & l'on assure qu'ils ne vivent que six ans. En Italie , où l'on est encore dans l'usage de les manger , on fait des fosses dans les bois , que l'on tapisse de mousse , qu'on recouvre de paille , & où l'on jette de la faine ; on choisit un lieu sec à l'abri d'un rocher exposé au midi , les loirs s'y rendent en nombre , & on les y trouve engourdis vers la fin de l'automne , c'est le temps où ils sont les meilleurs à manger. Ces petits animaux sont coura-

geux , & défendent leur vie jusqu'à la dernière extrémité : ils ont les dents de devant très longues & très fortes , aussi mordent-ils violemment ; ils ne craignent ni la belette ni les petits oiseaux de proie , ils échappent au renard qui ne peut les suivre au-dessus des arbres ; leurs plus grands ennemis sont les chats sauvages & les martes.

Cette espèce n'est pas extrêmement répandue , on ne la trouve point dans les climats très froids , comme la Lapponie , la Suède , du moins les Naturalistes du Nord n'en parlent point : l'espèce de loir qu'ils indiquent est le muscardin , la plus petite des trois . Je présume aussi qu'on ne les trouve pas dans les climats très chauds , puisque les Voyageurs n'en font aucune mention : il n'y a que peu ou point de loirs dans les pays découverts , comme l'Angleterre ; il leur faut un climat tempéré & un pays couvert de bois ; on en trouve en Espagne , en France , en Grèce , en Italie , en Allemagne , en Suisse , où ils habitent dans les forêts , sur les collines , & non pas au-dessus des hautes montagnes comme les marmottes , qui , quoique sujettes à s'engourdir par le froid , semblent chercher la neige & les frimats .



enveloppent la masse entiere des intestins (*b*). On trouve des lérots dans tous les climats tempérés de l'Europe, & même en Pologne, en Prusse ; mais il ne paroît pas qu'il y en ait en Suède ni dans les pays septentriонаux.

(*b*) Voyez les descriptions du loir & du lérot, au tome XV de l'édition en trente-un volumes.



LE MUSCARDIN^(a).

Voyez *Planche IX*, fig. 7 de ce Volume.

LE Muscardin est le moins laid de tous les rats ; il a les yeux brillans, la queue touffue & le poil d'une couleur distinguée ; il est plus blond que roux ; il n'habite jamais dans les maisons, rarement dans les jardins, & se trouve, comme le loir, plus souvent dans les bois, où il se retire dans les vieux arbres creux. L'espèce n'en est pas, à beaucoup près, aussi nombreuse que celle du lérot : on trouve le muscardin presque toujours seul dans son trou, & nous avons eu beaucoup de peine à nous en procurer quelques-uns ; cependant il paroît qu'il est assez commun en Italie, que même il se trouve dans les climats du nord, puisque M. Linnæus l'a

(a) Muscardin de son nom en Italien *Moscardino* ; on l'appelle aussi *Ratdor* ou *Ratdort* en Bourgogne ; en Anglois, *Dormous*, or *Sleeper*.

Mus avellanarum minor. Aldrov. hist. quadrup. digit. page 440.

Mus avellanarum minor. Ray, Synops. animal. quadr. page 220.

Idus caudâ longâ, pilosâ, corpore rufâ, gulâ albicante. Linnæus.

Glis suprà rufâ, infâ albicans. Le croque-noix. Bïdon, Regn. animal. page 162.

compris dans la liste (b) qu'il a donnée des animaux de Suède ; & en même temps il semble qu'il ne se trouve point en Angleterre, car M. Ray (c), qui l'avoit vu en Italie, dit que le petit *rat dormeur* qui se trouve en Angleterre, n'est pas roux sur le dos comme celui d'Italie, & qu'il pourroit bien être d'une autre espèce. En France, il est le même qu'en Italie, & nous avons trouvé qu'Aldrovande (d) l'avoit bien indiqué ; mais cet auteur ajoute qu'il y en a deux espèces en Italie, l'une rare dont l'animal a l'odeur du musc, l'autre plus commune dont l'animal n'a point d'odeur, & qu'à Bologne on les appelle tous deux *muscardins* à cause de leur ressemblance, tant par la figure que par la grosseur. Nous ne connaissons que l'une de ces espèces, & c'est la seconde, car notre *muscardin* n'a point d'odeur, ni bonne ni mauvaise. Il manque comme le lérot de feuilletés graisseux qui enveloppent les intestins dans le loir, aussi ne vient-il pas si gras : & quoiqu'il n'ait point de mauvaise odeur, il n'est pas bon à manger.

Le *muscardin* s'engourdit par le froid & se met en boule comme le loir & le lérot ; il se ranime comme eux dans les temps doux, & fait aussi provision de noisettes & d'autres fruits secs. Il fait son nid sur les arbres, comme l'écureuil ; mais il le place

(b) *Vide Linnæi Faun. Suec.* page 11.

(c) *Vide Raii Synops. animal. quadr.* page 229.

(d) *Vide Aldrov. hist. quadr. digit.* page 440.

ordinairement

ordinairement plus bas, entre les branches d'un noisetier, dans un buisson, &c. Le nid est fait d'herbes entrelacées, il a environ six pouces de diamètre, & n'est ouvert que par le haut. Bien des gens de la campagne m'ont assuré qu'ils avoient trouvé de ces nids dans des bois taillis, dans des haies, qu'ils sont environnés de feuilles & de mousse, & que dans chaque nid il y avoit trois ou quatre petits. Ils abandonnent le nid dès qu'ils sont grands, & cherchent à se gîter dans le creux ou sous le tronc des vieux arbres, & c'est-là qu'ils reposent, qu'ils font leur provision, & qu'ils s'engourdis- sent.

Fin du deuxième Volume des Quadrupèdes.

T A B L E

De ce qui est contenu dans ce Volume.

	Page
L ES <i>Animaux sauvages.</i>	5
Le Cerf.	14
Le Daim.	52
Le Chevreuil.	60
Le Lièvre.	75
Le Lapin.	93
L es <i>Animaux carnassiers.</i>	102
Le Loup.	139
Le Renard.	154
Le Blaireau.	165
La Loutre.	172
La Fouine.	177
La Marte.	182
Le Putois.	186
Le Furet.	190
La Belette.	196
L 'Hermine ou le Roffeler.	201
L'Ecureuil.	204
Le Rat.	209
La Souris.	215
Le Mulot.	218
Le Rit d'eau.	225
Le Campagnol.	228
Le Cochon d'Inde.	231
Le Hérisson.	235
La Musaraigne.	240
La Musaraigne d'eau.	241
La Taupe.	244
La Chauve-souris.	251
Le Loir.	260
Le Lerot.	268
Le Mufcardin.	271



